

2024 年甘肃省七里河区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题大全附答案【预热题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 肝素使用过量造成出血，特效的解救药是

- A: 阿司匹林
- B: 维生素 C
- C: 白蛋白
- D: 鱼精蛋白

答案：D

2. 由医师和药师加强指导来减少

- A: 药师调配处方差错
- B: 患者执行医嘱差错
- C: 护士执行医嘱差错
- D: 医师处方差错

答案：B

3. 氯霉素（在肝脏与葡萄糖醛酸结合后排泄）半衰期成人为 4 小时，新生儿则为 25 小时，即

- A: 药物分布
- B: 药物中毒
- C: 药物代谢
- D: 药物吸收

答案：C

4. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径，半衰期小于 30min 且治疗指数低的药物通常选择()

- A: 每个半衰期给药 1 次
- B: 静脉滴注给药
- C: 2~3 个半衰期给药 1 次
- D: 每日给药 1 次

答案：B

5. 患者，女，28 岁，妊娠 27 周，头晕 3 天。入院查体：血压 160/100mmHg，诊断为：妊娠高血压。

- A: 缬沙坦
- B: 拉贝洛尔
- C: 卡托普利
- D: 福辛普利

答案：B

6. FBG 较高者宜选用作用快且强的药物是

- A: 甲苯磺丁脲
- B: 格列吡嗪控释片
- C: 格列本脲
- D: 格列喹酮

答案：C

7. 与黄连上清丸不宜联用的药物是

- A: 氢氧化铝
- B: 乳酶生
- C: 氨茶碱

D: 苯巴比妥

答案：B

8. 下列药学服务的重要人群中，特殊人群是指

A: 需要重新选择药品或调整用药方案者

B: 应用特殊剂型者

C: 肝肾功能不全者

D: 药物治疗窗窄、需要做监测者

答案：C

9. 可用于紫癜辅助治疗的药物是

A: 维生素 C

B: 维生素

C: 维生素 A

D: 复合维生素 B

答案：A

10. 质子泵抑制剂

A: 法莫替丁

B: 多潘立酮

C: 铝碳酸镁

D: 埃索美拉唑

答案：D

11. 某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A: 在取出最后一个周期包中的透皮贴剂的当天开始服用本品

B: 在取出最后一个阴道环的当天开始服用本品

C: 在服用以前所用的另种复方激素避孕药的停药期末开始服用本品

D: 在服用前一种复方激素避孕药最后一片的当天开始服用本品

答案：D

12. 多柔比星的通用名是

A: 阿霉素

B: 克毒星

C: 无环鸟苷片

D: 病毒唑

答案：A

13. 脂质体药物属于

A: E 级高危药品

B: D 级高危药品

C: C 级高危药品

D: B 级高危药品

答案：C

14. (2016 年真题) 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mgtidpo，阿托伐他汀钙片 20mgqdpo 等药物治疗。

A: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量

B: 每次调整 1-4 单位

C: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存

D: 每 3-5 天调整 1 次

答案：C

15. 哮喘急性发作的首选药为

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 布地奈德?
- B: 福莫特罗?
- C: 沙美特罗?
- D: 沙丁胺醇?

答案: D

16. 由国家药典委员会组织编写的是

- A: 《中国药典临床用药须知》
- B: 《国家基本药物处方集》
- C: 《中国国家处方集》
- D: 《医师案头参考》

答案: A

17. 记录患者用药问题、药学干预内容、药学监护计划的技能是

- A: 沟通技能
- B: 自主学习能力
- C: 药历书写技能
- D: 药品警戒技能

答案: C

18. 糖尿病患者应慎用的强效利尿剂是

- A: 呋塞米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 甘露醇
- D: 阿米洛利

答案: A

19. (抗癫痫药物的选择)，癫痫部分发作的一线用药是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 卡马西平
- B: 加巴喷丁
- C: 扑米酮
- D: 乙琥胺

答案：A

20. (2018 年真题) 甲状腺功能亢进合并哮喘的患者慎用的药物是 ()

- A: 奥马珠单抗 (抗 IgE 抗体)
- B: 沙美特罗
- C: 异丙托溴铵
- D: 茶碱

答案：D

21. 药品外观质量检查时，下列哪种药品需要进行澄明度检查

- A: 口服液
- B: 注射剂
- C: 片剂
- D: 糖浆剂

答案：B

22. 根据英国 Cochrane 中心联合循证医学和临床流行病学专家共同制定的循证医学证据分级标准未经严格论证或评估的专家意见在循证医学价中的证据级别属于 ()

- A: 5 级
- B: 3 级
- C: 1 级
- D: 2 级

答案：A

23. (2017 年真题) 高血压治疗药物选择时,ACEI 类药物禁用于 ()

- A: 痛风患者
- B: 心力衰竭患者
- C: 双侧肾动脉狭窄患者
- D: 胃溃疡患者

答案: C

24. 口服避孕药妇女所致心肌梗死, 在吸烟人群中危险性加大

- A: 药物的使用
- B: 药物制剂因素
- C: 生理因素
- D: 生活和饮食习惯

答案: D

25. 常年性过敏性鼻炎的主要吸入性变应原不包括

- A: 尘埃
- B: 真菌
- C: 动物皮毛
- D: 鱼虾

答案: D

26. 用药时须与食物同服的增强认知功能药物为 ()

- A: 卡巴拉汀
- B: 加兰他敏
- C: 多奈哌齐
- D: 苯海索

答案: A

27. 患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

A: 2 日

B: 3 日

C: 4 日

D: 5 日

答案：C

28. 队列研究试验结果属于循证医学证据级别

A: 3 级证据

B: 1 级证据

C: 4 级证据

D: 2 级证据

答案：D

29. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

A: 分泌性腹泻

B: 感染性腹泻

C: 动力性腹泻

D: 消化不良性腹泻

答案：B

30. 服用 α 受体阻断剂后，如果服用西地那非，建议服药间隔时间应为

A: 4 小时

B: 48 小时

C: 24 小时

D: 1 周

答案：A

31. 可卡因属于兴奋剂中的

A: β 受体阻断剂

B: 精神刺激剂

C: 利尿剂

D: 麻醉药品

答案：B

32. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 $\mu\text{mol/L}$ (正常值: 男性 180~440 $\mu\text{mol/L}$)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

A: 低血糖

B: ALT 升高

C: 腹胀

D: 心律失常

答案: C

33. 属于 A 级的药物是

A: 阿莫西林

B: 沙利度胺

C: 万古霉素

D: 葡萄糖

答案: D

34. 适用于年轻、震颤明显患者的是

A: 苯海索

B: 恩托卡朋

C: 左旋多巴

D: 司来吉兰

答案: A

35. 属于雄激素受体阻断剂的是 ()

A: 雌三醇

B: 氟他胺

C: 度他雄胺

D: 普适泰

答案: B

36. 在日常饮食因素中，对高血压患者用药疗效影响最大的是

A: 食醋

B: 食盐

C: 饮茶

D: 高糖

答案：B

37. 鼻窦炎的急性期应尽早采用足量的何种药物治疗

A: 抗菌药

B: 抗过敏药

C: 局部血管收缩剂

D: 解热镇痛药

答案：A

38. 成人(末梢血)白细胞(WBC)的正常值参考范围是

A: $(5.0 \sim 12.0) \times 10$

B: $(4.0 \sim 10.0) \times 10$

C: $(5.0 \sim 10.0) \times 10$

D: $(3.5 \sim 10.0) \times 10$

答案：B

39. 儿童 2 型糖尿病患者宜选用的药物是

A: 二甲双胍

B: 格列苯脲

C: 格列喹酮

D: 胰岛素

答案：A

40. 药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

A: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗

B: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

C: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

D: 没有临床症状，无需治疗

答案：A

41. 静脉滴速过快，易致红人综合征的药物是（）

A: 美罗培南

B: 万古霉素

C: 克拉霉素

D: 头孢哌酮

答案：B

42. 可待因属于

A: 麻醉药品

B: 利尿剂

C: β 受体阻断剂

D: 精神刺激剂

答案：A

43. ADR 报表内容填写不齐全、等待补充，或因果关系难以定论。缺乏文献资料佐证；其 ADR 因果关系可评价为

A: 很可能

B: 可能

C: 待评价

D: 可能无关

答案：C

44. 应在餐前服用的药物是

A: 胶体果胶铋胶囊

B: 氨茶碱片

C: 吡罗昔康片

D: 呋塞米片

答案：A

45. 静脉滴注过程中药液必须避光的药物是

A: 万古霉素

B: 青霉素

C: 两性霉素 B

D: 培氟沙星

答案：D

46. 某患者，女性，57 岁，高血压病史 20 年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持剂量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

A: 阿托品

B: 利多卡因

C: 肾上腺素

D: 苯妥英钠

答案：A

47. 焦虑障碍最常见的表现形式为

A: 社交焦虑障碍

B: 广泛性焦虑

C: 急性焦虑

D: 惊恐发作

答案：B

48. (2016 年真题) 患者接受顺铂化疗时，药师应重点监测的不良反应是 ()。

- A: 肝脏毒性
- B: 肺纤维化
- C: 心脏毒性
- D: 肾脏毒性

答案：D

49. (肾功能不全者的药物排泄机制) 有机酸排出减少

- A: 肾小管分泌减少
- B: 肾小球滤过减少
- C: 肾血流量减少
- D: 肾小管重吸收增加

答案：A

50. 黏液水肿性昏迷的治疗，首选药物为

- A: T
- B: L-T
- C: T
- D: L-T

答案：C

51. 对于化疗药物引起的呕吐，正确的用药方法对急性或延迟性恶心呕吐发作者，可给予

- A: 羧甲司坦
- B: 苯海拉明
- C: 阿瑞吡坦
- D: 昂丹司琼

答案：C

52. 门诊处方一般不超过几日

- A: 3 日常用量
- B: 15 日常用量
- C: 1 日常用量
- D: 7 日常用量

答案：D

53. 更年期综合征最具特征性的症状为

- A: 阴道萎缩
- B: 月经周期延长，经量减少，最后绝经
- C: 心悸、胸闷不适
- D: 潮热、出汗

答案：D

54. 对小动脉、小静脉和微静脉均有扩张作用，用于高血压危象、高血压脑病、恶性高血压等高血压急症的是

- A: 硝普钠
- B: 多巴酚丁胺
- C: 地高辛
- D: 氨力农

答案：A

55. 针对单纯严重乙醇中毒同时出现烦躁不安症状的患者，下列救治措施，错误的是()

- A: 肌肉注射维生素 B
- B: 静脉滴注维生素 C 注射液 1g

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 静脉注射 50%葡萄糖注射液 100ml 和胰岛素 20U

D: 静脉注射纳洛酮 0.4mg 和吗啡 20mg

答案：D

56. 体液占体重 75%~80%，水溶性药物血中峰浓度较高，即

A: 药物吸收

B: 药物分布

C: 药物排泄

D: 药物代谢

答案：B

57. 增加胃肠蠕动，影响同服药物吸收

A: 四环素+硫酸亚铁

B: 青霉素+丙磺舒

C: 多潘立酮+维生素 C

D: 西咪替丁+格列本脲

答案：C

58. 阿司匹林和华法林合用时易导致的不良反应是

A: 心跳加快

B: 粒细胞缺乏症

C: 出血

D: 戒断症状

答案：C

59. 有关依从性的说法错误的是

A: 采用缓释或控释制剂给药有利于提高患者的依从性

B: 患者如缺乏依从性可能会干扰临床试验结果

C: 依从性仅限于药物治疗

D: 药师加强对患者的用药指导可提高其依从性

答案：C

60. 下列哪种药对强心苷类中毒引起的快速型心律失常疗效最佳

A: 普萘洛尔

B: 普鲁卡因胺

C: 阿托品

D: 苯妥英钠

答案：D

61. 宜于清晨服用的药品是

A: 阿卡波糖

B: 甲氧氯普胺

C: 糖皮质激素

D: 洛伐他汀

答案：C

62. 细菌性尿路感染最常见的致病菌是()

A: 大肠埃希菌

B: 肠球菌

C: 铜绿假单胞菌

D: 克雷伯杆菌

答案：A

63. 贫血常出现

A: 血小板计数增高

B: 中性粒细胞增多

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 血红蛋白减少

答案：D

64. 过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎可选用 ()

A: 七叶洋地黄双苷滴眼液

B: 色甘酸钠滴眼液

C: 玻璃酸钠滴眼液

D: 氧氟沙星滴眼液

答案：B

65. 餐后服用可以增加吸收的药物是 ()

A: 磷酸铝凝胶

B: 头孢拉定胶囊

C: 维生素 B2 片

D: 左甲状腺素钠片

答案：C

66. 患者，男，70 岁，2 周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

A: 肝素

B: 氯吡格雷

C: 阿司匹林

D: 利伐沙班

答案：C

67. 不能耐受胃肠反应的贫血患者，铁剂适宜服用的时间为

- A: 餐前
- B: 睡前
- C: 餐后
- D: 两餐间

答案：C

68. 以延长患者生命时间为量化指标所开展的药物经济学评价方法属于

- A: 成本-效益分析
- B: 最小成本分析
- C: 成本-效用分析
- D: 成本-效果分析

答案：D

69. 治疗腹痛较重或反复呕吐性腹泻宜选用的药物是

- A: 泛昔洛韦
- B: 双歧杆菌
- C: 山莨菪碱
- D: 庆大霉素

答案：C

70. (2017 年真题) 下列药物中适宜在睡前服用的是 ()

- A: 泼尼松
- B: 多潘立酮
- C: 美洛昔康
- D: 辛伐他汀

答案：D

71. 强腐蚀剂中毒

- A: 不能导泻
- B: 不能用强利尿剂
- C: 禁止洗胃
- D: 不能催吐

答案：C

72. 泡腾片的使用正确的是

- A: 100~150ml 凉开/温水中浸泡
- B: 幼儿可自行服用
- C: 150~200ml 冷水中浸泡
- D: 50~100ml 热水中浸泡

答案：A

73. 清晨 5 时至中午 11 时最低，下午 2 时至次日凌晨 1 时最高，是指

- A: 肝脏合成胆固醇的规律
- B: 糖皮质激素的分泌规律
- C: 胃酸的分泌规律
- D: 胰岛 B 细胞的分泌规律

答案：C

74. 甲亢患者服用丙硫氧嘧啶治疗期间，应定期监测的是

- A: CK
- B: TC
- C: WBC
- D: BUN

答案：C

75. 医疗机构制剂申请要求临床研究受试例数不得少于

A: 40 例

B: 20 例

C: 80 例

D: 60 例

答案：D

76. 属于药物信息服务的最重要的部分的是

A: 确立有效的检索方法、查阅文献

B: 形成答案并以口头形式提供给询问者

C: 对文献进行评价、分析和整理

D: 对问题进行确定并归类

答案：B

77. 隔日一次的外文缩写

A: qod

B: qn

C: tid

D: q4h

答案：A

78. 可沉淀大部分有机物及无机物的洗胃液是

A: 3%~5%鞣酸溶液

B: 药用炭混悬液

C: 鸡蛋白

D: 1%氯化钠溶液

答案：A

79. 稳定型心绞痛缓解期的治疗选用

- A: 阿司匹林
- B: 氯贝丁酯
- C: 硝酸甘油
- D: 低分子肝素

答案：A

80. 因体内肝酶不足，易发生灰婴综合征

- A: 阿奇霉素
- B: 米诺环素
- C: 氯霉素
- D: 庆大霉素

答案：C

81. 抗结核治疗中，主要针对细胞内有抗菌杀菌作用的是

- A: 利福平
- B: 异烟肼
- C: 吡嗪酰胺
- D: 乙胺丁醇

答案：C

82. 对由营养不良、婴儿期所致的恶性贫血者应选用

- A: 富马酸亚铁
- B: 叶酸+维生素 B
- C: 维生素 K
- D: 甲磺酸去铁胺

答案：B

83. 患者男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 下肢深静脉血栓形成
- B: 肺动脉栓塞
- C: 病理性骨折
- D: 下肢动脉栓塞

答案：A

84. 若需要 70%的乙醇 1000ml，现有 95%的乙醇应如何配制

- A: 取 736.8ml95%的乙醇，加 1000ml 水
- B: 取 263.2ml95%的乙醇，加水稀释至 1000ml
- C: 取 736.8ml95%的乙醇，加水稀释至 1000ml
- D: 取 263.2ml95%的乙醇，加 1000ml 水

答案：C

85. 患者，男，68 岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天”入院。查体：体温 39.1℃，血压 138 / 80mmHg，心率 102 次 / 分，呼吸 32 次 / 分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 x 线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A: 支原体
- B: 铜绿假单胞菌
- C: 肺炎链球菌
- D: 衣原体

答案：B

86. 妇女口服避孕药致阿米替林清除率下降，引起药源性疾病的因素主要为

- A: 年龄因素
- B: 性别因素
- C: 遗传因素
- D: 基础疾病因素

答案：B

87. “发现并确认‘仙牛健骨颗粒’III期临床试验过程中连续发生严重不良事件，即暂停其新药试验”显示药物警戒的作用是

- A: 发现药品质量问题
- B: 药品上市后风险评估
- C: 发现与规避假、劣药品流入市场
- D: 药品上市前风险评估

答案：D

88. 患者，男，65岁，良性前列腺增生病史3年，高血压病史2年，咳嗽，咳痰10余年，伴哮喘，尤以活动后明显，因近半月咳嗽加重入院，主诉便秘，每周2次排便，长期口服硝苯地平控释片30mg/qd，血压控制良好。体格检查：体温36.6℃，P82次/分，R22次/分，端坐位，喘息貌，桶状胸，双肺叩诊过清音，散在干啰音，双肺下少许湿罗音，辅助检查：血常规WBC $11.2 \times 10^9/L$

- A: 每次10ml，每日三次，餐前给药
- B: 30ml，早餐时一次服用
- C: 30ml，晚餐时一次服用
- D: 每次10ml，每日三次，餐后给药

答案：B

89. 患者，女，23岁，正在服用短效复方口服避孕药，但避孕失败，怀疑与服用的其他药物有关，可能造成这种结果的药物是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/347022110051010024>