

主治医师（内科学）-历年真题精选(A1/A2 型题 2)

1、属于支气管扩张特异性的临床表现为

- A. 心慌、气短、咳粉红色泡沫痰
- B. 慢性咳嗽，咳白色黏痰，痰中带血
- C. 慢性咳嗽，咳白色泡沫痰
- D. X 线胸片显示左下肺纹理紊乱，多个不规则环状透光区伴卷发状阴影
- E. 多于中年后发病

2、某女性患者，61 岁，近 2 个月来感腹胀就诊。体检：巩膜不黄，腹壁静脉曲张，可见脐疝，脾大平脐，有腹水，下列哪种疾病门静脉高压最显著？

- A. 原发性胆汁性肝硬化
- B. 酒精性肝硬化
- C. 结节性肝硬化
- D. 血吸虫病性肝硬化
- E. 营养不良性肝硬化

3、有关急性水肿型胰腺炎的治疗，下列何种治疗方法最恰当

- A. 内科保守治疗
- B. Oddi 氏括约肌切开术

- C. 胰酶
- D. 手术
- E. 生长抑素

4、在急性胰腺炎发病过程中，起关键作用的酶是

- A. 溶脂酶
- B. 弹力蛋白酶
- C. 胰蛋白酶
- D. 磷脂酶 A
- E. 激肽酶

5、某男性患者，31 岁，患出血坏死性胰腺炎 2 周，经治疗，高热不退，持续腹痛。体检：上腹扪及块物。血淀粉酶 1000U（Somoyi 法），血白细胞 $14 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.85 (85%)，最可能的原因是

- A. 并发胰腺脓肿
- B. 合并胆石症
- C. 胰腺炎未能控制
- D. 胰腺假性囊肿形成
- E. 膈下脓肿

6、某男性患者，31 岁，上腹部剧痛 5 天，疑为胰腺炎，虽经治疗症状无明显好转。下列哪项实验室检查对判断胰腺炎的预后最有价值

- A. 血清淀粉酶
- B. 尿淀粉酶
- C. 血清脂肪酶
- D. 血清钙
- E. 淀粉酶、肌酐清除率比值

7、某男性患者，43 岁，上腹部痛 1 天就诊。血淀粉酶 600U (Somogyi 法)，诊断急性胰腺炎，经治疗痊愈，为预防本病复发，下列哪项措施是不恰当的

- A. 避免暴饮暴食
- B. 避免酗酒
- C. 忌食油腻食物
- D. 积极治疗胆石症
- E. 定期预防性应用抑肽酶

8、某男性患者，27 岁，排柏油便 2 天。既往无胃病及肝病史，近期无服药史。查体：血压 70/40mmHg，心率 120 次 / 分，腹平软，无压痛，肝脾未及，下列疾病哪种可能性大

- A. 胃溃疡
- B. 胃癌
- C. 十二指肠溃疡
- D. 应激性溃疡

E. 浅表性胃炎

9、某男性患者，29 岁，上腹痛 1 周，黑便 3 天，每天排便 3~4 次，量较多，头昏，乏力，心慌。有间断上腹痛 3 年。每次发病约持续 2~4 周方缓解。饮酒史 4 年，每天 2 两白酒，曾患乙肝，首先考虑的诊断是

- A. 肝硬化食管静脉曲张出血
- B. 消化性溃疡出血
- C. 急性胃黏膜病变出血
- D. 下消化道出血
- E. 食管贲门撕裂综合征出血

10、某男性患者，37 岁，昨夜饮白酒 500ml 后出现呕血而来急诊。查体：血压 100/60mmHg (13.3/8kPa)，脉搏 90 次 / 分，肝脾未及，明确诊断应首先进行的检查是

- A. 血常规
- B. 肝功能检查
- C. 大便隐血试验
- D. B 超检查
- E. 急诊胃镜检查

11、某女性患者，33 岁，反复中上腹疼痛 3 年余，多于进餐后 30 分

钟开始，至下一餐前缓解，劳累或季节改变可有疼痛加剧，近 2 天粪便黑色、成形。粪隐血(+++)，最可能的诊断是

- A. 胃溃疡并出血
- B. 十二指肠溃疡并出血
- C. 食管静脉曲张破裂并出血
- D. 急性胃黏膜病变
- E. 胃癌并出血

12、某男性患者，36 岁，阵发性右上腹痛 2 天，疼痛时大汗淋漓，向右肩放射，昨日大便呈黑色来诊。体检：巩膜轻度黄染，右上腹压痛，Murphy 征(+)，肝压叩痛(+)，脾未扪及。最可能的诊断是

- A. 胃溃疡并出血
- B. 十二指肠溃疡并出血
- C. 胃癌并出血
- D. 胆道出血
- E. 急性胃黏膜病变

13、1 型糖尿病与 2 型糖尿病的最主要区别是

- A. 发病年龄不同
- B. 对胰岛素的敏感性不同
- C. 胰岛素基础值及释放曲线不同
- D. 发生酮症酸中毒的倾向不同

E. 血糖稳定性不同(1993)

14、关于糖尿病某些检验的意义，下列哪项是正确的

A. 血清高密度脂蛋白胆固醇（主要是 HDL）水平与大血管病变的危险性呈负相关

B. 血清低密度脂蛋白水平与大血管病变的危险性呈负相关

C. 血清极低密度脂蛋白水平与大血管病变的危险性呈负相关

D. 外周血糖化血红蛋白的测定可反映近 2~3 周内血糖总的水平

E. 外周血糖化血浆白蛋白测定可反映近 2~3 个月血糖总的水平
(1996)

15、患者身高 170cm，体重 80kg，葡萄糖耐量试验结果为：空腹血糖 125mg/dl，1 小时 185mg/dl，2 小时 160mg/dl，3 小时 132mg/dl，单凭此结果，哪种情况的可能性大

A. 糖尿病

B. 单纯性肥胖

C. 脑垂体前叶功能亢进

D. 肾上腺皮质功能亢进

E. 以上均有可能(1992)

16、某男性患者，61 岁，进食后呕吐，腹泻、抽搐、昏迷入院。既往有肝大和谷丙转氨酶偏高病史。查体：心率 90 次 / 分，

BP20.27/11.73kPa (152/88mmHg), 肝右肋下可触及, 质中度硬, 表面平滑, 脾未触及, 血糖 900mg/dl, 血钠 158mmol/L, 血 CO 结合力 23, 血尿素氮 25mmol/L, 尿糖(+++), 尿酮体阴性, 下列哪项判断可能性最大

- A. 脑血管意外
- B. 糖尿病酮症酸中毒
- C. 高渗性非酮症糖尿病昏迷
- D. 肝性昏迷
- E. 尿毒症

17、Graves 病的心血管系统体征, 下列哪项是正确的

- A. 心动过速, 休息或熟睡时可减慢
- B. 心律失常中以心房颤动最为常见
- C. 心尖部常可闻及舒张期杂音
- D. 心脏可肥大和扩大
- E. 收缩压上升, 而舒张压不变或稍上升

18、Graves 病停用药物时, 下列哪项检查对判断该病的预后关系最大

- A. 甲状腺缩小, 杂音消失
- B. T 抑制试验可抑制
- C. T、L 及 rT 止常

- D. TSH 恢复正常
- E. 甲状腺刺激抗体阴性

19、Graves 病时的代谢，下列哪项不正确

- A. 肠道糖吸收增加
- B. 肝糖分解增加
- C. 尿肌酸排出增加
- D. 血总胆固醇增加
- E. 糖耐量异常

20、碘治疗甲亢，哪一项是不适宜的

- A. 抗甲状腺药物治疗无效者
- B. 甲亢手术后复发
- C. 甲亢合并妊娠
- D. 年龄 30 岁以上，病情中等度严重者
- E. 单个结节伴甲状腺功能亢进者

21、某女性患者 Graves 病患者，应用他巴唑治疗，一个月后症状缓解，但甲状腺肿及突眼加重，此时最适当的治疗措施是

- A. 加大他巴唑用量
- B. 改用丙硫氧嘧啶
- C. 应用 I 治疗

- D. 改用普萘洛尔
- E. 加小剂量甲状腺激素

22、一位疑有甲亢的病人，2 个月前曾作胆囊造影，为确定有无甲亢，下列哪项试验最有价值

- A. 甲状腺摄 I 率
- B. 血清蛋白结合碘
- C. 甲状腺激素结合试验
- D. T₃、T₄
- E. 以上均无价值

23、我国成人白血病最常见的是

- A. 急性淋巴细胞白血病
- B. 急性髓细胞性白血病
- C. 慢性髓性白血病
- D. 毛细胞白血病
- E. 慢性淋巴细胞白血病

24、下述各种组合中最多见的是

- A. 急性淋巴细胞白血病--绿色瘤
- B. 急性髓性白血病--脑膜白血病
- C. 急性早幼粒细胞白血病-DIC

- D. 慢性淋巴细胞白血病--急变
- E. 慢性髓性白血病--免疫功能异常

25、易并发 DIC 的白血病类型是

- A. AML-M
- B. AML-M
- C. AML-M
- D. AML-M
- E. B-ALL

26、治疗脑膜白血病首选药物为

- A. 环磷酰胺
- B. 三尖杉酯酶碱
- C. 长春新碱
- D. 甲氨蝶呤
- E. 柔红霉素

27、M3 诱导缓解最佳方案为

- A. DA 方案
- B. VP 方案
- C. HOAP 方案
- D. EA 方案

E. 全反式维 A 酸或联合砷剂

28、苯、烷化剂等化学物质有致白血病的作用，最常见的类型是

- A. 急非淋白血病
- B. 急性淋巴细胞白血病
- C. 慢性淋巴细胞白血病
- D. 慢性粒细胞白血病
- E. 毛细胞白血病

29、导致中枢神经系统白血病的白血病类型是

- A. AML-M
- B. AML-M
- C. AML-M
- D. AML-M
- E. B-ALL

30、急淋白血病应用 COAP 方案化疗出现血尿，应首先考虑

- A. DIC
- B. 泌尿系感染
- C. 血小板减少
- D. 白血病细胞形成血栓
- E. 环磷酰胺引起的出血性膀胱炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/347042010164006156>