

2023年公共卫生执业医师预测卷(一)

考试时间：【90分钟】

总分：【100分】

得分	评卷人

一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- () 1、女，28岁，诉妊娠4+月，昨搬重物后，腰酸，下坠感，今上午下腹始有阵痛，持续加重，半小时前阴道有流液，量较多，湿透内裤，急诊来院如确诊胎膜已破，此患者最适当处理是
- A、安胎
- B、刮宫
- C、用宫缩药物尽早使胚胎、胎盘组织排出
- D、抗炎
- E、输血
- () 2、在我国，社会医学是从下列哪个学科中分化并发展起来的
- A、医学社会学
- B、预防医学
- C、卫生管理学
- D、医学伦理学
- E、临床医学
- () 3、正常发育小儿，乳牙20枚，身高87cm，头围48cm，能跳，能表达自己的意愿。此小儿的年龄最大可能是
- A、1岁
- B、2岁
- C、3岁
- D、4岁
- E、6个月
- () 4、患者，男，50岁，因消化性溃疡出血曾在当地医院输血治疗，输血后全身出现荨麻疹，皮肤瘙痒等症，此次来我院接受手术治疗，备血应选用下列哪种制品
- A、红细胞悬液(添加红细胞)
- B、浓缩红细胞
- C、洗涤红细胞
- D、新鲜全血
- E、保存全血
- () 5、附睾炎多见的感染途径

、 1、 用十八步法时忌不起位

- A、直接感染
 - B、血行感染
 - C、淋巴感染
 - D、下行感染
 - E、精道逆行感染
- () 6、西方医学伦理学的奠基人是
- A、皮内尔
 - B、帕兹瓦尔
 - C、格里高利
 - D、胡弗兰德
 - E、希波克拉底
- () 7、重症肌无力
- A、中枢神经系统脱髓鞘疾病
 - B、周围神经系统脱髓鞘疾病
 - C、神经-肌肉传递障碍性疾病
 - D、血清钾低
 - E、黑质致密区含黑色素的神经元缺失
- () 8、男性，25岁，近3个月经常排便后滴鲜血，量不多。肛门指检无异常发现，肛镜检截石位见3、7点各有一突出肛管内暗红色圆形软结节，诊断为
- A、直肠息肉
 - B、肛裂
 - C、内痔
 - D、肛管癌
 - E、慢性痢疾
- () 9、患者男性，19岁，发热5天伴食欲缺乏2天急诊。检查：血压114/70mmHg，左脚趾甲沟部红肿破溃。血白细胞计数为 $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞为89%。
- [问题4][单选题]
- 经血培养证实金黄色葡萄球菌阳性。根据经验首选下列哪种抗生素治疗
- A、红霉素
 - B、环丙沙星
 - C、丁胺卡那霉素
 - D、万古霉素
 - E、甲硝唑

- () 10、血栓性外痔
- A、便血量多而鲜红
 - B、便血少而疼痛
 - C、便血污秽而腥臭
 - D、便血量多而色黑
 - E、便污血而疼痛
- () 11、肛瘻的类型颇多，其中常见者为
- A、全外瘻
 - B、单口外瘻
 - C、复杂性内外瘻
 - D、单纯性内外瘻
 - E、单口内瘻
- () 12、恶化型劳力性心绞痛
- A、近3个月内劳力诱发的心绞痛的频率和程度加重，对硝酸甘油的需求增加
 - B、心绞痛的发作与体力活动无关，可出现短暂ST段抬高
 - C、心绞痛的发作与劳累有关，其性质在1~3个月内无改变
 - D、既往无心绞痛或心肌梗死病史，近1~2个月内劳累时出现心绞痛
 - E、劳累和休息时均可出现的心绞痛
- () 13、患者男性，25岁，家住沈阳，于12月突然发病，表现为发冷、寒战、高热、大汗后而缓解，隔日发作一次，已10天。体检：脾肋下1cm，余未见异常，末梢血化验：
WBC $5.0 \times 10^9/L$ ，N0.68，L0.32，Hb100g/L，血培养（-）。患者同年8月曾去海南旅游半个月。
引起患者发热最可能的原因是下列哪种疾病
- A、疟疾
 - B、败血症
 - C、急性粒细胞型白血病
 - D、伤寒
 - E、急性血吸虫病
- () 14、供应大脑外侧面血液的血管是
- A、大脑中动脉
 - B、大脑后动脉
 - C、大脑前动脉
 - D、椎动脉

E、基底动脉

- () 15、患者女性，32岁。发现左乳房包块10天，无不适症状。查体：乳房视诊无异常，左乳房外上象限可触及1.5cm×1.5cm包块，质硬，不光滑，活动度良好，左腋窝未触及肿大淋巴结。钼靶X线检查示1.5cm×1cm密度增高影，周边有小毛刺，中央可见聚集细小钙化点。

[问题2][单选题]

术后10天拟行综合治疗。下列哪一种肿瘤标记物决定是否可用靶向治疗（曲妥珠单抗）

A、HER-2

B、P53

C、PR

D、ER

E、Ki67

- () 16、急性经口染毒，为了准确地将受试物染入消化道中，多采用

A、灌胃

B、喂饲

C、吞咽胶囊

D、鼻饲

E、饮水

- () 17、尿毒症患者血液系统的临床表现为

A、低色素、小细胞性贫血

B、白细胞出现中毒颗粒、核左移

C、血小板异常增多

D、贫血常为轻、中度

E、促红细胞生成素增加

- () 18、患者王小华，7岁，患急性淋巴性白血病，接受治疗3个月，病情没有改善。医生征求其父母的意见，是否愿意使用一种价格较贵的新药，其父母经过考虑，表示同意。因为从未使用过这种药物，也不知道这种药物的效果如何，所以医生决定谨慎使用，严格监控。结果表明，使用这种药物后的效果不明显。从医学伦理的角度分析，正确的是

A、效果不明显，与医师使用药物过于谨慎有关

B、因为使用药物后的效果不明显，所以医师的行为不道德

C、该项治疗属试验性治疗

D、医生使用新药，应该征得王小华本人的同意

E、医生使用新药应该征得主管领导批准

- () 19、男患者，病程4个月，头痛发病，入院前出现左侧肢体无力和呕吐，入院检查，意识清，眼底视乳头水肿，左上肢肌力IV级，腱反射活跃，病理征（+）。

诊断是

- A、脑梗死
 - B、脑出血
 - C、蛛网膜下腔出血
 - D、脑水肿
 - E、颅内压增高
- () 20、女，25岁。停经48天，1个月前曾不正规服用过探亲避孕片。现阴道少量出血5天，伴腹痛，B超示宫内早孕，下列哪项为最佳处理方案
- A、注射黄体酮
 - B、注射绒毛膜促性腺激素
 - C、吸宫术终止妊娠
 - D、中药安胎
 - E、注射催产素
- () 21、血源性肺脓肿最常见的病原菌是
- A、大肠杆菌
 - B、产气杆菌
 - C、肺炎杆菌
 - D、金黄色葡萄球菌
 - E、化脓性链球菌
- () 22、妊娠心力衰竭
- A、轻微活动即有胸闷，气急，静息心率114次 / 分，呼吸22次 / 分
 - B、心悸，气促，心界稍扩大，心尖区可闻及Ⅱ级柔和收缩期杂音
 - C、气急，发绀，不能平卧，肺底部持续湿啰音，颈静脉充盈
 - D、心悸，气急，心尖区可闻及Ⅲ级收缩期杂音及舒张期杂音
 - E、心悸，气短，自幼即发绀，从未参加体力劳动，能平卧，肺无啰音
- () 23、患者女性，26岁，停经45天，突感下腹坠痛及肛门坠胀感，少量阴道流血及头晕呕吐半天。体格检查：面色苍白，BP80/40mmHg，腹肌略紧张，下腹压痛。妇科检查：阴道少量血性物，宫颈举痛(+)穹窿饱满，子宫稍大，附件区触诊不满意。本例最恰当的处理是
- A、输血治疗
 - B、同时手术探查纠正休克
 - C、静脉输液
 - D、中医治疗
 - E、应用抗生素
- () 24、关于应激相关障碍，错误的是

- A、不等于应激
- B、只有应激反应超出一定强度时发生
- C、对个体社会功能产生影响
- D、对个体人际交往产生影响
- E、是一组功能性精神障碍

() 25、关于结核性脑膜炎脑膜病变改变不正确是

- A、炎症易在蛛网膜上腔聚集
- B、颅骨或中耳与乳突结核病灶直接蔓延侵犯脑膜
- C、渗出物可见上皮样细胞、朗格汉斯细胞
- D、蛛网膜下腔大量积聚渗出物
- E、软脑膜充血、渗出并形成许多结核结节

() 26、男性，在校大学生，2个月来无诱因出现颈部、腋下淋巴结肿大，体重明显下降达10kg，伴顽固性腹泻，每日十数次稀便，经询问病史，为同性恋。

[问题2][单选题]

首选的确诊检查是

- A、骨髓穿刺
- B、淋巴结穿刺或活检
- C、PPD试验
- D、血浓缩找恶性细胞
- E、抗HIV抗体用CD4+淋巴细胞计数

() 27、妇女，慢性肾炎3年，半年前因早孕行药物流产，现要求避孕指导，本例最正确的避孕措施应是

- A、皮下埋植避孕
- B、行输卵管结扎术
- C、安全期避孕
- D、阴茎套避孕
- E、口服短效避孕药

() 28、患者男性，50岁，烧伤患者，烧伤总面积35%，其中Ⅲ度烧伤面积10%。该患者属于下列哪种烧伤类型

- A、重度烧伤
- B、小面积烧伤
- C、轻度烧伤
- D、特重烧伤

E、中度烧伤

() 29、Ig分成K、 λ 两个型，其依据是

A、VL

B、CL

C、VH

D、CH

E、铰链区

() 30、多个样本均数之间的两两比较需用哪种方法

A、t检验

B、 t' 检验

C、方差分析

D、正态性检验

E、q检验

() 31、患者女性，20岁，因急性阑尾炎穿孔行阑尾切除术，术后3天切口红肿，有脓性分泌物，将缝线拆除后引出20ml脓液，10天后再次缝合而愈合，该患者切口愈合类型应记为

A、III/甲

B、III/丙

C、II/乙

D、III/乙

E、II/丙

() 32、医疗机构在药品购销中暗中给予、收受回扣或者其他利益的

A、由工商行政管理部门处1万元以上20万元以下的罚款

B、依法追究刑事责任

C、依法承担赔偿责任

D、由卫生行政部门吊销其执业证书

E、由卫生行政部门给予处分，没收违法所得

() 33、女性，19岁。平素体质差，曾有一次运动后晕厥史，查体发现胸骨左缘3~4肋间可闻及3/6级收缩期杂音，下蹲位时杂音减弱，应首先考虑的疾病是

A、先天性心脏病室间隔缺损

B、风湿性心脏病二尖瓣关闭不全

C、肥厚型梗阻性心肌病

D、扩张型心肌病伴心功能不全

E、限制型心肌病

- () 34、潜伏性感染意义是
- A、病原体与人体相互作用，保持暂时性平衡，当人体防御功能减弱时，可引起疾病
 - B、病原体与人体保持永久平衡，不引起症状
 - C、病原体侵入人体发生免疫反应，出现症状
 - D、病原体侵入人体引起免疫反应，不出现症状
 - E、病原体侵入人体后，只引起轻微症状
- () 35、剧烈运动时，少尿的主要原因是
- A、肾小球滤过膜面积减少
 - B、抗利尿激素分泌增多
 - C、肾小球毛细血管血压增高
 - D、醛固酮分泌增多
 - E、肾小动脉收缩，肾血流量减少
- () 36、冠心病发生后对患者进行康复体育治疗属于
- A、一级预防
 - B、二级预防
 - C、三级预防
 - D、个体治疗
 - E、社区综合防治
- () 37、兴奋-收缩耦联的关键因素是肌质中何种离子浓度升高
- A、 K^+
 - B、 Na^+
 - C、 Ca^{2+}
 - D、 Mg^{2+}
 - E、 Mn^{2+}
- () 38、出生后至1岁以内的城市婴儿需进行几次健康检查
- A、1年检查1次
 - B、每半年检查1次
 - C、每季度检查1次
 - D、每1个月检查1次
 - E、只在婴儿有病时，进行检查
- () 39、男，31岁。B超可见肾上盏结石0.6cm，经解痉，中西药治疗和大量饮水，现出现尿频，尿急，尿痛，现结石的位置应在

- A、肾盂
- B、输尿管中段
- C、膀胱
- D、输尿管膀胱入口段
- E、尿道

() 40、缺铁性贫血，铁剂治疗5至10天首先出现的治疗反应是

- A、红细胞总数增高
- B、血清铁增加
- C、骨髓外铁增加
- D、网织红细胞数升高
- E、红细胞平均直径恢复正常

() 41、免疫系统的三大功能为

- A、免疫应答、免疫记忆、免疫监视
- B、免疫防御、免疫记忆、免疫监视
- C、免疫防御、免疫自稳、免疫监视
- D、免疫应答、免疫自稳、免疫监视
- E、免疫防御、免疫应答、免疫记忆

() 42、失代偿性呼吸性碱中毒时

- A、血PH降低，PaCO₂降低，[HCO₃⁻]降低
- B、血PH降低，PaCO₂增高，[HCO₃⁻]增高
- C、血PH升高，PaCO₂降低，[HCO₃⁻]降低
- D、当PH升高，PaCO₂增高，[HCO₃⁻]增高
- E、血PH降低，PaCO₂增高，[HCO₃⁻]降低

() 43、治疗肝硬化腹腔积液

- A、休息，低盐食，限制入水量，补白蛋白，给利尿剂
- B、休息，高热量高蛋白饮食，保肝治疗
- C、休息，高热量限制蛋白质饮食，输入支链氨基酸
- D、休息，禁食，积极补足血容量及采用各种止血措施
- E、休息，控制输液量，纠正电解质紊乱，限制蛋白质

() 44、Osler结见于

- A、急性风湿热
- B、系统性红斑狼疮

- C、急性病毒性心肌炎
- D、亚急性细菌性心内膜炎
- E、结核性胸腺炎
- () 45、男性，48岁。肝硬化病史6年，1天前呕血500ml，出现神志淡漠。吐词不清且较缓慢，下列治疗措施哪种不合适
- A、用酸性溶液灌肠
- B、硫酸镁导泻
- C、甘露醇导泻
- D、肥皂水导泻
- E、支链氨基酸静脉输注
- () 46、女10岁，阵发性腹痛，黑便2天，双下肢散在出血点，双膝关节肿胀，腹软，右下腹压痛，白细胞 $12.5 \times 10^9 / L$ ，血小板 $200 \times 10^9 / L$ ，血红蛋白 $110 g / L$ ，尿常规：蛋白质(+)，红细胞(+) / HP，颗粒管型0~3个 / HP
- [问题2][单选题]
- 其常见的病因中除了
- A、细菌病毒
- B、食物，如鱼、牛奶
- C、寒冷因素
- D、某些药物
- E、放射性物质
- () 47、重性精神病指
- A、精神分裂症
- B、以上全是
- C、躁狂抑郁型精神病
- D、其他重型精神病在发病期间
- E、抑郁型精神病
- () 48、对慢性丙型肝炎的治疗，下列哪项不是应用干扰素治疗的目的
- A、抑制或清除血清和组织中HCV
- B、中止或减缓疾病，防止肝硬化
- C、使血清ALT恢复正常
- D、改善肝脏组织学病变
- E、消除血清中抗HCV
- () 49、患者女性，34岁，月经后4天突发高热，右下腹痛。妇检：子宫后倾、触痛，双侧附件增厚，压痛。应考虑的诊断是

- A、急性盆腔炎
- B、慢性盆腔炎
- C、生殖器结核
- D、输卵管卵巢囊肿
- E、子宫内膜异位症

() 50、男性，8月29日发病，发冷发热，头痛呕吐2次，3天后体温达39.5℃，精神不振，嗜睡，查体：嗜睡状态，颜面及结膜充血，腮腺不大，颈强，浅反射消失，深反射正常，尿蛋白(++++)，每高倍镜视野WBC0~5个，脑脊液压力正常，细胞数 $0.1 \times 10^9 / L$ ，糖2.77mmol / L，蛋白450mg / L，氯化钠1.24mmol / L，哪种诊断可能性大

- A、腮腺性脑炎
- B、结核性脑膜炎
- C、钩端螺旋体病（脑膜脑炎型）
- D、流行性感冒
- E、乙型肝炎

参考答案

一、单项选择题

1、C

【解析】难免流产一旦确诊，应尽早使胚胎及胎盘组织完全排出。早期流产应及时行负压吸宫术，对妊娠产物进行认真检查，并送病理检查。晚期流产，因子宫较大，吸宫或刮宫有困难者，可用缩宫素10单位加于5%葡萄糖液500ml内静脉滴注，促使子宫收缩。当胎儿及胎盘排出后需检查是否完全，必要时刮宫以清除宫腔内残留的妊娠产物。

2、B

【解析】本题考核的知识点属于社会医学的研究对象和内容，该题为记忆题。社会医学是医学与社会科学之间的交叉学科或者边缘学科，在有些国家中是与预防医学共同发展起来的，而在我国则是20世纪80年代初从预防医学中分化发展出来的。所以正确答案是B。医学社会学是社会学的分支学科，而卫生事业管理是与社会医学同时从预防医学中分化发展出来的，所以答案A和C都是错误的。

3、B

4、C

【解析】患者两次输血均出现过敏反应，而洗涤红细胞是去除了全部血浆和90%白细胞及血小板的血液制品，适用于多次输血后产生白细胞抗体的贫血病人，因此应选C。

5、E

【解析】急性附睾炎多见于中青年，常由泌尿系感染和前列腺炎、精囊炎扩散所致。感染多从输精管逆行传播，血行感染少见。

6、E

7、C

【解析】重症肌无力（MG）是一种由神经-肌肉接头处传递功能障碍所引起的自身免疫性疾病，临床主要表现为部分或全身骨骼肌无力和易疲劳，活动后症状加重，经休息后症状减轻。

8、C

【解析】内痔是柔软的静脉团，不易触及，因此肛门指检有可能正常。

内痔的临床表现：

1. 好发于肛门齿线以上，截石位于3、7、11点处。

2. 主要症状为大便时出血，或伴痔核脱出。

3. 一般无疼痛感觉，中、后期可有肛门坠胀、瘙痒。如痔核脱出嵌顿，可致肿痛，糜烂、坏死，甚至化脓，继发肛痿等症。

4. 一般无全身症状。后期有的可继发贫血、大便困难、小便不易排空等症状。

5. 本病需与下列肛门病相鉴别。

直肠息肉：为直肠下端所生之息肉，质薄嫩，根蒂细，色鲜红。一般单发，偶有一连串二、三十个之多，状如葡萄。大便时可能脱出肛门外，多见于儿童。

肛裂：好发于截石位6、12点处，肛门有裂口，出少量鲜血，大便时疼痛，有时便后疼痛可持续数小时。

脱肛：①直肠脱垂性脱肛：脱出物色淡红，形如螺旋而有层次，其质较硬。多见于体弱的小儿与老年人。②直肠粘膜脱垂性脱肛：有环状或部分粘膜脱垂，其色鲜红，质柔软，无痔的高突，微有渗血。多见于老年人，偶见于内痔手术后的患者。

9、D

【解析】金黄色葡萄球菌的有效药物为万古霉素。

10、E

【解析】血栓性外痔突出了疼痛的特点，外痔出现，大便可能有污血，选择E。

11、D

【解析】肛瘘按内外口分类1. 单口内瘘：又称为内盲瘘，只有内口与瘘管相通连，无外口。2. 内外瘘：瘘管有内外口，外口在体表，内口在肛窦，下有瘘管相通连。此种肛瘘最为多见。3. 单口外瘘：又称为外盲瘘，只存外口下连瘘管，无内口。此种肛瘘临床上较少见。4. 全外瘘：瘘管有两个以上外口相互有管道通连，而无内口，此种肛瘘临床上较少见。

12、A

【解析】稳定型心绞痛是指劳力型心绞痛发作的性质在1~3个月内无改变，即每日和每周疼痛发作次数大致相同，诱发疼痛的劳力和情绪激动程度相同，每次发作疼痛的性质和部位无改变，疼痛时限相仿(3~5分钟)，用硝酸甘油后在相同时间内产生疗效。恶化型心绞痛是指原为稳定型心绞痛的患者，在3个月内疼痛的频率、程度、时限、诱发因素经常变动，进行性恶化，需硝酸甘油量增多，起效慢，效果差，可发展为心肌梗死，也可逐渐恢复为稳定型。

13、A

【解析】间歇性寒战、高热、大汗，规律性发作为疟疾的典型表现，并且有海南旅游史。

14、A

15、A

【解析】对于乳腺癌的靶向治疗，指南中只提到一种：曲妥珠单抗对HER2过度表达的患者有一定效果，可降低乳腺癌的复发率，已用于临床。其他不做为常规要求。

16、A

17、D

【解析】尿毒症患者血液系统的临床表现主要以贫血为主。

18、C

19、E

【解析】患者表现为“头痛、呕吐、视乳头水肿”，这三种表现被称为颅内高压三主征。

20、C

【解析】本例1个月前曾不正规服用过探亲避孕片，在服药的情况下发生了妊娠，存在药物引起胚胎畸形的可能，又出现了先兆流产的征象，以终止妊娠为宜。

21、D

【解析】教材中有如下描述：血源性肺脓肿：肺外部位的感染病灶的细菌或脓毒性栓子经血行途径播散至肺部，导致小血管栓塞，肺组织化脓性炎症坏死而形成肺脓肿。病原菌以金黄色葡萄球菌多见，其肺外病灶多为皮肤创伤感染、疖肿、化脓性骨髓炎等。泌尿道、腹腔或盆腔感染产生的败血症所致肺脓肿的病原菌常为革兰阴性杆菌或少数为厌氧菌。病变常为多发性，常发生于两肺的外周边缘部。

22、C

【解析】妊娠心力衰竭的临床表现为气急，发绀，不能平卧，肺底部持续湿啰音，颈静脉充盈

23、B

【解析】异位妊娠的主要症状为：停经、腹痛、阴道流血、晕厥与休克，下腹包块。考虑有内出血行后穹窿穿刺抽出不凝血，应纠正休克同时施行剖腹探查。

24、B

【解析】急性应激障碍：以急剧、严重的精神打击作为直接原因。在受刺激后立刻（1小时之内）发病。表现有强烈恐惧体验的精神运动性兴奋，行为有一定的盲目性；或者为精神运动性抑制，甚至木僵。如果应激源被消除，症状往往历时短暂，预后良好，缓解完全。

25、A

【解析】结核菌使软脑膜弥漫充血、水肿、炎性渗出，并形成许多结核结节。蛛网膜下腔大量炎性渗出物积聚，因为重力、脑底池腔大、脑底血管周围的毛细血管吸附作用等，是炎症渗出物易在脑底诸池聚集。渗出物中可见上皮样细胞、朗汉斯细胞及干酪坏死。

26、E

【解析】确诊应检测抗体及其CD4+淋巴细胞计数。

27、B

【解析】新版教材中的输卵管结扎术的适应症：要求接收绝育手术且无禁忌症者，患有严重全身疾病不宜生育者，患者患有慢性肾炎，所以考虑应该选B项相对合适。

28、A

【解析】烧伤总面积30%~50%，或Ⅲ度烧伤面积10%~20%，或烧伤面积虽不足30%，但已发生休克等并发症、呼吸道烧伤或有较重的复合伤的为重度烧伤。

29、B

【解析】H链（重链）和L链（轻链）的C区分别称为CH和CL，它是Ig分类和分型的依据，也是制备第二抗体的抗原基础。不同类IgH链CH长度不一。

轻链：IgL链的分子量约为25KD，由214个氨基酸残基组成。

型：根据L链恒定区氨基酸序列及抗原性不同可分为 κ 型和 λ 型，相应的Ig分别被命名为 κ 型和 λ 型。五类Ig中每类Ig都可以有 κ 型和 λ 型。根据 λ 链恒定区氨基酸序列的差异， λ 链可分为 $\lambda 1-\lambda 4$ 四种亚型。

重链：IgH链的分子量约为50~75KD，由450~550个氨基酸残基组成。

类：根据H链恒定区氨基酸序列及抗原性不同，H链可分为 γ 、 α 、 μ 、 δ 和 ϵ 五类，相应的Ig分别被命名为IgG、IgA、IgM、IgD和IgE。

亚类：同一类Ig根据其铰链区氨基酸组成、H链二硫键的数目和位置的差别，又可分为不同的亚类。IgG可分为IgG1-4四个亚类，IgA可分为IgA1-2二个亚类。

30、E

31、B

【解析】1、清洁切口，用“Ⅰ”代表，是指非外伤性的、未感染的伤口；手术未进入呼吸道、消化道、泌尿生殖道及口咽部位。既指的是缝合的无菌切口，如甲状腺次全切除术等。

2、可能污染的切口，用“Ⅱ”代表，是指手术时可能带有污染的缝合切口，如胃大部切除术等。皮肤不容易彻底灭菌的部位、6小时内伤口经过清创术缝合、新缝合的切口又再度切开者，都属此类。

3、污染切口，用“Ⅲ”代表，是指临近感染区或组织直接暴露感染物的切口，如化脓性阑尾炎手术、肠梗阻坏死的手术、局部含有坏死组织的陈旧性创伤伤口等。

愈合的分级也有三：

1、甲级愈合，用“甲”代表，是指愈合优良，没有不良反应的初期愈合。

2、乙级愈合，用“乙”代表，是指愈合欠佳，愈合处有炎症反应，如红肿、硬结、血肿、积液等但未化脓。

3、丙级愈合，用“丙”代表，是指切口化脓，需切开引流。

32、A

33、C

【解析】伴有心室流出道梗阻的肥厚型梗阻性心肌病患者，可于胸骨左缘3~4肋间闻及较粗糙的喷射性收缩期杂音。下蹲位可增加心脏后负荷，减弱心脏杂音。可在起立或运动时出现眩晕，甚至神志丧失等。室间隔缺损也可于胸骨左缘3~4肋间闻及的杂音与肥厚型梗阻性心肌病类似，但室间隔缺损的杂音在下蹲位时不会减弱。二尖瓣关闭不全可于心尖部闻及收缩期吹风样杂音。扩张型心肌病伴心功能不全者听诊心音减弱，常闻及第三或第四心音，有时可于心尖部闻及收缩期杂音。限制型心肌病体格检查可见颈静脉怒张，心脏听诊常可闻及奔马律。

34、A

【解析】指病原体感染人体后，由于机体的免疫功能不足以清除病原体，而将其局限化，但不引起显性感染，病原体长期潜伏于机体内，一旦人体免疫功能下降，才引起显性感染，如单纯疱疹、带状疱疹、疟疾、结核等。潜伏性感染一般不排出病原体，因此与病原携带状态不同。

35、E

【解析】当人体剧烈运动的时候，交感神经兴奋，肾脏血管收缩，从而导致肾血流量减少，故导致尿量减少

36、C

【解析】1~5题是理解型判断题。适度体力活动预防高血压、全部人群戒烟预防肺癌均属于对危险因素进行控制进而从根本上预防疾病的发生，因此属于一级预防；对亲属有糖尿病者进行血糖筛检和宫颈脱落细胞筛检宫颈癌均属于对疾病进行早发现、早诊断，因此属于二级预防；冠心病发生后对患者进行康复体育治疗则属于康复预防，因此属于三级预防。

37、C

【解析】突触后膜（终板膜）兴奋时，肌膜上的动作电位可沿T管膜传播至肌细胞内部，激活T管膜和肌膜上的L型钙通道；使肌浆网释放大量的钙离子进入细胞浆，引发肌丝滑行，肌肉收缩。

38、C

【解析】从出生至1岁以内的城市婴儿共需进行5次体检。第1次体检为出生后第42天，第2次体检是在4个月，第3次体检是在6个月时，第4次体检是在9个月时，第5次体检是在1周岁时，平均每季度检查一次。

39、D

【解析】在输尿管中、上段部位的结石嵌顿堵塞或结石在下移过程中，常引起典型的患侧肾绞痛和镜下血尿。疼痛可向大腿内侧、睾丸或阴唇放射。常伴有恶心、呕吐，有时血尿为肉眼可见。输尿管膀胱壁间段最为狭小，结石容易停留。由于输尿管下段的肌肉和膀胱三角区相连，并且直接附着于后尿道，故常伴发尿频、尿急和尿痛的特有症状。在不影响尿流通过的较大结石，可仅有隐痛，血尿也轻。在孤立肾的输尿管结石阻塞或双侧输尿管阻塞，或一侧输尿管结石阻塞使对侧发生反射性无尿等情况，都可发生急性无尿，甚至肾功能不全。所以选D

40、D

【解析】口服铁剂有效的表现先是外周血网织红细胞增多，高峰在开始服药后5~10天，2周后血红蛋白浓度上升，一般2个月左右恢复正常。

41、C

【解析】免疫系统有三大功能：①免疫防御：是指机体防止外界病原体的入侵及清除已入侵的病原体及其他有害物质。②免疫自稳：是指机体通过自身免疫耐受和免疫调节达到免疫系统内环境的稳定。③免疫监视：是指机体随时发现和清除体内出现的“非己”成分。

42、C

【解析】代谢性酸中毒：因血浆 HCO_3^- 下降造成的酸中毒。（注：通过题中提到的 HCO_3^- 的值进行判断）

代谢性碱中毒：因血浆 HCO_3^- 增多造成的碱中毒。（注：通过题中提到的 HCO_3^- 的值进行判断）

呼吸性酸中毒：因 H_2CO_3 增多使PH值下降。（注：通过题中提到的 PaCO_2 的值来判断）

呼吸性碱中毒：因 H_2CO_3 下降使PH值升高。（注：通过题中提到的 PaCO_2 的值来判断）

43、A

【解析】肝硬化腹水的治疗：除了卧床休息、增加营养、加强支持疗法外，应注意以下几个方面：

（1）限制钠、水的摄入：腹水患者必须限制盐摄入量，每日钠盐摄入量在60～90mmol/d（500～800mg）（食盐1.5～2.0g/d）。进水量控制在1000ml / d左右。大量腹水或明显低钠血症者应限制在500ml / d以内。

（2）利尿剂：通常应用的有潴钾利尿剂（如螺内酯、氨苯蝶啶）和排钠利尿剂（如呋塞米、氢氯噻嗪），目前认为，联合应用螺内酯和呋塞米可发挥协同作用，并能减少电解质紊乱的发生。利尿剂量过大、利尿速度过快可诱发肝性脑病和肝肾综合征。

（3）放腹水加输白蛋白：可以治疗难治性腹水，比大剂量应用利尿剂疗效好。

（4）腹水浓缩回输：可部分清除潴留的钠和水分、提高血浆蛋白浓度、增加有效循环血量、改善肾血循环。适应证为难治性腹水，禁忌证是感染性腹水。

44、D

【解析】在人体的指尖、足趾、大小鱼际肌处的蓝色或者粉红色并且有压痛的小结节称为Osler小结，常见于感染性心内膜炎。

45、D

【解析】肝性脑病灌肠或导泻清除肠内积食或积血，口服或鼻饲25%硫酸镁30～60ml导泻，灌肠禁用碱性肥皂水，而用生理盐水或弱酸性溶液，如生理盐水100ml加白醋30ml作保留灌肠，保持肠道呈酸性环境。

46、E

【解析】过敏性紫癜的常见病因包括细菌，病毒及寄生虫，食物、药物或寒冷刺激等。

47、B

48、E

【解析】抗HCV，即丙肝抗体，是目前诊断丙型肝炎的主要指标。当HCV RNA转阴后，抗-HCV仍然可以阳性，可持续数年不消失。

49、A

【解析】急性盆腔炎发病时下腹痛伴发热，若病情严重可有寒战、高热、头痛、食欲不振。考虑为A。

50、C

【解析】乙型肝炎：多有肝损害的表现。腮腺性脑炎：有腮腺损害表现。结核性脑膜炎：有结核病史，低热盗汗乏力。流行性感冒：一般症状轻微。

脑膜脑炎型起病后2～3日左右，出现剧烈头痛、频繁呕吐、嗜睡、谵妄、或昏迷，部分患者有抽搐、出现瘫痪等，颈项强直，克氏征与布氏征均阳性。重者可发生脑水肿，脑疝导致呼吸衰竭。脑脊液外观呈毛玻璃状，细胞数为 5×10^8 /L以下，以淋巴细胞为主，蛋白含量增多，糖正常或稍低，氯化物正常。脑脊液可分离出钩体。单纯脑膜炎者预后较好。脑炎或脑膜炎者病情较重。

2023年公共卫生执业医师预测卷(二)

考试时间：【90分钟】

总分：【100分】

得分	评卷人

一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- () 1、男性，30岁，1周来发热伴皮肤出血点。化验血呈全血细胞减少，骨髓检查增生极度活跃，原始细胞占骨髓非红系有核细胞的40%，各阶段粒细胞占50%，各阶段单核细胞占30%，诊断急性白血病，其FAB分类的类型是
- A、M1
- B、M2
- C、M4
- D、M5
- E、M6
- () 2、肾母细胞瘤术前化疗首选药物为
- A、放线菌素D
- B、多柔比星
- C、顺铂
- D、依托泊苷
- E、表柔比星
- () 3、下列哪项不符合前置胎盘的表现
- A、先露下降受阻
- B、无痛性阴道流血
- C、子宫下段闻及胎盘血流音
- D、子宫张力较高，胎心音不易闻及
- E、宫底高度与孕周相符
- () 4、确诊结核性脑膜炎最可靠的依据为
- A、脑膜刺激征阳性
- B、胸部X线有原发结核病灶
- C、脑脊液糖和氯化物含量同时减低
- D、脑脊液查到结核杆菌
- E、OT试验阳性
- () 5、关于有机磷农药在体内的分布。表述不正确的是

- A、以肝含量最高
 - B、迅速分布全身
 - C、可透过血脑屏障
 - D、以中枢神经系统内含量最高
 - E、部分可透过胎盘屏障
- () 6、关于微核的描述不正确的是
- A、实质是DNA
 - B、是丢失的染色体断片
 - C、存在于细胞核中
 - D、存在于细胞质中
 - E、是丢失的染色体
- () 7、下列有关生存时间的定义中不正确的是
- A、流行病学研究中，从开始接触某危险因素至某病发病所经历的时间
 - B、乳腺增生症妇女药物治疗或理疗后阳性体征消失至首次复发的时间
 - C、肺癌患者从手术治疗开始到死亡的时间
 - D、急性白血病患者从治疗开始到缓解的时间
 - E、一个人实际存活的时间
- () 8、肾对葡萄糖的重吸收发生于
- A、近球小管
 - B、髓祥
 - C、远球小管
 - D、集合管
 - E、各段肾小管
- () 9、关于膝关节韧带损伤，下述错误的是
- A、膝关节侧副韧带出有明显压痛
 - B、侧副韧带损伤侧方应力试验阳性、
 - C、抽屉试验可以判断前后交叉韧带损伤
 - D、X线两侧间隙相差8mm提示完全断裂
 - E、男性多见
- () 10、经期腹痛，子宫一侧或双侧可及肿物，活动受限，拟诊为
- A、卵巢囊肿蒂扭转
 - B、急性盆腔炎

C、急性阑尾炎

D、宫外孕

E、卵巢巧克力囊肿

() 11、患儿女，7岁，精神食欲差5天，恶心伴呕吐3天，尿黄2天入院。入院查体：神志清楚，皮肤巩膜轻度黄疸，心肺（-），腹部平软，肝肋下3cm、脾肋下1cm，移动性浊音（-）。最可能的诊断是

A、急性黄疸型庚型肝炎

B、急性黄疸型乙型肝炎

C、急性黄疸型甲型肝炎

D、急性黄疸型丙型肝炎

E、急性黄疸型丁型肝炎

() 12、有机磷农药中毒的机制是

A、抑制磷酸二酯酶

B、抑制单胺氧化酶

C、抑制胆碱酯酶

D、抑制腺苷酸环化酶

E、直接激动胆碱受体

() 13、患者，男，65岁，肺癌晚期，顺铂等药物化疗后，突发尿量减少，可能是发生以下哪种情况

A、急性肾小球肾炎

B、急性肾小管坏死

C、急进行肾炎

D、尿路结石

E、急性肾盂肾炎

() 14、女10岁，阵发性腹痛，黑便2天，双下肢散在出血点，双膝关节肿胀，腹软，右下腹压痛，白细胞 $12.5 \times 10^9 / L$ ，血小板 $200 \times 10^9 / L$ ，血红蛋白 $110 g / L$ ，尿常规：蛋白质（+），红细胞（+）/HP，颗粒管型0~3个/HP

[问题4][单选题]

如上述治疗无效可合用

A、环磷酰胺

B、甲氧咪胍

C、输血

D、维生素C

E、阿托品

- () 15、关于 I 型前列腺炎说法正确的是
- A、致病菌多为链球菌
 - B、常发病突然，表现为寒战，发热，疲乏无力等全身症状
 - C、慢性细菌性前列腺炎
 - D、慢性骨盆疼痛综合征
 - E、无临床症状
- () 16、戒烟项目中完全不吸烟属于 ()
- A、无转变打算阶段
 - B、打算转变阶段
 - C、转变准备阶段
 - D、转变行为阶段
 - E、行为维持阶段
- () 17、大肠的运动形式不包括
- A、袋状往返运动
 - B、分节运动
 - C、蠕动
 - D、多袋推进运动
 - E、紧张性收缩
- () 18、男，27岁，近日来出现午后低热。阴囊疼痛，皮肤发红、发热、疼痛，并沿精索、下腹部以及会阴部放射。?检查阴囊部可触及寒性脓肿，首先采取的治疗措施
- A、脓肿切开引流
 - B、热敷
 - C、热水坐浴
 - D、理疗
 - E、附睾切除
- () 19、特异性免疫应答的特点不具有
- A、特异性
 - B、记忆性
 - C、识别自己非己
 - D、非特异性
 - E、耐受性
- () 20、由交感缩血管神经末梢释放的主要神经递质是
- A、普萘洛尔

- B、去甲肾上腺素
- C、左旋多巴
- D、酚妥拉明
- E、肾上腺素

() 21、于强心苷，哪一项是错误的

- A、有正性肌力作用
- B、有正性心肌传导功能
- C、有负性频率作用
- D、安全范围小
- E、用于治疗心衰，也可治疗室上性心动过速

() 22、糖蛋白的多肽链骨架上共价连接了一些寡糖链，其中常见的单糖有7种，下列单糖中不常见的单糖是

- A、葡萄糖
- B、半乳糖
- C、果糖
- D、甘露糖
- E、岩藻糖

() 23、一患痔多年的病人突感肛门剧痛，排便，走路，咳嗽时疼痛加剧。检查：肛门部有一圆形肿块突出。与周围分界清楚，触痛，应诊断为

- A、内痔嵌顿
- B、直肠息肉脱出
- C、肛门旁皮下脓肿
- D、外痔血栓形成
- E、外痔合并感染

() 24、最易引起电解质紊乱的药物是

- A、氢氯噻嗪
- B、螺内酯
- C、呋塞米
- D、氨苯蝶啶
- E、乙酰唑胺

() 25、胃溃疡大出血

- A、三腔双囊管压迫

- B、胃大部切除
- C、服甲氧咪呱
- D、肝动脉结扎
- E、高选择迷走神经切除

() 26、在下列氨基酸中碱性氨基酸是

- A、丝氨酸
- B、赖氨酸
- C、谷氨酸
- D、酪氨酸
- E、苏氨酸

() 27、化学毒物经下列哪一种生物转化反应后水溶性降低

- A、葡萄糖醛酸结合
- B、羟化作用
- C、硫酸结合
- D、甲基化作用
- E、谷胱甘肽结合

() 28、关于癌基因的叙述哪项是正确的

- A、是致癌病毒具有的某些核苷酸序列
- B、能称作细胞癌基因
- C、不需活化即能表达
- D、正常人类基因组不存在
- E、永远高表达的基因

() 29、鼠疫耶尔森氏菌的致病物质不包括

- A、F1荚膜抗原
- B、毒力质粒编码的V / W抗原
- C、外膜抗原
- D、鼠毒素
- E、透明质酸酶

() 30、已知某医院2007年全年住院患者总数，该年已经上报的医院感染病例数，漏报医院感染病例数，新发生医院感染例次数，续发病例数以及接触者总数，则下列指标中不能计算的是

- A、医院感染漏报率
- B、医院感染发生率

- C、医院感染患病率
 - D、医院感染续发率
 - E、医院感染例次发生率
- () 31、当细胞外 Ca^{2+} 浓度降低时，主要引起心肌
- A、收缩力降低
 - B、舒张期延长
 - C、收缩力增强
 - D、舒张期缩短
 - E、传导速度加快
- () 32、我国法定传染病报告属于
- A、主动监测
 - B、被动监测
 - C、哨点监测
 - D、以实验室为基础的监测系统
 - E、以医院为基础的监测系统
- () 33、胃大部分切除的患者出现严重贫血，表现为外周巨幼红细胞增多，其主要原因是下列哪项减少
- A、 HCl
 - B、粘液
 - C、胃蛋白酶原
 - D、 HCO_3^-
 - E、内因子
- () 34、男59岁，约有10年高血压病史，经强心、利尿治疗好转，但近日病情加重，出现心慌，气短，下肢水肿加重。诊断为原发性高血压，慢性心功不全，心肌肥大，最好加用哪种药物继续治疗
- A、卡托普利
 - B、硝苯地平
 - C、肼屈嗪
 - D、哌唑嗪
 - E、氨茶碱
- () 35、关于消化性溃疡下述哪些情况为手术适应证
- A、上消化道出血
 - B、反复发作的十二指肠球溃疡

- C、胃溃疡疑癌变
 - D、并不全幽门梗阻
 - E、复合溃疡
- () 36、小儿化脓性脑膜炎，最可靠的诊断依据是
- A、脑脊液细胞数显著增加
 - B、糖定量降低
 - C、脑脊液检菌阳性
 - D、脑膜刺激征阳性
 - E、脑脊液外观混浊或脓性
- () 37、吗啡对中枢神经系统的作用是
- A、镇痛，镇静，镇咳，缩瞳，致吐
 - B、镇痛，镇静，镇咳，呼吸兴奋
 - C、镇痛，镇静，止吐，呼吸抑制
 - D、镇痛，镇静，扩瞳，呼吸抑制
 - E、镇痛，镇静，催眠，呼吸抑制，止吐
- () 38、原发性高血压的并发症中不包括
- A、高血压危象
 - B、高血压脑病
 - C、脑血管病
 - D、心力衰竭
 - E、骨质疏松
- () 39、环境因素对生殖健康影响的特点是
- A、可通过妊娠母体直接干扰胚胎正常发育
 - B、可诱发生殖细胞突变
 - C、可影响生殖过程的任何一个环节
 - D、以上全是
 - E、可通过胎盘影响胚胎发育或致癌
- () 40、体循环或肺循环出现栓塞频率较高的是
- A、酒精性心肌病
 - B、肥厚型心肌病
 - C、扩张型心肌病
 - D、围生期心肌病

E、病毒性心肌炎

- () 41、当两个样本例数均为20，且具有正态性和方差齐性的条件，则两均数比较可用哪种方法
- A、两独立样本比较的t检验
- B、u检验
- C、方差齐性检验
- D、 t' 检验
- E、正态性检验
- () 42、下列实验室检查结果中，支持再生障碍性贫血的是
- A、外周血出现有核红细胞
- B、外周血淋巴细胞比例减低
- C、中性粒细胞碱性磷酸酶积分减低
- D、骨髓中巨核细胞减低
- E、骨髓中非造血细胞减低
- () 43、必要病因对疾病的作用在时间上必须在疾病发病
- A、之后
- B、同时
- C、之前后
- D、之前
- E、全过程
- () 44、川崎病发病早期10以内天宜给予何种药物来迅速退热和预防冠状动脉病变的发生
- A、阿司匹林
- B、抗生素
- C、糖皮质激素
- D、注射丙种球蛋白
- E、肝素
- () 45、肠间脓肿
- A、指脓液被包围在肠管、肠系膜与网膜之间
- B、只会单发
- C、病人出现类结核性腹膜炎症状
- D、不可应用物理热透治疗
- E、腹部无法扪及包块
- () 46、单纯指深屈肌腱断裂后，临床可发生

- A、手指出现垂状指
- B、手指的伸，屈功能丧失
- C、手指屈曲功能丧失
- D、手指远位指间关节屈曲功能丧失
- E、手指过伸畸形

() 47、男性，56岁，食欲减退半年，巩膜轻度黄染，肝肋下及边。血红蛋白80g/L，红细胞 $3.1 \times 10^{12}/L$ 。网织红细胞2%。骨髓象示幼红细胞增生活跃。中、晚幼红细胞为主。幼红细胞体积小。胞质少、边缘不整。粒细胞系及巨核细胞系正常。
诊断

- A、缺铁性贫血
- B、溶血性贫血
- C、肝病性贫血
- D、巨幼红细胞性贫血
- E、再生障碍性贫血

() 48、重症肌无力的主要病理生理机制是

- A、乙酰胆碱释放量增多
- B、乙酰胆碱释放量减少
- C、乙酰胆碱受体数目增多
- D、乙酰胆碱受体数目减少
- E、乙酰胆碱抗体数目减少

() 49、有机磷农药中毒所致的呼吸肌麻痹用

- A、阿托品
- B、新斯的明
- C、可拉明
- D、碳酸氢钠
- E、解磷定

() 50、避免儿童青少年“移情”咨询者，遵循了心理咨询的哪条原则

- A、情感自限的原则
- B、保密的原则
- C、自愿的原则
- D、限时的原则
- E、延期决定的原则

参考答案

一、单项选择题

1、C

【解析】M4原始细胞占骨髓非红系有核细胞的30%以上，各阶段粒细胞30%~80%，各阶段单核细胞占大于20%。

2、A

【解析】肾母细胞瘤术前化疗首选药物有放线菌素D、长春新碱，两药联合应用疗效更好。

3、D

【解析】子宫张力较高，胎心音不易闻及是胎盘早剥的特点，不是前置胎盘的特点，故D答案错误。其他四项都是前置胎盘的特点。

4、D

【解析】结核性脑膜炎的脑脊液查到结核菌是诊断结脑可靠的依据。

5、D

6、C

7、E

8、A

【解析】肾小管包括近端小管、髓袢、远端小管。葡萄糖的吸收主要是在近端小管

9、D

【解析】X线两侧间隙相差8mm提示部分断裂，>12mm为完全断裂，<4mm为轻度扭伤。

10、E

【解析】经期腹痛，子宫两侧有肿物，首先考虑子宫内膜异位症时的卵巢子宫内膜异位囊肿，即卵巢巧克力囊肿。

11、C

【解析】患儿是以消化道症状严重，出现尿黄，肝脏肿大，有黄疸，考虑是传染病疾病。

甲型病毒性肝炎，简称甲型肝炎、甲肝，是由甲型肝炎病毒（HAV）引起的，以肝脏炎症病变为主的传染病，主要通过粪-口途径传播，临床上以疲乏，食欲减退，肝肿大，肝功能异常为主要表现，部分病例出现黄疸，主要表现为急性肝炎，无症状感染者常见。

12、C

【解析】急性有机磷中毒，主要为抑制胆碱酯酶的活力而使乙酰胆碱增多而积聚，导致出现胆碱能神经兴奋，继而抑制和衰竭，如抢救不及时可在短时间内发生呼吸衰竭而死亡

13、B

【解析】抗肿瘤药物顺铂等重金属有肾毒性，突发尿量减少，可能引起急性肾小管坏死。

14、A

【解析】如果经激素治疗效果不佳或近期内反复发作者，可酌情使用免疫抑制剂，如：环磷酰胺等。

15、B

【解析】I型前列腺炎为急性细菌型前列腺炎，常出现发病突然，寒战高热等全身症状。

16、D

17、E

【解析】大肠的运动形式有袋状往返运动、分节运动、蠕动和多袋推进运动

18、A

【解析】急性附睾炎，附睾结核形成寒性脓肿，首先应切开引流。

19、D

【解析】特异性免疫应答的特点

1. 特异性(specificity)

2. 记忆性(memory)

3. 耐受性(immunotolerance)

4. 获得性(adaptiveness)

5. 排他性(discrimination)

6. 多样性(diversity)

7. 转移性(transferability)

20、B

【解析】去甲肾上腺素可非选择性激动 α_1 和 α_2 受体，强烈收缩小动

脉和小静脉，使外周阻力增高，故临床上常作为升压药使用。普萘洛尔为非选择性 β 受体阻断药，对 β_1 和 β_2 受体的选择性很低。用药后心率减慢，心肌收缩力和心输出量降低。交感缩血管神经末梢释放的主要神经递质是去甲肾上腺素。

21、B

【解析】强心苷应为负性传导作用因为，洋地黄的电生理作用，治疗剂量下，强心苷是抑制心脏传导的，所以为负性传导

22、C

【解析】C不常见，组成糖蛋白糖链的单糖有7种：葡萄糖，半乳糖，甘露糖，N-乙酰氨基半乳糖，N-乙酰葡萄糖胺，岩藻糖和N-乙酰神经氨酸。

23、D

【解析】嵌顿后疼痛会呈持续性，并可能有缺血坏死的表现，题中未诉，暂不考虑。首先请您掌握一个痔疮的鉴别原则即“内痔不疼、外痔疼”，患者体检：肛门部有一圆形肿块突出，此更确定诊断，即外痔血栓形成。血栓性外痔：血栓性外痔是临床多发病，常因过食辛辣刺激食物，大便临厕努挣，肛周皮下静脉破裂，血液淤积皮下而成。临床常以患者自觉肛门肿胀、疼痛有异物感为主症，检查可见肛周或肛管皮下有葡萄状暗紫色肿物，有时伴表面轻度糜烂出血。

24、C

【解析】呋塞米的利尿作用最强，最容易引起电解质紊乱；螺内酯作用温和，不容易引起紊乱

25、B

26、B

【解析】①非极性、疏水性氨基酸：甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸和脯氨酸。②极性、中性氨基酸：色氨酸、丝氨酸、酪氨酸、半胱氨酸、蛋氨酸、天冬酰胺、谷氨酰胺和苏氨酸。③酸性的氨基酸：天冬氨酸和谷氨酸。④碱性氨基酸：赖氨酸、精氨酸和组氨酸。

27、D

【解析】化学物经生物转化后一般是水溶性增强，以利于排泄。在5个备选答案中，只有甲基化结合反应的产物水溶性降低，因此答案D是正确的。

28、A

【解析】A. 是致癌病毒具有的某些核苷酸序列

B. 不能称作细胞癌基因——癌基因包括病毒癌基因和细胞癌基因两类，故不可称之为细胞癌基因。

C. 不需活化即能表达——当其受到体内外致癌因素作用，发生过度表达或突变导致激活时，则可导致细胞癌变。由此可见，需要活化。

D. 正常人类基因组不存在——人类的正常细胞都存在着这些基因。

E. 永远高表达的基因——在正常情况下，这些基因处于静止或低表达的状态，对维持细胞正常功能具有重要作用。

29、E

【解析】鼠疫耶尔森氏菌是鼠疫的病原菌，该菌的毒力很强，少数几个细菌即可使人致病，其致病物质主要有F1荚膜抗原、毒力质粒编码的V / W抗原、外膜抗原、鼠毒素（MT）又称T抗原及内毒素等

30、B

【解析】本题考查医院感染监测常用指标的计算。由于没有给出该年医院感染新病例数，所以无法计算出医院感染发生率，所以正确答案为B。可以通过新发生医院感染例次数计算医院感染例次发生率。

31、A

【解析】心肌、骨骼肌的收缩都需要钙离子的参与，当钙离子浓度降低时，心肌收缩力下降。降压药其中有一类称为钙离子拮抗剂（CCB），其有负性肌力、负性传导和扩张血管的作用。从中可以看出钙是增加肌力、加快传导的

32、B

33、E

【解析】壁细胞分泌内因子，内因子可保护维生素B12不被蛋白酶水解，并促进维生素B12的吸收，减少巨幼细胞性贫血的发生

34、A

【解析】血管紧张素转换酶抑制药

1、抑制ACE活性。

2、对血流动学的影响：降低血管阻力，改善心脏舒张功能。可降低肾血管阻力，增加肾血流量，增加肾小球滤过率，使尿量增加，达到缓解CHF症状的目的。

3、抑制心肌肥厚及血管重构：在血压未降的情况下，ACEI已表现出抗重构效应，能有效的阻止和逆转心室重构，肥厚和心肌纤维化，也能够逆转已出现的组织和肌层内冠脉壁的增厚，提高血管顺应性。

4、抑制交感神经活性。

5、保护血管内皮细胞功能

35、C

【解析】消化性溃疡手术适应证：①大量出血不止；②出血量虽不大，但经长期保守治疗无效；③癌变；④穿孔；⑤器质性梗阻。

36、C

【解析】确认致病菌对明确诊断和指导治疗均有重要意义，涂片革兰染色检查致病菌简便易行，检出阳性率甚至较细菌培养高。细菌培养阳性者应做药物敏感试验。以乳胶颗粒凝聚试验为基础的多种免疫学方法可检测出脑脊液中致病菌的特异性抗原，对涂片和培养未能检测到致病菌的患者诊断有参考价值。

37、A

【解析】吗啡除抑制呼吸中枢及兴奋延髓的呕吐中枢外，其他一些中枢神经系统的不良反应有在治疗剂量下可诱发一时性黑蒙、嗜睡、注意力分散、思维力减弱、表情淡漠、活动能力和视力减退，以及昏睡。有些病例可能出现烦躁不安，表现为惊恐和畏惧。由于吗啡对动眼神经核的兴奋作用，可使瞳孔变小，这有助于吗啡中毒和麻醉药瘾的鉴别诊断。有报告口服吗啡缓释片剂后可发生妄想及幻想，特别是老年人可发生不安、呕吐及定向力障碍，此时不需要停药而是减量

38、E

【解析】原发性高血压并发症有：高血压危象、高血压脑病、脑血管病、慢性肾功能衰竭、心力衰竭、主动脉夹层。

39、D

40、D

【解析】围生期心肌病可以在围生期首次出现，可能使无心脏病的妊娠末期或产后（通常2—20周）女性，出现呼吸困难、血痰、肝大、浮肿等心力衰竭症状，类似扩张型心肌病者称为围生期心肌病。可有心室扩大，附壁血栓。本病的特点之一是体循环或肺循环栓塞的出现频率较高。本病约在每1300—4000次分娩中发生1例。也有人认为本病由于妊娠分娩使原有隐匿的心肌病显现出临床症状，故也有将之归入原发性心肌病的范畴。本病多发生在30岁左右的经产妇。如能早期诊断、及时治疗，一般预后良好。安静、增加营养、服用维生素类药物十分重要。

41、A

42、D

【解析】再障呈正细胞正色素性贫血，多部位骨髓增生重度减低，粒、红系及巨核细胞明显减少且形态大致正常，淋巴细胞及非造血细胞比例明显增高，骨髓小粒皆空虚。

43、D

44、D

【解析】静注丙种球蛋白（IVIG）2g，8~12h内静脉滴入，宜于发病早期（10天以内）应用，可迅速退热，预防冠状动脉病变发生。

45、A

【解析】肠间脓肿是脓液被包围在肠管，肠系膜与网膜之间，可形成单个或多个大小不等之脓肿。常伴发不同程度的粘连性肠梗阻、如脓肿穿入肠管或膀胱，则形成内瘘，脓液即随大小便排出。

症状临床上可表现有弛张热，腹胀、或不完全性肠梗阻、有时可扪及压痛之包块。

检查，B超可以测出脓腔之部位和大小、数目。

46、D

【解析】手部肌腱断裂变现处受的休息位改变，如屈指肌腱断裂时该手指伸直角度加大。伸指肌腱断裂则表现为该手指屈曲角度加大，而且该手指的主动屈指或伸指功能丧失，还会出现一些典型的急性，如指深、浅屈肌腱断裂，该手指呈伸直状态。掌指关节伸指肌腱或伸腱扩张部的断裂，该关节主动伸直受限或消失，掌指关节呈屈曲位。

手部外伤后，固定伤指中节，让患者主动屈曲远侧指间关节，若不能屈曲则为指深屈肌腱断裂。固定除被检查的伤指外的其他三个手指，让患者主动屈曲近侧指间关节，若不能屈曲则为指浅屈肌腱断裂。

47、E

48、D

【解析】重症肌无力系因体内对横纹肌上的乙酰胆碱受体产生自身免疫反应所致，是一种神经-肌肉接头部位因乙酰胆碱受体减少而出现传递障碍的自家免疫性疾病。临床主要特征是局部或全身横纹肌于活动时易于疲劳无力，经休息或用抗胆碱酯酶药物后可以缓解。也可累及心肌与平滑肌，表现出相应的内脏症状。

49、E

【解析】解磷定是胆碱酯酶再激活剂。用于烷基磷酸酯类家药中毒的解毒剂。阿托品只能拮抗ACH和M

样作用,而不拮抗N样作用

有机磷农药中毒时应用阿托品，如出现“阿托品”化表现，应减少用量、延长给药间隔时间，或停用。如出现瞳孔明显扩大，神志模糊，烦躁，惊厥，昏迷和尿潴留等症状，提示阿托品中毒，应立即停用阿托品。

50、A

2023年公共卫生执业医师预测卷(三)

考试时间：【90分钟】

总分：【100分】

得分	评卷人

一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- () 1、女，50岁，突然听到儿子意外去世，立即不认亲人，看到儿子就在眼前说：“妈给你弄点好吃的”，随即给做龙虾等，家人劝阻不理睬，两天后突然清楚，病人经过不能完全回忆。该症状是
- A、强迫状态
- B、朦胧状态
- C、谵妄状态
- D、抑郁状态
- E、幻觉妄想状态
- () 2、患儿女，1岁。发热、咳嗽4天，轻度喘息。查体：呼吸略促，双肺可闻及中小水泡音，心率110次/分，律齐，心音有力，腹软，肝脏肋下1cm。外周血WBC $16 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞76%。正确的治疗方法是
- A、异烟肼、利福平抗结核
- B、两性霉素B抗真菌
- C、口服泼尼松治疗
- D、头孢呋辛抗感染
- E、大剂量丙种球蛋白
- () 3、治疗伤寒高热不宜采用哪项处置
- A、酒精擦浴
- B、温水擦身
- C、头放冰袋
- D、降低室温
- E、大量退热药
- () 4、对奎宁的叙述哪项是错误的
- A、最早用于治疗疟疾的药物
- B、对红细胞内期滋养体有杀灭作用
- C、主要用于耐氯喹或耐多药的恶性疟
- D、每周服药一次，用于病因性预防
- E、可出现心肌抑制作用

- () 5、决定免疫球蛋白类别的是
- A、轻链可变区
 - B、轻链恒定区
 - C、重链恒定区
 - D、铰链区
 - E、重链可变区
- () 6、女患者，车祸头部受伤，伤后即昏迷，入院后查体：中度昏迷，右侧瞳孔散大，光反射消失，左上肢病理征(+)。
- 根本治疗措施为
- A、冬眠物理降温
 - B、脱水治疗
 - C、止血，预防感染治疗
 - D、气管切开
 - E、血肿清除术
- () 7、某医师对49位患者胃癌分化程度(轻、中、重)与p53的关系进行研究，其中p53由小到大量化为I、II、III类，资料整理如下：
- 以胃癌分化程度分组，推断不同分化程度的胃癌患者p53表达的水平有无差异，可选择哪种统计分析方法
- A、直线回归分析
 - B、等级相关分析
 - C、直线相关分析
 - D、秩和检验
 - E、方差分析
- () 8、糖皮质激素本身没有收缩血管的效应，但能加强去甲肾上腺素的缩血管作用，这称为
- A、协同作用
 - B、致敏作用
 - C、增强作用
 - D、允许作用
 - E、辅助作用
- () 9、男婴，经常出现夜惊不宁，近1周加重，多汗，烦闹，该患儿生后一直母乳不足，混合喂养，尚未添加辅食。此患儿到门诊就诊。
- [问题3][单选题]
- 体格检查最易发现的阳性体征为
- A、皮肤弹性差

- B、体检正常
 - C、皮下脂肪明显减少
 - D、方颅，前囟大，乳牙未萌出
 - E、双下肢淤点，淤斑
- () 10、男性，53岁，肝硬化腹腔积液。近1周发热，腹胀，稍有呼吸困难，腹腔积液较前增长，心率96次/分，应用速尿治疗2天后出现沉默寡言，性格改变。下列指标哪项最不可能包括在内
- A、血钾升高
 - B、血氨升高
 - C、脑电图正常
 - D、扑翼样震颤
 - E、腹腔积液常规检查呈漏出液
- () 11、在浓度相同的条件下，判断下列哪种石棉纤维的危害性最大
- A、直径 $2.9\mu\text{m}$ ，长度 $9\mu\text{m}$
 - B、直径 $3.9\mu\text{m}$ ，长度 $12\mu\text{m}$
 - C、直径 $4.9\mu\text{m}$ ，长度 $15\mu\text{m}$
 - D、直径 $5.9\mu\text{m}$ ，长度 $18\mu\text{m}$
 - E、直径 $6.9\mu\text{m}$ ，长度 $21\mu\text{m}$
- () 12、急性白血病出血的主要原因是
- A、DIC
 - B、血小板减少
 - C、纤维蛋白溶解
 - D、AT-III减少
 - E、小血管被白血病细胞浸润破坏
- () 13、胚胎期8个月时，体内最主要的造血器官是
- A、卵黄囊
 - B、骨髓
 - C、肝脾脏
 - D、肝脏
 - E、胸腺
- () 14、男，25岁。突患急性细菌性前列腺炎，下列不应采取的治疗是
- A、卧床休息
 - B、输液

C、应用抗菌药物

D、大量饮水

E、前列腺按摩

() 15、正常菌群不正确的叙述是

A、正常人体的体表及与外界相通的腔道中，都存在着不同种类和数量的微生物

B、在正常情况下，这些微生物对人类无害

C、机体有损伤和抵抗力降低时，原来为正常菌群的细菌也可引起疾病

D、不会致病

E、引起疾病的正常菌群称为条件致病菌或机会致病菌

() 16、副交感神经兴奋可引起

A、心肌 β_1 受体兴奋

B、支气管 β_2 受体兴奋

C、皮肤黏膜 α 受体兴奋

D、瞳孔开大肌 α 受体兴奋

E、骨骼肌 N2 受体兴奋

() 17、决定对重度子痫前期患者实施扩容治疗前，下列何种检查最关键

A、眼底检查

B、24小时尿蛋白定量

C、血浆总蛋白测定

D、血细胞比容（红细胞压积）

E、心电图检查

() 18、正常月经周期中雌激素出现第二次高峰的直接原因是

A、雌激素的正反馈作用

B、孕激素的正反馈作用

C、催乳素的作用

D、黄体生成素的作用

E、促卵泡激素的作用

() 19、属于脂溶性维生素的是

A、烟酸

B、叶酸

C、维生素C

D、维生素E

E、维生素B

() 20、关于抗疟药，下列哪项叙述是正确的

A、氯喹对阿米巴痢疾有效

B、氯喹可根治间日疟

C、青蒿素治疗疟疾最大缺点是复发率高

D、伯氨喹可用作疟疾病因性预防

E、乙胺嘧啶能引起急性溶血贫血

() 21、患者男性，体重50kg，躯干部、双臀及双大腿Ⅱ度烧伤，双小腿及双足Ⅲ度烧伤，第一个24小时应补充的胶体量是

A、2700ml

B、3600ml

C、1500ml

D、3200ml

E、1800ml

() 22、毒性最大的局麻药是

A、利多卡因

B、丁卡因

C、布比卡因

D、依替卡因

E、普鲁卡因

() 23、不属于下丘脑分泌的激素是

A、生长激素

B、生长抑素

C、促性腺激素释放激素

D、生长激素释放激素

E、促甲状腺激素释放激素

() 24、胆石症合并胆道感染时腹痛为

A、常发生在进油腻食后

B、过食、饮酒后发生

C、腹痛在剧烈活动后发生

D、持续性腹痛阵发加重

E、转移性疼痛

() 25、甲状腺功能减退粘液性水肿说法正确的是

- 、 25、 下列哪项不是粘液性水肿性昏迷的病因
- A、粘液水肿不能用药物治疗
 - B、粘液水肿性昏迷需先查明病因
 - C、粘液性水肿患者抗休克治疗是防止昏迷的关键
 - D、粘液性水肿很严重常数天就死亡
 - E、粘液水肿性昏迷需立即抢救治疗
- () 26、某市教育委员会出台了《中小学校全面禁烟的规定》，属于健康促进学校六大内容的
- A、卫生服务
 - B、学校社会环境
 - C、学校物质环境
 - D、学校卫生政策
 - E、个人健康技能
- () 27、细菌学诊断病原菌的检测程序不包括
- A、直接涂片镜检
 - B、分离培养
 - C、生化试验
 - D、动物试验
 - E、人体试验
- () 28、下列哪项不是维生素B1缺乏症的临床表现
- A、神经炎
 - B、心脏扩大
 - C、皮肤粗糙、脱屑
 - D、肝大
 - E、出血倾向
- () 29、一健康女婴，体重8kg，身长68cm，已能抓物，换手，独坐很久，能发复音，其最可能的月龄是
- A、11~12个月
 - B、9~10个月
 - C、4~6个月
 - D、7~8个月
 - E、13~15个月
- () 30、慢性乙肝患者，发热4天，体温38℃，伴恶心、呕吐，尿色加深，化验，ALT800U/L，胆红素定量120pmol/L，抗HEVIgM(+)，诊断应考虑

- A、慢性乙型肝炎，急性戊型肝炎
- B、慢性乙型肝炎，急性丁型肝炎
- C、慢性乙型肝炎活动
- D、慢性重型肝炎
- E、亚急性重型肝炎

() 31、子宫动脉来自

- A、髂内动脉
- B、腹主动脉
- C、臀上动脉
- D、肾动脉
- E、髂外动脉

() 32、动脉导管未闭周围血管征产生的主要原因是

- A、体循环血流量的明显减少
- B、肺循环血流量的明显增多
- C、脉压明显的增大
- D、收缩压明显升高
- E、心脏存在着异常的通道

() 33、关于乙型肝炎的预防措施最主要的是

- A、加强饮水消毒与食品管理
- B、重视对HBsAg携带者的管理
- C、用敏感方法对供血员检测
- D、应用乙肝疫苗预防易感者
- E、避免与乙肝患者日常接触

() 34、女孩，左膝关节弥漫性肿胀已10个月。自觉轻度疼痛，无外伤史，检查见左膝关节肿胀，X线片显示肌肉分层不清，骨质轻度疏松，无破坏，可能为

- A、左膝关节风湿性关节炎
- B、左膝关节色素沉着绒毛结节性滑膜炎
- C、左膝关节滑膜瘤
- D、左膝关节类风湿性滑膜炎
- E、左膝关节结核性滑膜炎

() 35、特异危险度AR指

- A、病例对照研究中暴露组发病（死亡）率与非暴露组发病（死亡）率的比值

- B、实验研究中暴露组发病（死亡）率与非暴露组发病（死亡）率的比值
- C、队列研究中暴露组发病（死亡）率与非暴露组发病（死亡）率的比值
- D、队列研究中暴露组发病（死亡）率与非暴露组发病（死亡）率之差
- E、病例对照研究中暴露组发病（死亡）率与非暴露组发病（死亡）率之差

() 36、老年性痴呆的病理学特征性诊断依据是

- A、脑神经细胞减少
- B、脑神经细胞缩小
- C、老年斑
- D、染色体溶解
- E、胶质细胞增生

() 37、男性，在校大学生，2个月来无诱因出现颈部、腋下淋巴结肿大，体重明显下降达10kg，伴顽固性腹泻，每日十数次稀便，经询问病史，为同性恋。

[问题4][单选题]

皮肤出现紫红色浸润斑或结节，应考虑

- A、药疹
- B、卡波西肉瘤
- C、红斑狼疮
- D、过敏性紫癜
- E、全身血管炎

() 38、肾结核手术治疗原则，哪项不正确

- A、无泌尿男性生殖系统以外活动病灶存在
- B、有附睾结核存在不切除病肾
- C、手术前足够抗结核药物
- D、手术后足够抗结核药物
- E、术中尽量保存肾正常组织

() 39、胃癌的治疗方法哪项正确

- A、早期化疗
- B、扪到肿块者作全胃切除
- C、化疗+放疗
- D、早期胃癌作胃癌根治术
- E、早期胃癌作胃大部切除术

() 40、男性，45岁，有慢性肝炎病史，近日呕血3次，约在1500ml以上，查体：脉快，巩膜黄染，腹腔积液征（+），下列哪项治疗是不正确的

- A、输血
 - B、贲门周围血管离断术
 - C、补液
 - D、止血药物
 - E、护肝药物
- () 41、患者男性，30岁。发热1周伴胸痛，用硝酸甘油无效，体检：心音低沉，有舒张期附加音，血压110/80mmHg (14.7/10.7kPa)，肘部静脉压180mmH₂O。心电图：ST段抬高，弓背向下，未见病理性Q波，可能的诊断是
- A、缩窄性心包炎
 - B、变异性心绞痛
 - C、急性渗出性心包炎
 - D、稳定型心绞痛
 - E、急性心肌梗死
- () 42、肺心病大量利尿后最易出现的酸碱失衡是
- A、低钾、低氯性碱中毒
 - B、呼吸性酸中毒
 - C、呼吸性碱中毒
 - D、呼吸性酸中毒+代谢性碱中毒
 - E、呼吸性酸中毒+代谢性酸中毒
- () 43、钙通道拮抗剂治疗原发性高血压的副作用中描述错误的是
- A、二氢吡啶类钙拮抗剂治疗阶段有反射性交感活动增强
 - B、可以出现头痛、下肢水肿等
 - C、在心力衰竭中使用疗效良好
 - D、非二氢吡啶类钙拮抗剂抑制心肌收缩
 - E、不宜在窦房结功能低下的患者中应用
- () 44、若以成年男性血红蛋白低于120g/L为贫血的判断标准，调查某地成年男性1000人，记录每人是否患有贫血，结果有19名贫血患者，981名非贫血患者，则该资料的类型为
- A、定量资料
 - B、二项分类资料
 - C、有序多分类资料
 - D、无序多分类资料
 - E、可看作定性资料，也可看作定量资料
- () 45、在致畸试验中，活胎检测有下列内容，除了

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/347043012161006055>