北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科找答案》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：男性，10 岁，外伤后左膝附近肿胀，剧痛，体温达 39～40℃，经大剂量抗生素应用 3 天，效果不明显。体检：急性病容，左大腿下段及膝关节肿胀明显，发红，皮温高，压痛明显，左膝活动受限，X 线平片骨质未见破坏，血白细胞 19×109/L，中性 89%，最佳处理（　）。A.全身支持疗法

B.反复关节穿刺及腔内抗生素注射

C.股骨下端切开引流

D.止痛药物应用

E.血液细菌培养

2、单项选择题：男性，28 岁，腰背痛 10 年，开始时腰骶部疼痛向双臀部放射。曾在县医院诊断为腰椎间盘突出症。后腰骶部痛减轻，背痛加重，并逐渐出现驼背畸形，双髋活动部分受限，上三楼后气喘、呼吸困难。查体：脊柱活动明显受限，肺活量明显减少，Thomas 征阳性，床边试验阳性，血液检查 RF（-），HLA-B27（+），AS0200U，ESR54mm/h。初步诊断应首先考虑（　）。A.类风湿性关节炎

B.DISH 病

C.强直性脊柱炎

D.脊柱结核

E.肥大性脊柱炎

3、单项选择题：男性患者，因外伤致股骨内外踝骨折，关节面不平，相差 0.8cm，虽经治疗，骨折移位未见改变，最可能出现的晚期并发症是（　）。A.骨化性肌炎

B.压疮

C.膝关节创伤性关节炎

D.膝关节僵硬

E.膝关节外翻

4、单项选择题：在转移性骨肿瘤中，下列原发病灶哪种最多见（　）。A.乳腺癌

B.前列腺癌

C.肾癌

D.甲状腺癌

E.膀胱癌

5、单项选择题：女性，12 岁，背痛伴低热 8 个月。体格检查：轻度贫血，胸腰部后凸畸形，有压痛，拾物试验（+）。首选检查是（　）。A.血沉

B.碱性磷酸酶

C.摄胸腰段 X 线片

D.血常规

E.类风湿因子

6、单项选择题：骨髓瘤可采取的治疗方法为（　）。A.放射治疗

B.化学治疗

C.手术治疗

D.放射治疗+手术治疗

E.化学治疗+手术治疗

7、单项选择题：女，26岁，右示指近节不小心在桌边敲击一下，局部肿痛，X线片显示：示指近节指骨膨胀性改变，不偏心，中央有蜂窝状吸收区，也有散在的钙化斑块，考虑为内生软骨瘤，最适宜采取（　）。A.截指+化学治疗

B.化学治疗+免疫治疗

C.病灶整块切除并植骨

D.病灶切除并移植同种异体骨

E.病灶整块切除并自体带血管骨移植

8、单项选择题：强直性脊柱炎的X线表现特点（　）。A.常蔓延数个椎体，晚期增生明显.骨性融合成块

B.常累及多数椎骨，多同时伴有双骶髂关节病变。晚期韧带钙化呈竹节样，椎体无破坏

C.累及单个椎体，椎间隙正常，常有椎弓根破坏

D.I　　D.近侧向桡侧移位

E.远侧向尺侧移位

11、单项选择题：陶瓷被用作人工股骨头材料是因为（　）。A.价格低

B.耐蚀性好

C.耐磨性好

D.生物相容性好

E.耐疲劳性好

12、单项选择题：颈椎间盘突出手术治疗下列不正确的是（　）。A.非手术治疗无效反复发作者需手术治疗

B.脊髓型颈椎病常需手术治疗

C.伴椎管狭窄者一般行前路手术

D.后路手术以减压为主，一般不行髓核摘除

E.前路手术多同时行植骨融合稳定脊柱

13、单项选择题：有关脊柱外伤与脊髓损伤的关系的叙述，下列哪项是错误的（　）。A.脊髓损伤节段与椎骨受伤平面不一致

B.胸椎较固定，所以胸椎的脱位多无脊髓损伤

C.有的病例表现为明显脊髓损伤，但X线片却无骨折脱位

D.屈曲型骨折脱位造成脊髓损伤最多见

E.椎管狭窄患者，脊柱骨折创伤更易发生脊髓损伤

14、单项选择题：男，马车翻车时砸伤下腹部。查体：耻骨联合处压痛，挤压试验阳性，膀胱胀满，橡皮导尿管插入一定深度未引出尿液，导尿管尖端见血迹，此时应考虑（　）。A.导尿管插入深度不足

B.导尿管插入方法不对

C.导尿管阻塞

D.骨盆骨折合并尿道断裂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/347062121016006102