

主管护师-儿科护理学（中级）专业知识考前特训 1

单选题（共 100 题，共 100 分）

(1.) 急性肾小球肾炎发病与哪种病原体感染有关

- A. 病毒
- B. 支原体
- C. 链球菌
- D. 葡萄球（江南博哥）菌
- E. 原虫和寄生虫

正确答案： C

参考解析：急性肾小球肾炎最常见的病因是 A 组 β 溶血性链球菌引起的急性上呼吸道感染或皮肤感染后的一种免疫复合物性肾小球肾炎。【该题针对“基础知识-急性肾小球肾炎病因发病机制、辅助检查”知识点进行考核】

(2.) 急性肾小球肾炎常见的并发症是

- A. 水肿、少尿、高血压
- B. 水肿、大量蛋白尿、低蛋白血症
- C. 血尿、高血压脑病、肾功能衰竭
- D. 感染、血栓形成、急性肾衰竭
- E. 严重循环充血、高血压脑病、急性肾衰竭

正确答案： E

参考解析：急性肾小球肾炎的并发症 1. 循环充血状态 2. 高血压脑病 3. 急性肾功能衰竭 4. 继发细菌感染

(3.) 法洛三联症的 4 个病理畸形不包括

- A. 肺动脉狭窄
- B. 房间隔缺损
- C. 室间隔缺损
- D. 主动脉骑跨
- E. 右心室肥厚

正确答案： B

参考解析：肺动脉狭窄、室间隔缺损、主动脉骑跨、右心室肥厚

(4.) 急性感染性多发性神经根炎运动障碍的特点是()

- A. 肌肉无力呈非对称性
- B. 自肢体近端开始
- C. 肌肉无力，从 upper 肢发展到下肢
- D. 运动障碍从躯干发展到四肢
- E. 首先表现为行走无力，易摔倒

正确答案： E

参考解析：

急性感染性多发性神经根炎运动障碍的特点是：自肢体远端开始，首先表现为行走无力，易摔倒；肌肉无力，从下肢发展到上肢，肌肉无力呈对称性；运动障碍从四肢发展到躯干。

(5.) 以下关于小儿惊厥发作的处理方式不妥的是

- A. 立即送往医院
- B. 松开衣领，头偏向一侧
- C. 立即止惊
- D. 在上下牙之间放置牙垫或纱布包裹的压舌板
- E. 避免对患儿的一切刺激

正确答案： A

参考解析：小儿惊厥发作时应就地抢救，保持安静，禁止一切不必要的刺激。故本题选 A。

(6.) 足月新生儿 3 天后低血糖的诊断标准为全血血糖

- A. 低于 1.67mmol/L
- B. 低于 2.2mmol/L
- C. 高于 2.2mmol/L
- D. 低于 7mmol/L
- E. 高于 7mmol/L

正确答案： B

参考解析：目前认为凡全血血糖

(7.) 治疗支气管肺炎，抗生素应持续用至

- A. 体温正常后 2~3 天
- B. 体温正常后 2~5 天
- C. 体温正常后 3~7 天
- D. 体温正常后 5~7 天
- E. 体温正常后 8 天

正确答案： D

参考解析：细菌性肺炎，要根据不同病原体，选择敏感抗生素，原则为：早期、联合、足量、足疗程、静脉给药。故选 D

(8.) 对中毒较久毒物滞留于肠道内的病人，洗胃液宜选用

- A. 3%~5%碳酸氢钠液
- B. 50%硫酸镁溶液
- C. 0.9%温氯化钠
- D. 0.5%活性炭悬液
- E. 10%甘露醇溶液

正确答案： C

参考解析：0.9%温氯化钠：有机磷农药、甲醇、酒精及不明原因中毒

(9.) 最容易发生心血管畸形的时间是胚胎

- A. 2~4 周
- B. 2~8 周

- C. 8~12 周
- D. 12~24 周
- E. 25~28 周

正确答案： B

参考解析：原始心脏在胚胎发育第 2 周开始形成，约于第 4 周起有循环作用，到第 8 周心房和心室分隔基本完成，即形成四腔心脏。如果在这一时期心脏发育障碍，即可造成先心病。

(10.) 如 PPD 硬结直径为 22mm，您判断为

- A. -
- B. +
- C. ++
- D. +++
- E. ++++

正确答案： D

参考解析：阴性：无反应；弱阳性：硬结直径在 5mm；阳性：硬结直径在 6-19mm 之间强阳性：硬结直径大于 20mm 或有水泡、淋巴管炎出现。

(11.) 口服毒物后，最佳的洗胃时间是

- A. 12 小时
- B. 24 小时
- C. 4~6 小时内
- D. 7~8 小时
- E. 9~10 小时

正确答案： C

参考解析：1, 口服致命毒药 1h 内者；2, 吸收缓慢的毒物, 胃肠蠕动功能减弱或消失时, 服毒 4-6h 后仍可洗胃；3, 摄入无解毒药的毒物时；4, 摄入毒物不被活性炭吸附者。

(12.) 不符合周围性呼吸衰竭表现的是

- A. 呼吸节律不齐
- B. 呼吸频率加快
- C. 鼻翼扇动
- D. 三凹征
- E. 口周发绀

正确答案： A

参考解析：呼吸衰竭患者表现为呼吸困难，在血红蛋白浓度正常的患者，当 $PaO_2 < 50\text{mmHg}$ ，口腔黏膜和舌面的发绀明确可辨，因此当出现发绀时， PaO_2 一般已低于 60mmHg ，达到呼吸衰竭的诊断标准，故呼吸困难与发绀的症状最能体现呼吸衰竭

。呼吸费力伴呼吸延长可见于支气管哮喘和慢性阻塞性肺气肿，呼吸频率增快可见于肺炎，神经精神症状不一定由呼吸衰竭引起，双肺大量湿啰音可能是肺炎。

(13.) 小儿结核病最严重的类型是

- A. 知觉过敏
- B. 性格改变，发热，呕吐
- C. 手足徐动，前凶膨隆
- D. 发热，头痛，喷射状呕吐
- E. 发热，呕吐，面神经瘫痪

正确答案： B

参考解析：儿结核病以原发型肺结核最常见，严重病例可引起血行播散发生粟粒型结核或结核性脑膜炎，后者是结核病引起死亡的主要原因。

(14.) 吞入强碱毒物者，可立即服用

- A. 氢氧化钠凝胶
- B. 镁乳
- C. 碳酸氢钠
- D. 食醋
- E. 维生素 B

正确答案： D

参考解析：但婴幼儿、神志不清、强酸或强碱中毒、油剂中毒、严重心脏病者禁用催吐。催吐法不成功或患儿有惊厥、昏迷而须清除毒物时使用。强酸或强碱中毒可致胃穿孔，切忌洗胃，可用弱酸或弱碱中和的方法。

(15.) 引起病毒性脑炎最常见的病原体是

- A. 脑膜炎双球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 肺炎双球菌
- E. 柯萨奇病毒

正确答案： E

参考解析：病毒性脑炎的 80% 属肠道病毒感染

(16.) 不能自我控制排尿的时间最晚到

- A. 2 岁
- B. 3 岁
- C. 4 岁
- D. 5 岁
- E. 6 岁

正确答案： D

参考解析：不能自我控制排尿的时间最晚到 5 岁，如果 5 岁后还不能控制排尿

就称为遗尿。

(17.)服用铁剂治疗缺铁性贫血的最佳时间是

- A. 餐前
- B. 两餐之间
- C. 餐后
- D. 临睡前
- E. 晨起时

正确答案： B

参考解析：治疗营养性缺铁性贫血，口服铁剂的时间以两餐之间为宜，既可减少胃肠副反应，又可增加吸收。

(18.)咽结合膜热的病原是

- A. 腺病毒
- B. 合胞病毒
- C. 轮状病毒
- D. 单纯疱疹病毒
- E. 柯萨奇病毒 B 组

正确答案： A

参考解析：咽-结合膜热病原体为腺病毒，好发于春夏季。

(19.)属于早产儿的是

- A. 胎龄满 24 周的新生儿
- B. 胎龄满 27 周的新生儿
- C. 胎龄满 28 周的新生儿
- D. 胎龄满 37 周的新生儿
- E. 胎龄满 38 周的新生儿

正确答案： C

参考解析：早产儿指胎龄满 28 周至未满 37 周的新生儿。

(20.)预防结核病的最有效方法是()

- A. 隔离病人
- B. 接种卡介苗
- C. 口服抗结核药
- D. 禁止随地吐痰
- E. "OT"试验

正确答案： B

参考解析：答案 A、B、D 均为预防结核病的方法，但最有效的方法为 B。答案 C 为预防和治疗结核病的方法，但药物预防需要有服药指征。答案 E 为诊断方法。

(21.)急性肾小球肾炎患儿在疾病早期突然出现惊厥的主要原因是()

- A. 低血糖
- B. 低血钙
- C. 低血钠

- D. 高热惊厥
- E. 高血压脑病

正确答案： E

参考解析：高血压脑病为急性肾小球肾炎的严重表现，表现为剧烈头痛、恶心、呕吐、一过性失明，严重者可出现惊厥、昏迷。

(22.) 患儿，男，10岁，2周前呼吸道感染。2天后出现双下肢无力、麻木、疼痛，并伴有周围感觉障碍，以格林-巴利综合征收入院。该病危及患儿生命的病变是()

- A. 运动障碍
- B. 脑神经损害
- C. 感觉障碍
- D. 自主神经障碍
- E. 呼吸障碍

正确答案： E

参考解析：格林-巴利综合征患儿呼吸障碍是由于呼吸肌麻痹引起，可造成呼吸衰竭，危及生命。

(23.) 对脑性瘫痪患儿的治疗原则是()

- A. 维持营养
- B. 防止外伤和意外
- C. 全面、多样化的综合治疗
- D. 促进智力发育
- E. 手术矫治

正确答案： C

参考解析：脑性瘫痪是由于脑损伤造成的综合征，脑的损伤是不可逆的，治疗的主要目的是促进各系统功能的恢复和正常发育，采用对患儿进行全面、多样化的综合治疗。

(24.) 下列哪项不属于锌缺乏症的临床表现

- A. 生长发育慢
- B. 各种皮疹
- C. 反复发作口腔溃疡
- D. 烦躁
- E. 性发育延迟

正确答案： D

参考解析：锌缺乏症出现多种生理功能紊乱的表现：如生长发育过慢、厌食、异食癖、各种皮疹、复发性口腔溃疡、秃发、精神倦怠、嗜睡、性发育延迟及易发生各种感染。故本题选D。

(25.) 原发性血小板减少性紫癜的首选治疗方法是

- A. 糖皮质激素

- B. 预防感染
- C. 输新鲜血
- D. 输血小板悬液
- E. 大剂量免疫球蛋白滴注

正确答案： A

参考解析：糖皮质激素、预防感染、.输新鲜血、.输血小板悬液、.大剂量免疫球蛋白滴注都是原发性血小板减少性紫癜的治疗方法，但糖皮质激素首选治疗。故选 A

(26.)急性粟粒型肺结核 X 线检查出现粟粒状阴影的时间是在起病后

- A. 3~7 天
- B. 7~10 天
- C. 10~14 天
- D. 2~3 周
- E. 3~4 周

正确答案： D

参考解析：急性粟粒型肺结核在起病后 2~3 周胸部摄片可发现大小一致、密度一致、分布均匀的粟粒状阴影，密布于两侧肺野。故本题选 D。

(27.)结核性脑膜炎进入晚期的特征表现是

- A. 昏迷、半昏迷或频繁惊厥
- B. 脑膜刺激征阳性
- C. 肢体瘫痪
- D. 面神经瘫痪
- E. 性情改变

正确答案： A

参考解析：结核性脑膜炎晚期(昏迷期)约 1~3 周，患儿由意识蒙眬、半昏迷进入完全昏迷。频繁惊厥甚至可呈强直状态。最终死于因脑疝而导致呼吸及血管运动中枢麻痹。故本题选 A。

(28.)早产儿是指

- A. 胎龄>20 周至 37 足周的新生儿
- B. 胎龄>28 周至<37 足周的新生儿
- C. 胎龄>28 周至第 37 周的新生儿
- D. 胎龄>20 周至第 37 周的新生儿
- E. 胎龄>30 周至<37 足周的新生儿

正确答案： B

参考解析：早产儿：胎龄>28 周至<37 足周的新生儿；足月儿：胎龄大于或等于 37 周小于 42 周；过期产儿：胎龄大于 42 周。故选 B

(29.)在卵黄囊上形成许多血岛，其间的细胞分化为原始的血细胞，此期为

- A. 胚胎期造血

- B. 肝(脾)造血期
- C. 骨髓造血期
- D. 骨髓外造血
- E. 以上皆不是

正确答案： A

参考解析：中胚叶造血期：在胚胎第3周开始出现卵黄囊造血，之后在中胚叶组织中出现广泛的原始造血成分。在胚胎第6周后，中胚叶造血开始减退。

(30.)有可能根治白血病的治疗方法是

- A. 造血干细胞移植
- B. 化疗
- C. 放疗
- D. 药物治疗
- E. 暂无可能根治的方法

正确答案： A

参考解析：有条件白血病患者可采用造血干细胞移植，不仅可提高患儿的长期生存率，而且还可能根治白血病。一般在第一次化疗完全缓解后进行。

【该题针对“专业知识-急性白血病临床表现、治疗原则”知识点进行考核】

(31.)蛔虫病的临床表现不常见的是

- A. 异位损害
- B. 蛔蚴移行症
- C. 蛔虫性脑病
- D. 过敏反应
- E. 肾功能不全

正确答案： D

参考解析：蛔虫的致病作用可由蛔虫的幼虫及成虫引起。幼虫在移行的过程中，损伤人的小肠、肝、肺，重度感染时，幼虫还可侵入淋巴结、甲状腺、脾、脑、脊髓等处，引起异位病变。成虫寄生在小肠内，除引起炎症外，还可造成肠痉挛与局部出血，重度感染者还可引起肠梗阻、肠套叠。

(32.)肺炎患儿出现严重腹胀，肠鸣音消失是由于()

- A. 消化功能紊乱
- B. 低钠血症
- C. 中毒性肠麻痹
- D. 低钾血症
- E. 中毒性脑病

正确答案： C

参考解析：低氧血症和病原体毒素的作用，使胃肠道黏膜出现糜烂、出血、上皮细胞坏死脱落等应激反应，导致胃肠功能紊乱，出现厌食、呕吐及腹泻等症状，严重者出现中毒性肠麻痹和消化道出血。

(33.) 营养不良皮下脂肪消减的最后部位是

- A. 躯干
- B. 面部
- C. 腹部
- D. 四肢
- E. 臀部

正确答案： B

参考解析：腹部—躯干—臀部—四肢—面颊

(34.) 格利-巴利综合征的主要表现不包括哪项

- A. 四肢对称弛缓性瘫痪
- B. 一侧中枢性面瘫
- C. 四肢肌萎缩
- D. 手套、袜套状感觉障碍
- E. 脑脊液出现蛋白、细胞分离

正确答案： B

参考解析：四肢和躯干肌瘫是本病的最主要症状。一般从下肢开始，逐渐波及躯干肌、双上肢和颅神经，可从一侧到另一侧。

(35.) 白血病患者经化疗缓解后的治疗原则是()

- A. 像正常孩子学习
- B. 继续住院治疗
- C. 坚持间歇化疗
- D. 出院后卧床休息
- E. 门诊定期随访

正确答案： C

参考解析：白血病患者经过治疗缓解后，体内仍有残存的白血病细胞，还需坚持化疗。

(36.) 脑性瘫痪最常见的临床分型是

- A. 痉挛型
- B. 运动障碍型
- C. 混合型
- D. 共济失调型
- E. 手足徐动型

正确答案： A

参考解析：痉挛型约占 50%~62%，是最常见的中枢性瘫痪类型。

(37.) 3 个月婴儿，体重 5kg，如用牛乳人工喂养，每日应给 8%糖牛乳量是

- A. 450ml
- B. 500ml
- C. 550ml

D. 600ml

E. 650ml

正确答案： C

参考解析： 婴儿期每日每千克需能量为 110kcal, 5kg 小儿需热量 550kcal, 相当于 8%糖奶 550ml.

(38.) 儿童类风湿病累及关节与风湿热关节受累表现的主要区别在于()

A. 是否为大关节受损

B. 是否为游走性

C. 是否有肿、痛

D. 是否有功能障碍

E. 是否遗留畸形

正确答案： E

参考解析： 风湿热患儿关节受累不存留关节畸形，而儿童类风湿病累及关节时，会发生畸形强直。

(39.) 属于无分流型先天性心脏病的是

A. 房间隔缺损

B. 大血管错位

C. 法洛三联症

D. 室间隔缺损

E. 肺动脉狭窄

正确答案： E

参考解析： 无分流型（无青紫型） 心脏左、右两侧或动、静脉之间无异常通路或分流。通常无青紫，只有在心力衰竭时才发生。梗阻型常见疾病如肺动脉口狭窄和主动脉缩窄等，反流型如二尖瓣关闭不全、肺动脉瓣关闭不全等。

(40.) 秋季腹泻最常见的病原体是

A. 埃可病毒

B. 柯萨奇病毒

C. 轮状病毒

D. 大肠杆菌

E. 空肠弯曲菌

正确答案： C

参考解析： 大肠杆菌、空肠弯曲菌多见于夏季；轮状病毒多见于秋季。

(41.) 婴儿易患化脓性脑膜炎的病因中不包括

A. 免疫功能不成熟

B. 血脑屏障功能不全

C. 严重营养不良

D. 有密切接触史，且母乳喂养儿

E. 长期使用激素或免疫抑制药

正确答案： D

参考解析： 以大肠杆菌(多含有 K1 抗原)、金黄色葡萄球菌和表皮葡萄球菌为最多见，其他也有由变形杆菌、克雷白杆菌、绿脓杆菌和不动杆菌引起的脑膜炎，至于脑膜炎双球菌、流感杆菌、李司忒菌则很少见。欧美国家则以 GBSIII型和大肠杆菌为最多见。

(42.) 小儿，2 岁。打喷嚏、流涕、咳嗽、眼结膜充血、畏光流泪 4 天后出现皮疹，医生诊断为麻疹。麻疹的皮疹特点为()

- A. 从躯干开始出疹
- B. 可蔓延至手掌和足底
- C. 形态从斑丘疹变为水疱疹
- D. 皮疹大小一致
- E. 疹间无正常皮肤

正确答案： B

参考解析： 患麻疹时从耳后发际开始出疹，为斑丘疹，逐渐蔓延至面、颈、躯干、四肢及手掌和足底，皮疹大小不等，疹间可见正常皮肤。

(43.) 疱疹性口炎的病原是

- A. 腺病毒
- B. 合胞病毒
- C. 轮状病毒
- D. 单纯疱疹病毒
- E. 柯萨奇病毒 B 组

正确答案： D

参考解析： 常见的口腔炎有疱疹性口腔炎(单纯疱疹病毒感染)、溃疡性口腔炎(链球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌等感染)、鹅口疮(白色念珠菌感染)。2. 鹅口疮又称雪口病，为白色念珠菌感染在黏膜表面形成白色斑膜的疾病。白色念珠菌是属于真菌的一种。

(44.) 小儿，5 岁，因腹泻收入院。患儿精神萎靡，听诊心音低钝，腹胀，肠鸣音减弱，腱反射减弱，考虑该患儿可能出现()

- A. 低钙血症
- B. 低钾血症
- C. 低镁血症
- D. 低氯血症
- E. 低钠血症

正确答案： B

参考解析： 当血钾 $<3.5\text{mmol/L}$ 时神经肌肉兴奋性降低，精神萎靡，反应低下，躯干和四肢肌肉无力，腱反射减弱，腹胀、便秘、肠鸣音减弱。严重时出现肠、膀胱和呼吸肌麻痹，腱反射消失。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/348024002017007051>