

2023-24 年黑龙江省昂昂溪区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题大全含答案（新）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 主要用于治疗皮肤真菌感染，可抑制角鲨烯环氧酶活性，属于丙烯胺类的抗真菌药物是

- A: 特比萘芬
- B: 联苯苄唑
- C: 制霉菌素
- D: 阿莫罗芬

答案：A

2. 患者男性，56 岁。有糖尿病史 15 年，近日并发肺炎，呼吸 35 次/分，心率 105 次/分，血压 160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖 500mg/dl，诊断为糖尿病酮症酸中毒。

- A: 口服
- B: 静脉
- C: 舌下含服
- D: 皮下

答案：B

3. 泛昔洛韦口服后代谢为

- A: 更昔洛韦
- B: 阿昔洛韦
- C: 西多福韦

D: 喷昔洛韦

答案: D

4. 硫脲类的严重不良反应是

A: 甲状腺肿大

B: 关节痛

C: 粒细胞缺乏症

D: 药疹、瘙痒

答案: C

5. (2019 年真题) 原发性肾病综合征患者，在院治疗时给予“注射用甲泼尼龙 40mgqd”静脉滴注，出院前调整为等效剂量的口服药物序贯治疗，适宜的方案是 ()

A: 地塞米松片 10mgqd

B: 泼尼松片 50mgqd

C: 泼尼松片 20mgqd

D: 泼尼松片 30mgqd

答案: B

6. (2020 年真题) 关于聚乙二醇 4000 治疗便秘的说法，错误的是

A: 疗程不宜过长

B: 肠梗阻患者禁用

C: 作用机制为刺激肠道分泌，增加粪便含水量以软化粪便

D: 适用人群为成人及 8 岁以上儿童

答案: C

7. 可升高高密度脂蛋白胆固醇水平的维生素是

A: 泛酸钙

- B: 叶酸
- C: 烟酸
- D: 维生素 B

答案：C

8. (2019 年真题) 注射用奥沙利铂的溶媒选择要求是 ()

- A: 5%葡萄糖注射液稀释
- B: 先用氯化钠注射液溶解，再用 5%葡萄糖注射液进一步稀释
- C: 先用乳酸钠注射液溶解，再用氯化钠注射液或 5%葡萄糖注射液进一步稀释
- D: 氯化钠注射液稀释

答案：A

9. 下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

- A: 美西律
- B: 普萘洛尔
- C: 地尔硫革
- D: 胺碘酮

答案：B

10. 属于胆固醇吸收抑制剂的是 ()。

- A: 阿昔莫司
- B: 非诺贝特
- C: 阿托伐他汀
- D: 依折麦布

答案：D

11. 可与甲巯咪唑发生药物相互作用的是

- A: 阿司匹林
- B: 华法林
- C: 噻嗪类利尿剂
- D: 头孢类抗生素

答案：B

12. 下列不属于局麻药物作用特点的是

- A: 可逆性阻断神经冲动产生和传导
- B: 作用消失后神经功能不可完全恢复
- C: 对各类组织无损伤性影响
- D: 可暂时、完全阻断神经传导

答案：B

13. 丙戊酸钠的严重毒性是

- A: 再生障碍性贫血
- B: 口干、皮肤干燥
- C: 肝功能损害
- D: 抑制呼吸

答案：C

14. 急性化脓性中耳炎的局部治疗方案, 正确的是()

- A: 鼓膜穿孔前可使用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道, 鼓膜穿孔后可用 2%酚甘油滴耳, 再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗
- B: 鼓膜穿孔前可先用 3%过氧化氢溶液彻底清洗外耳道脓液, 再用无耳毒性的抗生素滴耳液, 鼓膜穿孔后可使用 2%的酚甘油滴耳继续治疗
- C: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳, 鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液, 再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

D: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，再用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，以防止进一步感染

答案：C

15. 利尿作用最强，特别当急、慢性肾衰竭(肌酐清除率 $<30\text{ml}/\text{min}$)时可作为首选治疗的利尿药为()

- A: 碳酸酐酶抑制剂
- B: 留钾利尿药
- C: 噻嗪类利尿药
- D: 袂利尿药

答案：D

16. 属于单酰胺菌素类，抗菌谱窄，与青霉素、头孢菌素无交叉过敏反应的药物是

- A: 复方磺胺甲噁唑
- B: 特比萘芬
- C: 氨曲南
- D: 卡泊芬净

答案：C

17. 呋塞米静脉注射用于儿童，一日最大量是

- A: $4\text{mg} / \text{kg}$
- B: $8\text{mg} / \text{kg}$
- C: $2\text{mg} / \text{kg}$
- D: $6\text{mg} / \text{kg}$

答案：D

18. 与长春新碱合用可增强神经系统及血液系统毒性

- A: 非格司亭
- B: 替尼泊苷
- C: 异烟肼
- D: 铂类

答案：C

19. 属于 M 胆碱受体激动剂的降低眼压药是 ()。

- A: 毛果芸香碱
- B: 噻吗洛尔
- C: 乙酰唑胺
- D: 甘露醇

答案：A

20. (2016 年真题) 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式 (控制饮食、增加运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片 20mg/d 治疗

- A: Hcy
- B: Cr
- C: CK
- D: BUN

答案：C

21. 服药期间须大量饮水，防止发生结晶尿的药物是

- A: 克林霉素
- B: 头孢呋辛
- C: 左氧氟沙星

D: 磺胺甲恶唑

答案: D

22. 哌嗪类驱虫药主要用于治疗

A: 疟疾

B: 蛲虫病

C: 蛔虫病和蛲虫病

D: 绦虫病

答案: C

23. 可导致神经毒性(手指、足趾麻木、腱反射消失)的抗肿瘤药是

A: 柔红霉素

B: 紫杉醇

C: 长春新碱

D: 博来霉素

答案: C

24. (2019 年真题) 患者，女，32 岁，孕 2 周，既往有癫痫病史，长期服用卡马西平治疗，为防止引起新生儿出血，该患者妊娠晚期应当补充的维生素是 ()

A: 维生素 D

B: 叶酸

C: 维生素 B12

D: 维生素 K

答案: D

25. 青霉素 G

A: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效

- B: 对 G+、G- 球菌及螺旋体等有效
- C: 对 G+、G- 球菌，特别是对 G- 杆菌有效
- D: 对支原体有效

答案：B

26. 全身性红斑狼疮宜用

- A: 泼尼松
- B: 氢化可的松
- C: 地塞米松
- D: 倍他米松

答案：A

27. 治疗立克次体感染所致斑疹伤寒应首选

- A: 青霉素
- B: 庆大霉素
- C: 链霉素
- D: 四环素

答案：D

28. 没有镇静和"宿醉"现象，不属于巴比妥类和苯二氮

- A: 异戊巴比妥
- B: 阿普唑仑
- C: 佐匹克隆
- D: 地西洋

答案：C

29. 患者，女，40 岁。癫痫病史 3 年，近来常觉头痛，测量血压为 170 / 110mmHg。

- A: 尼莫地平
- B: 维拉帕米
- C: 氨氯地平
- D: 硝苯地平

答案：A

30. 以下细菌中，对呋喃妥因耐药的是()

- A: 铜绿假单胞菌
- B: 阴沟肠杆菌
- C: 大肠埃希菌
- D: 产气肠杆菌

答案：A

31. (2017 年真题) 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162mmHg，心率 72 次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 氨基葡萄糖
- B: 碳酸钙 D
- C: 辛伐他汀
- D: 双氯芬酸

答案：D

32. 下列关于吉非替尼的描述，错误的是

- A: 常见典型不良反应是皮肤毒性、腹泻
- B: 用于治疗经含有铂类或多西他赛治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者
- C: 与传统化疗药存在交叉耐药
- D: 用药期间应监测肝肾功能

答案：C

33. (2018 年真题) 仅用于绝经后妇女, 不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是 ()

- A: 骨化三醇
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 雷洛昔芬
- D: 阿法骨化醇

答案：C

34. (2021 年真题) 通过监测国际标准化比值 (INR) 调整给药剂量的药物是 ()

- A: 茶碱
- B: 丙戊酸钠
- C: 地高辛
- D: 华法林

答案：D

35. (2019 年真题) 对磺胺类药物有严重过敏史的患者应避免使用的药物是 ()

- A: 西地那非
- B: 特拉唑嗪
- C: 十一酸睾酮
- D: 坦洛新

答案：D

36. 口服治疗体癣, 毛发癣, 对深部真菌无效的药物是 ()

- A: 克霉唑

- B: 灰黄霉素
- C: 咪康唑
- D: 环丙沙星

答案：B

37. 可作为气道痉挛的应急缓解药物的长效 β 受体激动剂是

- A: 沙丁胺醇
- B: 福莫特罗
- C: 丙卡特罗
- D: 沙美特罗

答案：B

38. 柔红霉素可能与()存在交叉耐药性。

- A: 环磷酰胺
- B: 甲氨蝶呤
- C: 多柔比星
- D: 阿糖胞苷

答案：C

39. 患者。男，42岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

- A: 30%~90%
- B: 大于 90%
- C: 1
- D: 10%~30%

答案：B

40. 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是()

- A: 血管内皮生长因子
- B: 人表皮生长因子受体-2
- C: B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原
- D: 表皮生长因子受体

答案：B

41. 舒张支气管作用比 β_2 受体激动剂弱且慢，但不易产生耐受性，适用于有吸烟史的老年哮喘患者的药物是

- A: 孟鲁司特
- B: 吸入性糖皮质激素
- C: 沙丁胺醇
- D: 噻托溴铵

答案：D

42. (2017 年真题) 影响毛细血管通透性的促凝血药是 ()

- A: 维生素 K1
- B: 血凝酶
- C: 鱼精蛋白
- D: 卡巴克络

答案：D

43. (2015 年真题) 治疗单纯疱疹性角膜炎不宜选用的药品是 ()。

- A: 利巴韦林滴眼液
- B: 碘苷滴眼液
- C: 四环素可的松滴眼液
- D: 更昔洛韦滴眼液

答案：C

44. 作用较慢，首日剂量可增加至常规剂量 2~3 倍的利尿药物是

- A: 呋塞米
- B: 乙酰唑胺
- C: 螺内酯
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

45. 吉非替尼、厄洛替尼、伊马替尼、舒尼替尼的主要代谢酶是

- A: CYP2C9
- B: CYP3A4
- C: CYP1A2
- D: CYP1A1

答案：B

46. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 罗格列酮
- B: 二甲双胍
- C: 贝那普利
- D: 阿卡波糖

答案：A

47. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食、增加运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片 20mg/d 治疗。服药期间应监测血生化指标，其中超过正常值上限 10 倍，应立即停药的指标是()。

A: BUN

B: Cr

C: CK

D: Hcy

答案：C

48. 强心苷最常见的早期心脏毒性反应是()

A: 房性期前收缩

B: 房颤

C: 二联律

D: 室性期前收缩

答案：D

49. 阿托品 2mg 时，出现的症状为()

A: 略有口干

B: 瞳孔轻度散大

C: 语言不清

D: 瞳孔扩大

答案：D

50. 糖肽类药的主要作用靶点是

A: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

B: 细胞内膜 PBP

C: 核糖体的 50S 亚基

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 核糖体的 30S 亚基

答案: A

51. 关于普萘洛尔抗心律失常作用的描述，错误的是

- A: 减慢心房和房室结的传导
- B: 增强交感神经效应
- C: 阻滞 β 肾上腺素能受体
- D: 延长房室结的功能性不应期

答案：B

52. 特布他林的平喘作用维持时间是

- A: 4~6 小时
- B: 3~5 分钟
- C: 10~20 分钟
- D: 10~12 小时

答案：A

53. 用于耐甲氧西林的金葡萄菌引起的严重感染()

- A: 克拉霉素
- B: 万古霉素
- C: 克林霉素
- D: 红霉素

答案：B

54. 抗炎效能最大的糖皮质激素是

- A: 地塞米松
- B: 氢化可的松
- C: 氟氢可的松
- D: 甲泼尼龙

答案：A

55. 适用于磺酰脲类降糖药治疗不理想的 2 型糖尿病患者的药物是

- A: 瑞格列奈
- B: 骨化三醇
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 利拉鲁肽

答案：A

56. 关于下列抗酸剂的描述，不正确的是

- A: 碳酸氢钠属于吸收性抗酸剂
- B: 不推荐用抗酸剂缓解非甾体抗炎药相关症状。预防溃疡发生
- C: 最佳服药时间是餐前
- D: 抗酸药直接中和胃酸

答案：C

57. 甘草酸二铵可作为保护肝细胞结构和功能的药物，其属于

- A: 必需磷脂类
- B: 促进代谢类药物及维生素
- C: 抗炎类药
- D: 解毒类药

答案：C

58. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗

。

- A: 选择注射给药
- B: 选择注射与口服并用
- C: 选择短期口服给药

D: 选择长期口服给药

答案：C

59. 胰岛素对代谢的作用叙述错误的是

- A: 减少酮体生成
- B: 促进糖原合成
- C: 抑制脂肪的合成
- D: 抑制糖原分解

答案：C

60. 属于头孢一代的是

- A: 头孢唑林
- B: 头孢曲松
- C: 头孢呋辛
- D: 拉氧头孢

答案：A

61. 属于嘌呤核苷合成酶抑制剂的是

- A: 吉西他滨
- B: 甲氨蝶呤
- C: 长春瑞滨
- D: 巯嘌呤

答案：D

62. 不可与氟西汀合用的是

- A: 单胺氧化酶抑制剂
- B: 竞争性 β -内酰胺酶抑制剂
- C: 肝药酶抑制剂

D: 核酸合成抑制剂

答案：A

63. 脓毒血症引起的严重肾衰竭使用

A: 复方氨基酸注射液（3AA）

B: 复方氨基酸注射液（9AA）

C: 复方氨基酸（18AA-I）

D: 苯丙氨酸

答案：B

64. 属于 PDE5 抑制剂的禁忌人群的是

A: 中度的充血性心力衰竭

B: 2 周前发生过心肌梗死或脑卒中

C: 高血压未得到控制者

D: 轻度、稳定型心绞痛

答案：C

65. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60 / 40mmHg，血红蛋白 120g / L，白细胞 $12 \times 10^9 / L$ ，血小板 $30 \times 10^9 / L$ ，血涂片可见少量红细胞碎片，凝血酶原时间 18 秒（正常值 13 秒），骨髓穿刺示增生活跃，巨核细胞多，诊断为弥散性血管内凝血。

A: 鱼精蛋白

B: 维生素 C

C: 低分子肝素

D: 维生素 K1

答案：A

66. (2016 年真题) 可用于缓解绝经后更年期症状的药品是

- A: 戊酸雌二醇
- B: 他莫昔芬
- C: 地屈孕酮
- D: 依普黄酮

答案: A

67. 以上药物镇咳作用最强的是

- A: 吗啡
- B: 可待因
- C: 右美沙芬
- D: 喷托维林

答案: A

68. 吸入用布地奈德混悬液抗炎作用是强的松龙的

- A: 40 倍
- B: 100 倍
- C: 15 倍
- D: 25 倍

答案: C

69. 以下药物的镇咳作用从弱到强排列正确的是

- A: 苯丙哌林、可待因、吗啡
- B: 喷托维林、右美沙芬、苯丙哌林
- C: 喷托维林、苯丙哌林、可待因
- D: 可待因、吗啡、右美沙芬

答案: B

70. 有关阿莫西林特点的说法正确的是

- A: 耐酸、耐酶
- B: 对耐药金葡萄菌有效
- C: 广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效
- D: 口服吸收差，生物利用度小

答案：C

71. 对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是

- A: 吸入性糖皮质激素+短效 M 胆碱受体阻断剂
- B: 长效 $\beta 2$ 受体激动剂+长效 M 胆碱受体阻断剂
- C: 吸入性糖皮质激素+长效 $\beta 2$ 受体激动剂
- D: 长效 M 胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂

答案：C

72. 属于膨胀性泻药的是()

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 蓖麻油
- C: 硫酸镁
- D: 乳果糖

答案：A

73. 平喘作用维持 4~6 小时，是缓解轻、中度急性哮喘症状的首选药是

- A: 沙美特罗
- B: 福莫特罗
- C: 丙卡特罗
- D: 沙丁胺醇

答案：D

74. 可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是()

- A: 阿司匹林
- B: 塞来昔布
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 双氯芬酸

答案：A

75. 酰胺醇类药的主要作用靶点是

- A: 细胞内膜 PBP
- B: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- C: 核糖体的 30S 亚基
- D: 核糖体的 50S 亚基

答案：D

76. 糖皮质激素的禁忌证不包括()

- A: 角膜炎、虹膜炎
- B: 严重的高血压、糖尿病
- C: 妊娠初期和产褥期
- D: 创伤或手术恢复期

答案：A

77. 双香豆素应用过量可选用的拮抗药是()

- A: 葡萄糖酸钙
- B: 氨甲苯酸
- C: 鱼精蛋白
- D: 维生素 K1

答案：D

78. (2017 年真题) 可降低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油, 主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是 ()

- A: 依折麦布
- B: 阿昔莫司
- C: 瑞舒伐他汀
- D: 利血平

答案: B

79. 为最受推荐的常规避孕药, 择期手术和长期卧床者, 需在手术前一个月停止使用的是

- A: 雌激素
- B: 长效避孕药
- C: 孕激素
- D: 短效口服避孕药

答案: D

80. 奥司他韦治疗流行性感冒时, 首次用药的时间是

- A: 出现流感症状 72 小时内
- B: 出现流感症状 100 小时内
- C: 出现流感症状 96 小时内
- D: 出现流感症状 48 小时内

答案: D

81. 属于抗雄激素类的抗肿瘤药是

- A: 他莫昔芬
- B: 氟他胺
- C: 炔雌醇

D: 阿那曲唑

答案: B

82. 不宜应用喹诺酮类药物的人群是

A: 老年人

B: 婴幼儿

C: 溃疡病患者

D: 肝病患者

答案: B

83. 影响疟原虫叶酸代谢过程的抗疟药是

A: 伯氨喹

B: 乙胺嘧啶

C: 青蒿素

D: 奎宁

答案: B

84. 作用于近曲小管前段的利尿剂是

A: 醛固酮受体阻断剂

B: 袢利尿剂

C: 噻嗪类和类噻嗪类利尿剂

D: 碳酸酐酶抑制剂

答案: D

85. 维持人体正常代谢所必需的小分子有机化合物，大部分需要从食物中摄取的是

A: 脂肪乳

B: 葡萄糖

C: 果糖

D: 维生素

答案: D

86. (2019 年真题) 镇静催眠药佐匹克隆的禁忌证是 ()

A: 低蛋白血症

B: 癫痫

C: 重症肌无力

D: 糖尿病

答案: C

87. 属于棘白菌素类的是

A: 卡泊芬净

B: 氟胞嘧啶

C: 特比萘芬

D: 制霉菌素

答案: A

88. 属于平衡型氨基酸制剂的是

A: 复方氨基酸注射液 (9AA)

B: 复方氨基酸注射液 (18AA)

C: 复方氨基酸注射液 (6AA)

D: 赖氨酸注射液

答案: B

89. 适用于治疗精神分裂症、躁狂症的药物是

A: 氯氮平

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 碳酸锂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/348034071050007022>