

护理学基础第 10 章测试题

1、紫外线灯管消毒物品时，照射距离、时间为：（）革选题] *

A、 20cm, 10min

B、 30cm, 15min

C、 40cm, 30min (正确答案)

D、 1cm, 30min

E、 2cm, 30min

2、不可用于高压蒸汽灭菌的物品是：（）革选题] *

A、 止血钳

B、 镊子

C、 弯盘

D、 手术剪 (正确答案)

E、 橡胶导尿管

3、传染病院应设置在：（）革选题] *

A、 市中心

B、 远离饭店、影院的地方 (正确答案)

C、 交通方便的地方

D、 靠近商店、公园的地方

E、 水源充足的地方

4、刷洗消毒双手正确的是：（）革选题] *

A、 身体靠近水池，注意节力

- B、水溅到身上应立即吹干
- C、手腕部应高于肘部，避免汗水倒流
- D、勿使水流入衣袖内(正确答案)
- E、卫生洗手法的揉搓时间至少 8 秒钟

5、已戴无菌手套的手不可触及另一手套的：（）革选题] *

- A、内面(正确答案)
- B、边缘
- C、外面
- D、反折面
- E、手指端

6、煮沸消毒正确的是：（）革选题] *

- A、应将器械涂油后煮沸
- B、各种物品均用纱布包裹
- C、玻璃物品均应从冷水开始煮沸(正确答案)
- D、有污迹的物品先煮沸后清洁
- E、橡胶类物品应从温水时放入

7、使用隔离衣的注意事项中错误的是：（）单选题] *

- A、保持衣领及内面清洁
- B、长度超过工作服
- C、不可有破洞
- D、如有潮湿或污染应立即更换
- E、系领子时，袖可触及面部和帽子(正确答案)

8、取用避污纸的正确方法是：（）革选题] *

- A、任意取用
- B、从页面抓取(正确答案)
- C、掀页撕取
- D、经他人传递
- E、翻页撕取

9、避污纸的使用错误的是：（）革选题] *

- A、避污纸即为无菌的纸片(正确答案)
- B、病室门备避污纸
- C、用避污纸垫着拿取物品
- D、目的是操持双手或物品不被污染
- E、目的是省略手的刷洗消毒

10、取用无菌溶液时，下列哪项错误：（）单选题] *

- A、必须核对瓶签
- B、手不可触及瓶及盖的内面
- C、检查溶液有无混浊
- D、倾倒溶液时标签朝上
- E、必要时，可将无菌棉签直接伸入瓶内蘸取(正确答案)

11、取用无菌溶液时，先倒出少量溶液的目的是为了：（）革选题]
*

- A、检查溶液有无沉淀
- B、冲洗无菌容器
- C、检查瓶有无裂缝
- D、冲洗瓶(正确答案)

E、查看溶液的颜色

12、物理灭菌法中，灭菌效果最佳的是：（）单选题] *

A、紫外线照射消毒法

B、高压蒸汽灭菌法(正确答案)

C、煮沸消毒灭菌法

D、日光暴晒法

E、燃烧灭菌法

13、传染病区区域划分的依据是：（）单选题] *

A、隔离的种类

B、病情轻重

C、微生物种类

D、医务人员接触的环境

E、病人所接触的环境(正确答案)

14、注射室无菌持物钳及浸泡容器的消毒时间应：（）革选题] *

A、每两周 1 次

B、每周 1 次

C、每周 2 次

D、每日 1 次(正确答案)

E、每日 2 次

15、正确的无菌技术操作是：（）单选题] *

A、用无菌持物钳夹取无菌油纱布

B、将无菌敷料接触无菌溶液瓶倒溶液

C、打开无菌容器盖使外面向上放于桌上(正确答案)

- D、解开无菌包系带卷放在包布上
- E、将无菌盘盖巾扇形折叠开边向外

16、接触乙肝患者后宜用什么消毒剂刷手：（）革选题] *

- A、0.2%过氧乙酸(正确答案)
- B、70%酒精
- C、0.1%苯扎溴铵
- D、0.5%洗必泰
- E、5%碘伏

17、不属于高效消毒剂的药物是：（）单选题] *

- A、过氧乙酸
- B、戊二醛
- C、环氧乙烷
- D、酒精(正确答案)
- E、甲醛

18、紫外线照射消毒时灯亮多长时间开始计时：（）革选题] *

- A、立即
- B、2 — 3 分钟
- C、3—5 分钟
- D、5 — 7 分钟(正确答案)
- E、7 — 9 分钟

19、无菌包外指示胶带为什么颜色时表示灭菌合格：（）单选题] *

- A、黑色(正确答案)
- B、黄色

私橙色

D、紫色

E、绿色

20、以下哪种疾病应执行接触隔离：（）单选题] *

- A、中毒性菌痢
- B、爆发性肝炎
- C、百日咳
- D、流行性乙型脑炎
- E、破伤风(正确答案)

21、属于传染病房清洁区域的是：（）[单选题] *

- A、病区内走廊
- B、病区化验室
- C、浴室、洗浴间
- D、病室、厕所
- E、配餐室，更衣室(正确答案)

22、内源性感染是指：（）[单选题] *

- A、病人与病人之间的感染
- B、通过医疗器械的感染
- C、私自身病原体引起的感染(正确答案)
- D、饮食不当引起的感染
- E、病人与护士之间的感染

23、高压蒸汽灭菌的注意事项中不正确的是：（）[单选题] *

- A、包不宜过大
- B、放置时包间留空隙
- C、布类物品放在搪瓷物品之上
- D、金属物品放在布类物品之上(正确答案)
- E、包布受潮影响灭菌效果

24、被破伤风杆菌感染的敷料，最彻底的灭菌方法是：（）单选题] *

A、日光暴晒法

B、燃烧法(正确答案)

C、煮沸消毒法

D、高压蒸汽灭菌法

E、过氧乙酸浸泡法

25、杀灭外环境中的一切微生物，其中包括芽孢的过程称为：（）革选题] *

A、消毒

B、灭菌(正确答案)

C、清洁

D、无菌技术

E、抗菌

26、用高压蒸汽灭菌法杀灭细菌芽孢所需要的压力、温度、时间是（B）单选题] *

A、1kpa、121° C、30min(正确答案)

C、30min

C、30min B、120 kpa、125° C、20min

D、137 kpa、115° C、25 min

E、103kpa、105C、20 min

27、用戊二醛浸泡金属容器，需加入的防锈剂是：（）单选题] *

A、碳酸氢钠

B、亚硝酸钠(正确答案)

C、乳酸钠

D、高锰酸钾

E、过氧化氢

28、属于高效消毒剂的是：（）单选题] *

A、乙醇

B、碘酊(正确答案)

C、碘伏

D、新洁尔灭

E、洗必泰

29、一病室长5米、宽4米、高4米，用乳酸行空气消毒，用量为：（）革选题] *

A、2.4 ml

B、4.2 m l

C、6.4 m l

D、7.2 m l

E、9.6 m(正确答案) 30、内窥镜的消毒可选用：（）革选题] *

A、煮沸法

B、高压蒸汽灭菌法

C、环氧乙烷熏蒸

D、过氧乙酸浸泡

E、碱性戊二醛浸泡(正确答案)

31、能用于粘膜的消毒剂是：（）单选题] *

A、碘酊

B、乙醇

C、过氧乙酸

D、戊二醛

E、洗必泰(正确答案)

32、取用无菌溶液时首先要做的是：() [单选题] *

A、检查瓶有无裂缝

B、核对瓶签

C、检查瓶盖有无松动

D、查看溶液有无变色

E、检查有效期(正确答案)

33、24cm 长的无菌持物镊浸泡在盛有消毒液的容器内，其液面高度应：() [单选题] *

A、9cm

B、11cm

C、12cm (正确答案)

D、13cm

E、14cm

34、无菌物品的保管原则错误的是：() [单选题] *

A、无菌物品与非无菌物品严格分开

B、放在清洁干燥的柜橱内

C、注明名称及灭菌日期

D、放在干燥处可保存 7 天

E、无菌包一经打开，剩余物品不再使用(正确答案)

35、取用无菌溶液的方法中不正确的是：() [单选题] *

A、去除铝盖，消毒橡胶塞表面

B、用食指和中指套住橡胶塞拉出

C、倒溶液时标签向下（正确答案）

D、倒去少许溶液冲洗瓶

E、再由原处倒出溶液

36、无菌包包扎法不正确的是：（）革选题] *

A、包布应选择双层脱脂棉布（正确答案）

B、物品放在包布中央

C、包布一角盖住物品，然后折叠左右两角

D、用化学指示胶带粘贴封包

E、包外注明物品名称及灭菌日期

37、脱手套的正确方法是，用戴手套的手捏住另一手套的：（）单选题] *

A、指端向下拉出

B、边缘退出

C、边缘翻转脱下

D、腕部外面翻转脱下（正确答案）

E、内面翻转脱下

38、穿隔离衣时，手何时被视为污染：（）单选题] *

A、取隔离衣时

B、穿衣袖时

C、系袖时（正确答案）

D、系领扣时

E、系腰带时

39、穿脱隔离衣时要避免污染：（）单选题] *

A、腰带以下部分

- B、腰带
- C、袖子的后面
- D、领子(正确答案)
- E、背后

40、脱隔离衣的程序是：（）[单选题] *

- A、解袖带—洗手—解领扣—解腰带—脱衣
- B、解领扣—洗手—解腰带—解袖—脱衣
- C、解袖—解腰带—洗手—解领—脱衣
- D、解腰带—解袖—洗手—解领—脱衣(正确答案)
- E、解腰带—洗手—解领—解袖—脱衣

41、某病人患破伤风，护士为他的伤换药，更换下来的敷料应：（）[单选题] *

- A、日光暴晒
- B、煮沸消毒
- C、高压蒸汽灭菌
- D、焚烧(正确答案)
- E、过氧乙酸浸泡

42、铺好的无菌盘，有效期为：（）[单选题] *

- A、2h
 - B、3h
 - C、4h(正确答案)
 - D、5h
 - E、6h
- A、2h B、3h C、4h D、5h E、6h

43、防止交叉感染的最主要措施是：（）革选题] *

- A、进行无菌操作时，衣帽要整洁
- B、执行无菌操作时，环境要整洁
- C、一份无菌物品，只能供一个病人(正确答案)
- D、取无菌物品时，要使用无菌持物钳
- E、无菌物品与非无菌物品要分别放置

44、进行无菌操作前多长时间，须停止清扫等工作：（）革选题] *

- A、10min
- B、20 min
- C、30 min (正确答案)
- D、40 min
- E、50 min

45、菌痢患者的粪便消毒处理，漂白粉与粪便的比例为：（）革选题] *

- A、1:1
- B、1:2
- C、1:3
- D、1:(正确答案)
- E、1:5

46、高压蒸汽灭菌手术器械包宜用：（）革选题] *

- A、压力 40kpa，温度 90°
- C，时间 5min
- B、压力 60 kpa，温度 1° C，时间 10 min
- C、压力 80 kpa，温度 105° C，时间 15 min

D、压力 105 kpa，温度 125° C，时间 30 mi 正确答案)

E、压力 140 kpa，温度 130° C，时间 40 min47、无菌包被无菌等渗盐水浸湿后，应
() 单选题] *

A、将包内物品使用完

B、晾干使用

C、重新灭菌 正确答案)

D、烘干后使用

E、当天内用完

48、消除弯盘上的甲紫污渍可用 () 革选题] *

A、消耗纸擦拭

B、肥皂水擦拭

C、草酸擦拭 正确答案)

D、清水擦拭

E、过氧化氢液擦拭

49、接触传染病人后的刷手方法，错误的一项是 () 单选题] *

A、由前臂至指甲顺序刷洗

B、每只手一次刷洗 30 秒

C、刷后用流动水冲净

D、刷洗范围应在污染范围内 正确答案)

E、手刷每日煮沸或高压消毒

50、一般消毒隔离的原则是 () 单选题] *

A、穿隔离衣后只能在各病室活动

B、不易消毒的物品应放在清洁区

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/348046002022006036>