2023-24年广西壮族自治区宾阳县《执业药师之西药学专业二》考试必背200题及1套完整答案

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结1/18，免疫组化：ER（-），PR（-），Her(+)。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多西他赛的描述，错误的是

A: 属于半合成紫杉类抗肿瘤药物

B: 作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成

C: 多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同

D: 在相当剂量下，抗肿瘤作用比紫杉醇高1倍

答案：C

2.可抑制细菌的DNA依赖性RNA多聚酶的是()。

A: 磷霉素

B: 替考拉宁

C: 利福平

D: 舒巴坦

答案：C

3.患者，男，60岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

A: 发现氯吡格雷抗血小板作用不足者可进行代谢酶基因型检测

B: 在常规服药时间的12小时内漏服，应立即补服一次标准剂量，并按照常规服药时间服用下一次剂量

C: 单次负荷量300mg开始，然后以75mg，每日1次连续服药

D: 超过常规服药时间的12小时后漏服，应在下次常规服药时间服用加倍剂量

答案：D

4.乳腺癌患者绝经前、后均可使用的内分泌治疗药是

A: 曲妥珠单抗

B: 他莫昔芬

C: 阿那曲唑

D: 氟他胺

答案：B

5.用于抢救肝素所致严重出血的药物是

A: 维生素K

B: 对羧基苄胺

C: 硫酸鱼精蛋白

D: 亚叶酸钙

答案：C

6.利福平与口服避孕药合用

A: 后者血药浓度下降，药效降低

B: 不良反应叠加

C: 后者血药浓度升高，不良反应增加

D: 药理作用拮抗

答案：A

7.可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂的药物是()

A：灰黄霉素

B：环丙沙星

C：克霉唑

D：咪康唑

答案：B

8.可导致神经毒性(手指、足趾麻木、腱反射消失)的抗肿瘤药是

A：紫杉醇

B：柔红霉素

C：长春新碱

D：博来霉素

答案：C

9.门冬酰胺酶能抑制蛋白质的合成，使细胞停止于()，从而降低其对甲氨蝶呤的敏感性，限制甲氨蝶呤的骨髓毒性

A：G

B：G

C：M期

D：G

答案：D

10.用于阵发性室上性心动过速的钙通道阻滞药是

A：维拉帕米

B：胺碘酮

C：苯妥英钠

D：利多卡因

答案：A

11.可同时作用于胰岛α、β细胞的是

A: 二甲双胍

B: 胰岛素

C: 西格列汀

D: 格列本脲

答案：C

12.可减少神经元囊泡释放乙酰胆碱，使平滑肌或横纹肌暂时麻痹，改善膀胱储尿功能的药物是

A: 奥昔布宁

B: 西地那非

C: A型肉毒毒素

D: 睾酮

答案：C

13.对地高辛中毒出现异位心律者可静脉注射

A: 阿托品

B: 氯化钾、葡萄糖注射液

C: 利尿剂

D: 苯妥英钠

答案：D

14.一般补钾速度不超过

A: 10mmol/h

B: 10mmol/min

C: 10mol/h

D: 10mol/min

答案：A

15.对浅部真菌和深部真菌均有抗菌作用的是()

A：咪康唑

B：红霉素

C：庆大霉素

D：阿昔洛韦

答案：A

16.阻止胞苷酸转化为脱氧胞苷酸

A：阿糖胞苷

B：氟尿嘧啶

C：羟基脲

D：甲氨蝶呤

答案：C

17.外科皮肤伤口或肢体溃疡的局部治疗宜选用

A：地屈孕酮

B：阿霉素

C：环磷酰胺

D：聚甲酚磺醛

答案：D

18.能明显抑制骨髓造血功能的药物是

A：青霉素G

B：氯霉素

C：红霉素

D：庆大霉素

答案：B

19.易导致血糖异常的药品是

A: 庆大霉素

B: 多西环素

C: 加替沙星

D: 头孢哌酮

答案：C

20.乳果糖禁用于

A: 急腹症

B: 肝性脑病

C: 哺乳期

D: 妊娠期

答案：A

21.（2018年真题）可与奎尼丁发生与P糖蛋白有关的相互作用的药物是（）

A: 达比加群酯

B: 华法林

C: 肝素钠

D: 低分子肝素

答案：A

22.能松弛前列腺和膀胱括约肌，很少发生低血压的抗前列腺增生症药为

A: 坦洛新

B: 乙酰唑胺

C：酚苄明

D：特拉唑嗪

答案：A

23.依托泊苷注射液的溶媒选择要求是

A：氯化钠注射液稀释

B：先用氯化钠注射液溶解,再用5%葡萄糖注射液进一步稀释

C：5%葡萄糖注射液稀释

D：先用乳酸钠注射液溶解,再用氯化钠注射液或5%葡萄糖注射液进一步稀释

答案：A

24.属于Ⅰa类抗心律失常药的是

A：胺碘酮

B：利多卡因

C：奎尼丁

D：普罗帕酮

答案：C

25.下列哪项是避免奥沙利铂的剂量依赖性神经系统毒性，避免出现咽喉痉挛等严重后果的措施

A：禁食冷饮冷水、接触凉物

B：禁止接触塑料制品

C：禁食热饮热水

D：用生理盐水做溶剂

答案：A

26.餐后1~2小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

A: 铝碳酸镁

B: 米索前列醇

C: 枸橼酸铋钾

D: 兰索拉唑

答案：A

27.糖肽类药的主要作用靶点是

A: 核糖体的30S亚基

B: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

C: 细胞内膜PBP

D: 核糖体的50S亚基

答案：B

28.通过阻断血管紧张素II受体而治疗慢性心功能不全的药物是()

A: 美托洛尔

B: 氯沙坦

C: 地高辛

D: 氨力农

答案：B

29.周某，男，31岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

A: 尽量选择三价铁

B: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离

C: 选择适宜的病期、疗程和监测

D: 注意预防铁负荷过重

答案：A

30.患者，女，26岁，妊娠3个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是()。

A: 左氧氟沙星

B: 头孢氨苄

C: 青霉素G

D: 阿莫西林

答案：A

31.下列药物与甲氧氯普胺合用，可增加锥体外系不良反应风险的是

A: 奥司他韦

B: 干扰素

C: 金刚烷胺

D: 阿昔洛韦

答案：C

32.（2016年真题）属于胆固醇吸收抑制剂的是

A: 阿昔莫司

B: 阿托伐他汀

C: 依折麦布

D: 非诺贝特

答案：C

33.糖皮质激素用于某些慢性病的长期疗法中，采用隔日1次给药法，将48小时用量一次服用，合适的时间是

A: 中午12时

B: 下午6时

C: 下午3时

D: 上午8时

答案：D

34.下列不属于凝血因子X抑制剂的是

A：阿哌沙班

B：利伐沙班

C：磺达肝癸钠

D：华法林

答案：D

35.作用于对青霉素敏感的革兰阳性菌以及部分革兰阴性杆菌的药物是()

A：阿莫西林

B：克拉维酸

C：亚胺培南

D：氨曲南

答案：A

36.（2015年真题）属于二肽基肽酶-4抑制剂的是（）。

A：阿卡波糖

B：西格列汀

C：罗格列酮

D：二甲双胍

答案：B

37.口服首过消除明显，常舌下给药的是

A：普萘洛尔

B：阿昔莫司

C：胍乙啶

D：硝酸甘油

答案：D

38.口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物是

A：磺胺嘧啶

B：磺胺米隆

C：磺胺甲噁唑

D：柳氮磺吡啶

答案：D

39.以下PPI中，主要代谢酶是CYP3A4的是

A：泮托拉唑

B：雷贝拉唑

C：奥美拉唑

D：兰索拉唑

答案：D

40.属于浓度依赖性抗菌药物的是

A：氨曲南

B：拉氧头孢

C：庆大霉素

D：头孢西丁

答案：C

41.为高分子聚合物，通过增加局部渗透压软化大便，对肠道pH没有影响的是

A：乳果糖

B：酚酞

C：开塞露

D：聚乙二醇4000

答案：D

42.抑制血管紧张素转化酶的药物是

A：卡托普利

B：氯沙坦

C：米力农

D：洛伐他汀

答案：A

43.葡萄糖和胰岛素一起静脉滴注，可以用来治疗的是

A：低钠血症

B：低钾血症

C：高钾血症

D：高钠血症

答案：C

44.患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。

A：胃食管反流病

B：糖尿病胃轻瘫

C：功能性消化不良

D：化疗所致的恶心、呕吐

答案：D

45.肝癌晚期患者疼痛剧烈，可以选用的镇痛药物是

A：可待因

B：阿司匹林

C：哌替啶

D：布桂嗪

答案：C

46.西咪替丁与氨基糖苷类药物合用

A：出现呼吸抑制或停止

B：减慢药物代谢速度

C：可升高合用药物的血浆药物浓度

D：使后者药效降低

答案：A

47.成人应用0．1%溶液，儿童应用0．05%溶液，这种药物是

A：羟甲唑啉滴鼻液

B：赛洛唑啉滴鼻液

C：酚甘油滴耳液

D：麻黄碱滴鼻液

答案：B

48.用于散瞳的眼用药物是

A：溴莫尼定

B：毛果芸香碱

C：复方托吡卡胺

D：噻吗洛尔

答案：C

49.中和胃酸的药物是()

A: 雷尼替丁

B: 哌仑西平

C: 氢氧化铝

D: 奥美拉唑

答案：C

50.以下药物中，不属于抗胆碱能扩瞳药的是

A: 新福林

B: 东莨菪碱

C: 后马托品

D: 阿托品

答案：A

51.可使青光眼患者症状加重的是()

A: 沙美特罗

B: 噻托溴铵

C: 沙丁胺醇

D: 孟鲁司特

答案：B

52.使用铁制品煎煮酸性食物

A: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退

B: 过敏反应

C: 细胞缺氧、酸中毒、休克

D: 锥体外系反应

答案：C

53.以下抗寄生虫药的使用方法错误的是

A：阿苯达唑治疗蛲虫病一次即为一疗程，药片需用水吞服

B：左旋咪唑驱蛔虫空腹或睡前顿服

C：蛲虫病易自身重复感染，故在阿苯达唑治疗2周后应重复治疗一次

D：氯硝柳胺驱牛带绦虫和猪带绦虫应空腹吞服

答案：D

54.可能诱发心绞痛的降压药是

A：可乐定

B：哌唑嗪

C：肼屈嗪

D：普萘洛尔

答案：C

55.假膜性肠炎或食物中毒应首选的微生态制剂是()

A：酪酸菌

B：双歧三联活菌

C：枯草杆菌

D：粪肠球菌

答案：A

56.禁用于妊娠期高血压疾病者的是

A：氯化钙

B：氯化钠

C：硫酸镁

D：氯化钾

答案：B

57.关于万古霉素，描述错误的是

A：可用于对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染

B：作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成

C：肾功能不全者无需调整剂量

D：属于杀菌剂

答案：C

58.（2018年真题）肾结石患者禁用的药物是（）

A：苯溴马隆

B：非布索坦

C：别嘌醇

D：秋水仙碱

答案：A

59.适用于各型高血压，对原发性或肾性高血压均有效的是

A：肼屈嗪

B：氢氯噻嗪

C：卡托普利

D：拉贝洛尔

答案：C

60.疥疮及阴虱病可选用()

A：维A酸

B：阿达帕林

C：林旦霜

D：酮康唑

答案：C

61.属于疾病特异型肠内营养药的是

A：TP

B：视黄酸

C：视黄醇

D：TPF-D

答案：D

62.关于地西泮的作用特点，叙述错误的是

A：剂量加大可引起麻醉

B：小于镇静剂量时即有抗焦虑作用

C：可增强其他中枢抑制药的作用

D：有良好的抗癫痫作用

答案：A

63.在体外无抗凝作用，在体内有抗凝作用的是

A：肝素

B：噻氯匹定

C：尿激酶

D：华法林

答案：D

64.治疗立克次体感染选用

A：多西环素

B：磺胺嘧啶

C：红霉素

D：庆大霉素

答案：A

65.噻嗪类利尿药的作用部位是

A：远曲小管近端

B：Na+-Cl-共转运子

C：磷酸二酯酶

D：Na+-K+-2Cl-同向转运子

答案：A

66.低剂量可提供接近全效降压作用的药物是

A：氢氯噻嗪

B：阿米洛利

C：螺内酯

D：氨苯蝶啶

答案：A

67.可用于对乙酰氨基酚中毒解救，颗粒剂还能加入果汁中服用的祛痰药物是

A：羧甲司坦

B：氨溴索

C：乙酰半胱氨酸

D：溴己新

答案：C

68.可能导致牙龈出血的药物是

A：普萘洛尔

B：依诺肝素

C：普伐他汀

D：拉西地平

答案：B

69.（2019年真题）服用异烟肼进行抗结核治疗的患者，为预防周围神经炎，应补充的维生素是（）

A：维生素

B：维生素A

C：维生素B2

D：维生素B6

答案：D

70.避孕药的作用机制不包括

A：改变子宫颈黏液

B：使子宫腺体制造糖原减少

C：使子宫黏膜内腺体生长

D：抑制排卵

答案：C

71.（2019年真题）体内代谢迅速，严重过量导致出血时，可用鱼精蛋白拮抗的药物是（）

A：氯吡格雷

B：依诺肝素

C：阿司匹林

D：肝素

答案：D

72.主要作用促使细胞中微管装配，抑制微管解聚的抗肿瘤药物是

A：放线菌素

B：氟尿嘧啶

C：紫杉醇

D：顺铂

答案：C

73.双香豆素与苯巴比妥合用可

A：与其竞争结合血浆蛋白

B：竞争性对抗

C：诱导肝药酶加速灭活，作用减弱

D：产生协同作用

答案：C

74.具有低毒，可用于对青霉素类、头孢菌素类过敏的患者的药物是()

A：克拉维酸

B：亚胺培南

C：阿莫西林

D：氨曲南

答案：D

75.适用于磺酰脲类降糖药治疗不理想的2型糖尿病患者的药物是

A：骨化三醇

B：瑞格列奈

C：葡萄糖酸钙

D：利拉鲁肽

答案：B

76.下列哪类药物属于快速杀菌药()

A：氨基糖苷类

B：氯霉素类

C：红霉素

D：多黏菌素B

答案：A

77.下列钙通道阻滞剂中可用于治疗心律失常的是

A：左旋氨氯地平

B：拉西地平

C：维拉帕米

D：硝苯地平

答案：C

78.利福平与口服避孕药合用()

A：子宫内膜突破性出血

B：抑制排酸作用

C：代谢加速而导致意外怀孕

D：代谢加快而失效

答案：C

79.（2017年真题）属于外周多巴胺受体阻断剂,直接阻断胃肠道多巴胺D2受体的促胃肠动力药是（）

A：甲氧氯普胺

B：多潘立酮

C：昂丹司琼

D：莫沙必利

答案：B

80.噻嗪类利尿药可用于治疗肾性尿崩症及加压素无效的垂体性尿崩症，是因为其可以抑制

A: Na+-K+-2Cl-同向转运子

B: Na+-Cl-共转运子

C: 远曲小管近端

D: 磷酸二酯酶

答案：D

81.对服用双炔失碳酯后月经周期延长或闭经者，可加服

A: 去氧孕烯

B: 甲羟孕酮和炔雌醇

C: 炔雌醇

D: 维生素B6

答案：B

82.对铜绿假单胞菌作用较强的头孢菌素是()

A: 头孢拉定

B: 头孢噻吩

C: 头孢哌酮

D: 头孢唑林

答案：C

83.物质代谢过程中催化"一碳单位"转移反应的辅酶组成成分是

A: 维生素

B: 维生素B

C: 维生素A

D: 叶酸

答案：D

84.属于长效β

A：多索茶碱

B：布地奈德

C：沙丁胺醇

D：沙美特罗

答案：D

85.糖皮质激素的抗中毒性休克作用是

A：提高机体对细菌内毒素的耐受力

B：抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理

C：抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶

D：提高中枢神经系统的兴奋性

答案：A

86.作用机制是有丝分裂抑制剂的是

A：紫杉醇

B：吉非替尼

C：枸橼酸他莫昔芬

D：巯嘌呤

答案：A

87.适用于需要尽快解决急性症状的抗前列腺增生症药物是

A：丙酸睾酮

B：非那雄胺

C：坦洛新

D：西地那非

答案：C

88.与醛固酮受体竞争性结合，拮抗醛固酮作用的保钾排钠药物是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/348057133051007022