

2024 湖北省郧西县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题（典优）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于外周多巴胺受体阻断剂，直接阻断胃肠道多巴胺 D

- A: 昂丹司琼
- B: 多潘立酮
- C: 甲氧氯普胺
- D: 莫沙必利

答案：B

2. 糖皮质激素用于结缔组织病、肾病综合征、顽固性支气管哮喘宜选择的给药方法是

- A: 一般剂量长期疗法
- B: 大剂量冲击疗法
- C: 小剂量替代疗法
- D: 隔日一次给药法

答案：A

3. 可增强糖尿病患者口服磺酰脲类药降糖作用，引起严重低血糖的药物是

- A: 雷尼替丁
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 甲氧氯普胺
- D: 甘草酸二铵

答案：A

4. 关于孟鲁司特钠临床使用注意事项的说法，正确的

- A: 通过抑制磷酸二酯酶的活性而发挥作用
- B: 孟鲁司特钠对阿司匹林诱发的哮喘无效
- C: 孟鲁司特钠起效快，适用于哮喘急性发作
- D: 孟鲁司特钠使用后可能会导致嗜酸性粒细胞增多

答案：D

5. 可能诱发心绞痛的降压药是

- A: 可乐定
- B: 哌唑嗪
- C: 普萘洛尔
- D: 肼屈嗪

答案：D

6. 与瑞格列奈无药物相互作用的是

- A: 环孢素
- B: 吉非贝齐
- C: 克拉霉素
- D: 伊曲康唑

答案：C

7. (2020 年真题) 关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

- A: 易引起直立性低血压
- B: 能降低血清前列腺特异性抗原 (PSA) 水平
- C: 小剂量可促进头发生长，用于治疗源性脱发
- D: 可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮

答案：A

8. 可能导致跟腱断裂和血糖异常的抗菌药物是

- A: 加替沙星
- B: 甲砒霉素
- C: 多西环素
- D: 庆大霉素

答案：A

9. (2020 年真题) 可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药物是

- A: 氯化铵
- B: 氯化钠
- C: 硫酸镁
- D: 乳酸钠

答案：D

10. (2018 年真题) 关于莫西沙星作用特点的说法，错误的是 ()

- A: 莫西沙星属于浓度依赖型抗菌药物
- B: 莫西沙星可经验性用于社区获得性肺炎的治疗
- C: 莫西沙星组织分布广泛，但不能透过血脑屏障
- D: 莫西沙星抗菌谱广，对常见革兰阴性及革兰阳性菌均具有良好抗菌活性

答案：C

11. 作用优于磺酰脲类，适用餐后血糖升高的治疗药是

- A: 二甲双胍
- B: 格列齐特
- C: 格列本脲
- D: 阿卡波糖

答案：D

12. 下列关于利巴韦林作用机制的描述中，不正确的是

- A: 破坏病毒复制与传播
- B: 减少病毒核糖核酸和蛋白质合成
- C: 抑制病毒合成酶
- D: 可竞争性抑制 DNA 多聚酶

答案：D

13. 可引起致死性肺毒性和肝毒性的抗心律失常药物是

- A: 胺碘酮
- B: 奎尼丁
- C: 维拉帕米
- D: 普萘洛尔

答案：A

14. 属于必需磷脂类的保肝药是

- A: 甘草酸二胺
- B: 联苯双酯
- C: 多烯磷脂酰胆碱
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：C

15. 可增加维生素 B6 经肾排出量的药物是

- A: 乙胺丁醇
- B: 吡嗪酰胺
- C: 异烟肼
- D: 红霉素

答案：C

16. 与胆汁酸结合而降血脂的药物是

- A: 考来烯胺
- B: 洛伐他汀
- C: 烟酸
- D: 氯贝丁酯

答案：A

17. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖
- B: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀
- C: 服药过程中适当补充维生素 B
- D: 若出现低血糖反应，应立即饮用蔗糖水

答案：D

18. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 氨苯蝶啶
- B: 乙酰唑胺
- C: 呋塞米
- D: 呋达帕胺

答案：C

19. 与吗啡合用可发生严重的、甚至致死的不良反应，包括躁狂、多汗、僵直、呼吸抑制、昏迷、惊厥和高热的药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 丙戊酸钠
- C: 吗氯贝胺
- D: 氯硝西洋

答案：C

20. 对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌等的作用均很强的头孢类药物是

- A: 第四代头孢菌素
- B: 第一代头孢菌素
- C: 第三代头孢菌素
- D: 第二代头孢菌素

答案：A

21. （2016 年真题）易发生持续性干咳不良反应的药品是

- A: 福辛普利
- B: 硝酸甘油
- C: 硝苯地平
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

22. （2020 年真题）痛风缓解期，抑制内源性尿酸生成的药物是

- A: 秋水仙碱
- B: 碳酸氢钠
- C: 苯溴马隆
- D: 非布司他

答案：D

23. 可用维生素 B6 防治的异烟肼的不良反应是

- A: 周围神经炎
- B: 肝损伤
- C: 胃肠道反应
- D: 过敏反应

答案：A

24. 治疗敏感菌所致成人伤寒、副伤寒的应选药物是()

- A: 呋喃妥因
- B: 左氧氟沙星
- C: 氯霉素
- D: 磺胺嘧啶

答案：B

25. 对服用双炔失碳酯后月经周期延长或闭经者，可加服

- A: 维生素 B6
- B: 甲羟孕酮和炔雌醇
- C: 去氧孕烯
- D: 炔雌醇

答案：B

26. 抗菌活性强，并对 β -内酰胺酶高度稳定，属于碳青霉烯类的抗菌药物是()。

- A: 头孢吡肟
- B: 头孢美唑
- C: 氨曲南

D: 亚胺培南

答案：D

27. 常用于引产或催产，亦用于产后出血和子宫复原不全

A: 麦角新碱

B: 缩宫素

C: 普拉睾酮

D: 地诺前列酮

答案：B

28. 能明显抑制骨髓造血功能的药物是

A: 氯霉素

B: 青霉素 G

C: 庆大霉素

D: 红霉素

答案：A

29. 与氯吡格雷合用，竞争 CYP2C19，使用氯吡格雷患者血栓不良反应事件增多的药物是

A: 泮托拉唑

B: 奥美拉唑

C: 西咪替丁

D: 雷贝拉唑

答案：B

30. 兰索拉唑属于

A: H₂ 受体阻断药

B: M 受体阻断药

C: H^+ , K^+ -ATP 酶抑制剂

D: 胃泌素受体阻断药

答案: C

31. 茚地那韦的作用靶点是

A: HIV-1 反转录酶

B: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

C: 神经氨酸酶

D: 脱氧核糖核酸聚合酶

答案: B

32. 缓解轻、中度急性哮喘症状的首选药是

A: 沙美特罗

B: 特布他林

C: 福莫特罗

D: 丙卡特罗

答案: B

33. 用于严重饥饿性酮症严重者的治疗方案是

A: 应用高渗透压的 25%-50% 葡萄糖注射液滴注，常与 20% 甘露醇注射液联合应用

B: 一般可给予 10%~25% 葡萄糖注射液静脉滴注，并同时补充体液

C: 可予 10%~25% 葡萄糖注射液滴注，每日 100g 葡萄糖即可控制病情

D: 一般采用 50% 葡萄糖注射液 20~40ml，快速静脉注射

答案: C

34. (2018 年真题) 可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是 ()

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 塞来昔布
- C: 阿司匹林
- D: 双氯芬酸

答案: C

35. 有关氨茶碱平喘作用的叙述错误的是

- A: 拮抗腺苷受体
- B: 激活腺苷酸环化酶
- C: 促进肾上腺素释放
- D: 激活磷酸二酯酶

答案: D

36. 冠状动脉支架置入术前一日起开始口服阿司匹林，剂量为每日

- A: 150~300mg
- B: 10~25mg
- C: 75~150mg
- D: 25~50mg

答案: D

37. 可引起锥体外系反应的药物是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 甲氧氯普胺
- C: 雷尼替丁
- D: 甘草酸二铵

答案: B

38. 作用更为持久和抑制新骨形成的作用极低，可长期滞留于骨组织中，半衰期最长可达 300 日的第二代钙代谢调节药是

- A: 帕米膦酸二钠
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 依替膦酸二钠
- D: 唑来膦酸

答案：A

39. 属于促性腺激素释放激素类似物的是()

- A: 米非司酮
- B: 普拉睾酮
- C: 戈那瑞林
- D: 达那唑

答案：C

40. 防止急性深静脉血栓形成的药物是

- A: 达肝素钠
- B: 维生素 K1
- C: 香豆素类
- D: 维生素 B12

答案：A

41. 以上属于成瘾产妇的新生儿戒断症状的是

- A: 哈欠、打喷嚏、流涕、出汗
- B: 惊厥、震颤、反射加速、发热
- C: 胃痉挛、心动过速、极度疲乏
- D: 神经过敏、失眠、恶心、呕吐

答案：B

42. 作用于对青霉素敏感的革兰阳性菌以及部分革兰阴性杆菌的药物是()
()

- A: 氨曲南
- B: 亚胺培南
- C: 阿莫西林
- D: 克拉维酸

答案：C

43. 对肾功能影响较小的抗高血压药是()

- A: 利血平
- B: 胍乙啶
- C: 肼屈嗪
- D: 卡托普利

答案：C

44. 不可用于治疗白细胞减少的药物是

- A: 利伐沙班
- B: 腺嘌呤
- C: 糖皮质激素
- D: 利可君

答案：A

45. 属于抗炎类保肝药的是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 异甘草酸镁
- C: 还原型谷胱甘肽

D: 双环醇

答案：B

46. 可作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

A: 克拉维酸

B: 亚胺培南

C: 阿莫西林

D: 氨基曲南

答案：D

47. 需要迅速抗血小板作用时，不宜选择的药物是

A: 阿替普酶

B: 普萘洛尔

C: 噻氯匹定

D: 硝酸甘油

答案：C

48. (2020 年真题) 长期使用可引起维生素 B12 缺乏的药物是

A: 阿司匹林

B: 头孢哌酮

C: 华法林

D: 二甲双胍

答案：D

49. 出现流感样症候群，寒战、发热的药物是

A: 利福平

B: 对氨基水杨酸

C: 异烟肼

D: 链霉素

答案: A

50. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

A: 慢代谢型患者

B: 快代谢型患者

C: 超快代谢型患者

D: 中间代谢型患者

答案: A

51. 下列选项中，主要用于控制疟疾复发和传播的药物是()。

A: 青蒿素

B: 氯喹

C: 奎宁

D: 伯氨喹

答案: D

52. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食，增强运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片 20mg / d 治疗。

A: 80mg

B: 20mg

C: 100mg

D: 40mg

答案: A

53. 克林霉素与红霉素合用 ()

- A: 不良反应叠加
- B: 后者血药浓度升高，不良反应增加
- C: 药理作用拮抗
- D: 后者血药浓度下降，药效降低

答案：C

54. 患者，男，63 岁，慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者。因近来夜间喘息加重就诊。对其因迷走神经张力过高所致的气道狭窄，宜选用的药物是

- A: 白三烯调节剂
- B: 沙丁胺醇
- C: 吸入型糖皮质激素
- D: 异丙托溴铵

答案：D

55. 呋塞米与抗组胺药合用时

- A: 利尿作用减弱
- B: 耳毒性增加
- C: 低氯性碱中毒机会增加
- D: 引起电解质紊乱的概率增加

答案：B

56. （2020 年真题）属于肝药酶诱导剂，与华法林合用会减弱后者抗凝作用的药物是

- A: 唑吡坦
- B: 丙戊酸钠
- C: 氯苯那敏

D: 苯妥英钠

答案：D

57. 下列对红霉素的说法错误的是()

A: 是治疗军团病的首选药

B: 作用机制是抑制蛋白质合成

C: 对革兰阳性菌作用强大

D: 容易透过血脑屏障

答案：D

58. 平喘作用维持 4~6 小时，是缓解轻、中度急性哮喘症状的首选药是

A: 沙丁胺醇

B: 沙美特罗

C: 丙卡特罗

D: 福莫特罗

答案：A

59. 下列不属于肽类抗生素的是

A: 利奈唑胺

B: 多黏菌素 B

C: 万古霉素

D: 去甲万古霉素

答案：A

60. 扩张脑血管作用较强，能增加脑血流量的钙通道阻滞剂是（）

A: 尼莫地平

B: 非洛地平

C: 拉西地平

D: 氨氯地平

答案：A

61. (2021 年真题) 常与 ACEI 联用，在协同降压的同时，兼具防治高钾血症的中效利尿剂是 ()

A: 乙酰唑胺

B: 螺内酯

C: 氢氯噻嗪

D: 甘油果糖

答案：C

62. 具有较强的 M 受体阻断作用，能直接解除膀胱逼尿肌痉挛，改善膀胱储尿功能的药物是

A: 睾酮

B: A 型肉毒毒素

C: 西地那非

D: 奥昔布宁

答案：D

63. 用于功能性子宫出血、妊娠早期先兆流产、习惯性流产的是

A: 噻啉啉

B: 绒促性素

C: 硝苯地平

D: 米非司酮

答案：B

64. 白女士，74 岁，以“间断性腹胀 1 月余”主诉入院。患者 1 个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史 14 年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：

- A: 肝功能不全
- B: 高血钾
- C: 磺酰脲类过敏
- D: 无尿

答案：A

65. 适用于磺酰脲类降糖药治疗不理想的 2 型糖尿病患者的药物是

- A: 骨化三醇
- B: 利拉鲁肽
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 瑞格列奈

答案：D

66. 下述关于留钾利尿药作用特点的描述，正确的是()

- A: 对肝硬化者无效
- B: 利尿作用强，药效持久
- C: 具有抑制心肌纤维化的功能
- D: 其利尿作用与体内的醛固酮浓度无关

答案：C

67. 通过与寄生虫肠细胞微管蛋白特异性结合而干扰其细胞微管形成，可使寄生虫肠道超微结构退化，从而破坏寄生虫对葡萄糖的吸收及消化功能，最终导致寄生虫死亡的药物是

- A: 哌嗪
- B: 甲苯咪唑

C: 左旋咪唑

D: 阿苯达唑

答案: B

68. 中毒后可用等剂量维生素 B

A: 对氨基水杨酸

B: 异烟肼

C: 利福平

D: 乙胺丁醇

答案: B

69. 溶栓药的使用禁忌证不包括

A: 活动性内脏出血

B: 1 年内有缺血性脑卒中或脑血管事件

C: 既往有出血性脑卒中史

D: 月经期间

答案: D

70. 用于甲型和乙型流感治疗的药物是

A: 拉米夫定

B: 吡喹酮

C: 乙胺嘧啶

D: 奥司他韦

答案: D

71. 抑制绦虫细胞内线粒体的氧化磷酸化过程，高浓度时可抑制虫体呼吸并阻断对葡萄糖的摄取，从而使之发生变质的是

A: 三苯双脒

B: 葡萄糖酸锑钠

C: 氯硝柳胺

D: 伯氨喹

答案：C

72. 将乙胺丁醇与链霉素合用治疗结核病的目的是

A: 延长链霉素作用时间

B: 延迟肾脏排泄链霉素

C: 阻止或延迟结核杆菌对链霉素产生耐药性

D: 有利于药物进入结核感染病灶

答案：C

73. 属于二肽基肽酶-4（DPP-4）抑制剂的是

A: 沙格列汀

B: 瑞格列奈

C: 罗格列酮

D: 格列美脲

答案：A

74. 急性化脓性中耳炎的局部治疗方案正确的是

A: 鼓膜穿孔前用无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用 2%酚甘油滴耳序贯治疗

B: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

C: 鼓膜穿孔前可使用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，鼓膜穿孔后可用 2%酚甘油滴耳，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

D: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，再用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道以防止进一步感染

答案：B

75.（2021 年真题）渗透性强，可透过甲板，属于吡啶酮类的抗真菌药物是（）

- A: 环吡酮胺
- B: 特比萘芬
- C: 米卡芬净
- D: 克霉唑

答案：A

76.可掩盖顺铂所致的耳鸣、眩晕等症状的药物是

- A: 苯海拉明
- B: 呋塞米
- C: 甲氨蝶呤
- D: 丙磺舒

答案：A

77.（2019 年真题）服用阿司匹林可增加患者消化道黏膜损伤和胃溃疡的风险，为降低此风险，应采取的措施是（）

- A: 不推荐 65 岁以上老年患者使用阿司匹林进行冠心病二级预防
- B: 使用阿司匹林前宜先根治幽门螺杆菌感染
- C: 阿司匹林不应与其他抗血小板药物合用
- D: 应长期合用质子泵抑制剂

答案：B

78.抗血栓形成、保护动脉内皮的调血脂药是

- A: 普伐他汀
- B: 阿伐他汀

C: 藻酸双酯钠

D: 氟伐他汀

答案: C

79. 关于利多卡因的叙述正确的是

A: 可用于房颤的复律治疗和复律后的维持

B: 可治疗房性期前收缩

C: 可治疗阵发性室上性心动过速

D: 为窄谱抗心律失常药，仅用于室性心律失常

答案: D

80. 糖皮质激素的药理作用不包括

A: 免疫抑制

B: 抗病毒

C: 抗炎

D: 抗休克

答案: B

81. 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的目的是

A: B 淋巴细胞表面的 CD20

B: 表皮生长因子受体

C: 人表皮生长因子受体-2

D: 血管内皮生长因子

答案: C

82. 雷尼替丁用于治疗消化性溃疡的机制是

A: 竞争性拮抗 H1 受体

B: 竞争性拮抗 H₂ 受体

C: 抑制胃壁细胞 H⁺, K⁺-ATP 酶

D: 直接中和胃酸

答案: B

83. (2016 年真题) 属于 α-葡萄糖苷酶抑制剂的是

A: 二甲双胍

B: 艾塞那肽

C: 那格列奈

D: 阿卡波糖

答案: D

84. 用于高血压、冠心病、心绞痛的是

A: 米非司酮

B: 噻啉啉

C: 绒促性素

D: 硝苯地平

答案: D

85. 属于 GLP-1 受体激动剂的药物是

A: 利拉鲁肽

B: 伏格列波糖

C: 那格列奈

D: 阿格列汀

答案: A

86. 可用于治疗甲癣、足癣、体癣和股癣等浅表性真菌感染的药品是()

。

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/348071124042007022>