

血液系统试题(19护4班)

姓名：[填空题] *

班级：[填空题] *

学号：[填空题] *

1. 小细胞低色素性贫血常见于: [单选题] *

- A. 巨幼细胞贫血
- B. 缺铁性贫血(正确答案)
- C. 溶血性贫血
- D. 失血性贫血
- E. 再生障碍性贫血

2. 我国最常见的的贫血类型为: [单选题] *

- A. 再生障碍性贫血
- B. 巨幼细胞性贫血
- C. 缺铁性贫血(正确答案)
- D. 恶性贫血
- E. 溶血性贫血

3. 含铁量最少的食物是: [单选题] *

- A. 蛋黄
- B. 牛奶(正确答案)

- C.豆类
- D.黑木耳
- E.瘦肉

4. 体内铁吸收的主要部位是: [单选题] *

- A.胃
- B.十二指肠及空肠上端(正确答案)
- C.空肠下端
- D.结肠
- E.直肠

5. 缺铁性贫血的主要病因是 [单选题] *

- A. 慢性失血(正确答案)
- B.铁的摄入不足
- C.铁的吸收不良
- D.铁的需要量增加
- E.骨髓造血功能下降

6. 导致女性缺铁性贫血最常见的原因是 [单选题] *

- A. 妊娠
- B.胃大部分切除术后
- C.育龄妇女
- D.月经过多(正确答案)
- E.缺乏维生素 B12

7. 最能反映贫血的实验室检查指标是 [单选题] *

- A. 红细胞计数

- B.红细胞沉降率
- C.网织红细胞计数
- D.血红蛋白定量(正确答案)
- E.血清蛋白定量

8. 可准确反映贫血患者体内贮存铁情况，能作为缺铁依据的指标是 [单选题] *

- A. 血清铁蛋白(正确答案)
- B.含铁血黄素
- c.血清铁
- D.总铁结合力
- E.骨髓铁染色

9. 彻底治疗缺铁性贫血的关键在于 [单选题] *

- A. 给予含铁丰富食物
- B.口服铁剂
- C.注射铁剂
- D.去除病因(正确答案)
- E.应用应用糖皮质激素

10. 补充铁剂治疗贫血最佳给药途径是 [单选题] *

- A. 静脉注射
- B.肌肉注射
- C.皮下注射
- D.皮内注射
- E.口服(正确答案)

11. 口服硫酸亚铁必有的不良反应是 [单选题] *

A. 黑便(正确答案)

B.便秘

C.腹泻

D.破坏牙釉

E.腹痛

12. 贫血最突出的体征是 [单选题] *

A. 头晕

B.记忆力减退

C.皮肤黏膜苍白(正确答案)

D.心悸

E.耳鸣

13. 贫血病人皮肤粘膜苍白最易观察的部位 [单选题] *

A. 面颊

B.口腔粘膜

C.前胸

D.睑结膜、口唇、甲床(正确答案)

E.手背

14. 缺铁性贫血患者脑组织中铁依赖酶活性降低会出现 [单选题] *

A. 面色苍白

B.疲乏

C.头晕

D.耳鸣

E.异食癖(正确答案)

15. 缺铁性贫血患者口服铁剂的护理错误的是 [单选题] *

- A. 宜于进餐后服用
- B. 可与维生素
- c 同服 C. 禁饮浓茶
- D. 如有消化道反应，可与牛奶同服(正确答案)
- E. 液体铁剂应经稀释后用吸管服用，以防破坏牙釉

16. 关于口服铁剂治疗缺铁性贫血叙述错误的是 [单选题] *

- A. 从小剂量开始以减少胃肠道反应
- B. 与维生素
- C 同用可增强效果己 C. 服药后常出现大便发黑
- D. 血象恢复正常后可马上停药(正确答案)
- E. 服药 2 小时内禁止饮浓茶

17. 缺铁性贫血患者应选择含铁丰富的食物是 [单选题] *

- A. 低蛋白质
- B. 低维生素
- C. 动物内脏(正确答案)
- D. 牛奶
- E. 谷类

18. 正常细胞性贫血常见于 [单选题] *

- A. 巨幼细胞贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 地中海贫血
- D. 铁幼粒细胞性贫血
- E. 再生障碍性贫血(正确答案)

19. 导致再生障碍性贫血的主要原因是 [单选题] *

A. 骨髓造血功能衰竭(正确答案)

B. 红细胞破坏增多

C. 红细胞寿命缩短

D. 造血原材料缺乏

E. 红细胞内在缺陷

20. 引起继发性再生障碍性贫血最常见的药物是 [单选题] *

A. 阿司匹林

B. 保泰松

C. 氯霉素(正确答案)

D. 磺胺药

E. 再生障碍性贫血

21. 急性再生障碍性贫血患者易合并败血症的主要原因是 [单选题] *

A. 白细胞减少(正确答案)

B. 红细胞减少

C. 血小板减少

D. 血红蛋白减少

E. 网织红细胞减少

22. 再生障碍性贫血患者出血的主要原因是 [单选题] *

A. 血小板生成减少(正确答案)

B. 血小板寿命缩短

C. 血小板破坏增多

D. 播散性血管内凝血

E. 凝血因子减少

23. 再生障碍性贫血一般不出现 [单选题] *

- A. 网织红细胞减少
- B. 红细胞形态改变(正确答案)
- C. 红细胞减少
- D. 白细胞减少
- E. 血小板减少

24. 治疗慢性再障首选药物是 [单选题] *

- A. 雄激素(司坦唑醇)(正确答案)
- B. 免疫抑制剂
- C. 糖皮质激素
- D. 抗生素
- E. 铁剂

25. 关于雄激素的描述, 不正确的是 [单选题] *

- A. 可刺激肾脏产生促红细胞生成素
- B. 对骨髓有直接刺激红细胞生成作用
- C. 治疗慢性再生障碍性贫血的首选药
- D. 需治疗 3~6 个月才能判断疗效
- E. 该药吸收快, 需要深部肌肉注射(正确答案)

26. 哪项是严重的出血征象 [单选题] *

- A. 口腔粘膜出现血泡(正确答案)
- B. 刷牙时牙龈出血
- C. 鼻腔粘膜出血
- D. 轻微外伤后皮下淤血
- E. 大便潜血阳性

27. 血液病患者出现牙龈出血, 正确的护理措施是 [单选题] *

- A.去甲肾上腺素棉球贴敷牙龈
- B.5%过氧化氢液体漱口
- C.用牙签清理牙齿
- D.用液体石蜡涂抹口唇(正确答案)
- E.用牙刷刷牙

28. 急性再生障碍性贫血的早期突出表现为 [单选题] *

- A. 贫血
- B. 黏膜溃疡
- C. 出血与感染(正确答案)
- D. 骨髓增生减低
- E. 食欲减退

29. 慢性再生障碍性贫血首发和主要的表现是 [单选题] *

- A. 贫血(正确答案)
- B. 出血
- C. 感染
- D. 肝、脾、淋巴结肿大
- E. 胸骨压痛

30. 再生障碍性贫血与白血病临床表现不同的是 [单选题] *

- A. 贫血
- B. 出血
- C. 感染
- D. 肝、脾、淋巴结肿大(正确答案)
- E. 脑出血

31. 当再生障碍性贫血患者血小板低于 $20 \times 10^9/L$ 时，患者出现剧烈头痛、呕吐，应警惕的并发症是 [单选题] *

- A. 眼底出血
- B. 鼻出血
- C. 脑出血(正确答案)
- D. 关节出血
- E. 消化道大出血

32. 再生障碍性贫血的患者伴高热，不适宜的降温措施是 [单选题] *

- A. 温水擦浴
- B. 冰水灌肠
- C. 头部放冰袋
- D. 口服退热药
- E. 酒精擦浴(正确答案)

33. 特发性血小板减少性紫癜属于 [单选题] *

- A. 抗凝及纤维蛋白溶解异常
- B. 血小板功能异常
- C. 血管壁异常
- D. 凝血因子减少或缺乏
- E. 自身免疫性出血综合症(正确答案)

34. 特发性血小板减少性紫癜最主要的发病机制是 [单选题] *

- A. 骨髓生成巨核细胞数目减少
- B. 免疫因素(血中含有抗血小板抗体)(正确答案)
- C. 毛细血管脆性增加
- D. 骨髓造血功能衰竭

E.血小板功能异常

35. 特发性血小板减少性紫癜采用脾切除治疗的作用机制是 [单选题] *

- A. 降低血管壁通透性
- B. 刺激骨髓使血小板增生
- C. 抑制血小板与抗体结合
- D. 减少血小板破坏及抗体产生(正确答案)
- E. 阻滞单核-吞噬细胞系统吞噬、破坏血小板

36. 特发性血小板减少性紫癜首选的治疗是 [单选题] *

- A. 肾上腺糖皮质激素(正确答案)
- B. 脾切除
- C. 免疫抑制剂
- D. 输血小板
- E. 雄激素

37. 特发性血小板减少性紫癜治疗时应慎用的是 [单选题] *

- A. 感染时应使用抗生素
- B. 糖皮质激素
- c. 脾切除
- D. 输血
- E. 免疫抑制剂(正确答案)

38. 急性特发性血小板减少性紫癜的主要致死原因是 [单选题] *

- A. 颅内出血(正确答案)
- B. 呼吸道感染
- C. 消化道出血

- D.泌尿道感染
- E.皮肤粘膜出血

39. 关于慢性特发性血小板减少性紫癜叙述错误的是 [单选题] *

- A. 青年女性多见
- B.起病较缓慢
- C.常反复发作
- D.多出现血肿或血泡(正确答案)
- E.女性病人月经过多较常见

40. 血小板低于 $20 \times 10^9/L$ 的特发性血小板减少性紫癜患者要预防便秘和剧烈咳嗽，则会诱发 [单选题] *

- A. 胃肠道出血
- B.脑出血(正确答案)
- c.鼻出血
- D.血管神经性水肿
- E.感染

41. 特发性血小板减少性紫癜病人应避免使用 [单选题] *

- A. 泼尼松
- B.维生素
- C.环磷酰胺
- D.地塞米松
- E.阿司匹林(正确答案)

42. 特发性血小板减少性紫癜病人血小板低于多少时应绝对卧床，避免内脏出血 [单选题] *

A. $10 \times 10^9 / L$ (正确答案)

B. $20 \times 10^9 / L$

C. $30 \times 10^9 / L$

D. $40 \times 10^9 / L$

E. $50 \times 10^9 / L$

43. 有关特发性血小板减少性紫癜的护理下列哪项不妥 [单选题] *

A. 眼底出血者警惕颅内出血

B. 避免粗硬食物，以免粘膜损伤

C. 女性病人应避孕

D. 血小板在 $50 \times 10^9 / L$ 以下不要进行强体力劳动

E. 告知病人本病预后较差 (正确答案)

44. 下列哪项是急性特发性血小板减少性紫癜的特点 [单选题] *

A. 转为慢性

B. 反复发作

C. 自限性 (正确答案)

D. 急慢交替

E. 急性，易死亡

45. 慢性特发性血小板减少性紫癜的特点是 [单选题] *

A. 皮肤出血

B. 黏膜出血

C. 鼻、牙龈出血

D. 持续时间长、反复发作、症状轻 (正确答案)

E. 子宫出血

46. 特发性血小板减少性紫癜治疗首选 [单选题] *

A. 雌激素

B. 糖皮质激素(正确答案)

C. 脾切除

D. 免疫抑制药

E. 输血小板

47. 糖皮质激素治疗特发性血小板减少性紫癜的主要机制是 [单选题] *

A. 增加毛细血管通透性

B. 增加脾功能

C. 增加巨核细胞释放血小板

D. 抑制血小板抗体生成(正确答案)

E. 抑制巨核细胞破裂

48. 成人白血病中最常见的类型是 [单选题] *

A. 急性淋巴细胞白血病

B. 急性红白血病

C. 急性粒细胞白血病(正确答案)

D. 慢性粒细胞性白血病

E. 慢性淋巴细胞白血病

49. 儿童白血病中最常见的类型是 [单选题] *

A. 急性淋巴细胞白血病(正确答案)

B. 急性红白血病

C. 急性粒细胞白血病

D. 慢性粒细胞性白血病

E. 慢性淋巴细胞白血病

50. 不属于白血病发病原因的是 [单选题] *

- A. 病毒感染
- B. 放射
- C. 化学因素
- D. 遗传因素
- E. 免疫功能亢进(正确答案)

51. 急性白血病贫血的最主要原因是 [单选题] *

- A. 肝、脾、淋巴结肿大，致免疫力低下
- B. 白血病细胞代谢率增高
- C. 正常红细胞生成减少和出血(正确答案)
- D. 成熟粒细胞缺乏
- E. 血小板减少

52. 急性白血病发生感染的主要原因是 [单选题] *

- A. 白血病细胞代谢率增高
- B. 白细胞数量增加
- C. 成熟粒细胞缺乏(正确答案)
- D. 肝、脾、淋巴结肿大，致免疫力低下
- E. 正常红细胞生成减少

53. 急性白血病患者突然出现高热，主要原因为 [单选题] *

- A. 出血
- B. 正常红细胞减少
- C. 白血病细胞浸润
- D. 血小板减少
- E. 感染(正确答案)

54. 白血病患者易发生脑出血的血小板观测值是低于 [单选题] *

A. $10 \times 10^9 / L$

B. $20 \times 10^9 / L$ (正确答案)

C. $30 \times 10^9 / L$

D. $40 \times 10^9 / L$

E. $50 \times 10^9 / L$

55. 急性白血病人缓解期出现中枢神经系统白血病的主要原因是 [单选题] *

A. 疗程不够

B. 免疫功能低下

C. 化疗药剂量不足

D. 多数化疗药不易通过血脑屏障 (正确答案)

E. 对化疗药产生耐药性

56. 诊断白血病的重要依据是 [单选题] *

A. 血常规检查

B. 免疫学检查

C. 染色体检查

D. 脑脊液检查

E. 骨髓检查 (正确答案)

57. 能抑制尿酸合成，预防尿酸肾病的药物是 [单选题] *

A. 泼尼松

B. 长春新碱

C. 甲氨蝶呤

D. 别嘌醇 (正确答案)

E. 柔红霉素

58. 急性淋巴细胞白血病首选的化疗方案是 [单选题] *

A.VP(正确答案)

B.CDP

C.VAP

D.DA

E.HOAP

59. 急性非淋巴细胞白血病首选的化疗方案是 [单选题] *

A.VP

B.CDP

C.VAP

D.DA(正确答案)

E.HOAP

60. 防治中枢神经系统白血病的常用药物是 [单选题] *

A. 长春新碱

B. 足叶乙苷

C. 柔红霉素

D. 甲氨蝶呤(正确答案)

E. 环磷酰胺

61. 白血病化疗药物中易引起心肌及心脏传导损害的药物是 [单选题] *

A. 长春新碱

B. 泼尼松

C. 柔红霉素(正确答案)

D. 甲氨蝶呤

E. 环磷酰胺

62. 预防三尖杉酯类药物引起的心脏毒性的方法是 [单选题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/348143106005006037>