妇产科题答案

一、名词解释

1.子宫峡部：位于宫体与宫颈之间最狭窄的部位。

2.月经：是子宫内膜随卵巢的变化发生的周期性脱落及出血。

3．骨盆倾斜度：指妇女站立时，骨盆入口平面与地平面所形成的角度。

4．生理缩复环：临产后因子宫体肌纤维缩复作用使子宫体部肌壁越变越厚，子宫下段肌壁被动扩张越变越薄，两者交界处的内表面形成一环状隆起。

5．衔接：胎头双顶径进入骨盆入口平面，胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平。　6．胎头着冠：当胎头双顶径超越骨盆出口，在宫缩间歇期胎头也不再回缩。

7．产褥感染：是指分娩期及产褥期生殖道受病原体入侵引起的局部或全身性炎症变化。　8．产褥病率：是指分娩 24 小时后的 10 天内，用口表测体温 4|天有两次体温大于或等于 38 摄氏度。

9.胎盘早剥：妊娠 xx 年未孕者。

16．葡萄胎：妊娠后胎盘绒毛滋养细胞增生间质水肿，终末绒毛形成大小不等的水泡，水泡间有细蒂相连成串形如葡萄。

17．子宫破裂：在妊娠晚期或分娩前子宫体部或子宫下段发生破裂者。18．产后出血：胎儿娩出后 24 小时内阴道流血量大于等于 500ml 者。 二、填空

1．最先进入骨盆入口平面的胎儿部分称胎先露。

2．骨盆外测量常测得四条径线髂棘间径，髂嵴间径，骶耻外径，坐骨结节间径。 3．新生儿阿普加评分的依据是心率、呼吸、肌张力、喉反射、皮肤颜色。 4．接生时，会阴消毒先后用肥皂水、温开水、新洁尔灭。 5．子宫内膜异位症的主要症状是继发的、进行性的痛经。

6．输卵管妊娠治疗原则：以手术治疗为主，其次是非手术治疗．7．导致心脏病孕妇死亡的主要原因心力衰竭、严重感染。

8.产道异常临床分四类骨盆入口平面狭窄、中骨盆及骨盆出口平面狭窄、均小骨盆、畸形骨盆。

9.最常见得异常胎位是臀位，危害最大的异常胎位是横位。

10.临床上常用的加强宫缩的方法是人工破膜、静脉滴注缩宫素。 11.三合诊检查一般用于宫颈癌、子宫内膜异位症患者的检查 12.女性生殖器官恶性肿瘤死亡率最高的是宫颈癌。

13．宫颈癌的好发部位宫颈外口的鳞-柱状上皮交界处，早期症状是接触性阴道出血。 14.胎儿附属物是指胎儿以外

的组织，包括胎盘、胎膜、脐带及羊水。

15．胎盘的功能气体交换、营养物质供应、排除胎儿代谢产物、防御功能、合成功能、免疫功能。

16．胎动的时间一般在孕 18~xx 年期。

30．妊娠滋养细胞疾病是一组胎盘滋养细胞的疾病，包括和葡萄胎、侵蚀性葡萄胎、绒毛膜癌。

31．葡萄胎确诊后应及时清宫。

32．侵蚀性葡萄胎发生于葡萄胎排除半年以内；绒癌发生于葡萄胎排除一年以后。 33．卵巢肿瘤的并发症有蒂扭转、破裂、感染、恶变。 34.确诊子宫内膜癌最常用的方法是分段诊断性刮宫

.35．子宫肌瘤的变性有玻璃样变、囊性变、红色样变、肉瘤样变、钙化。 36．治疗宫颈癌常用的方法有手术、放疗及化疗 三、选择

1．下述哪一项是我国妇女最常见骨盆形态 B． 骨盆入口呈横椭圆形，中骨盆呈纵椭圆形，出口两个不同平面的三角形组成

2．关于女性外生殖器解剖，下列哪项是正确的？B． 女性外生殖器又称外阴 3.关于子宫峡部的上界，正确的是：B． 解剖学内口

8．关于卵巢动脉下列哪项是错误的？B． 双侧卵巢动脉均来自同侧肾动脉 9．关于阴道下列哪项是错误的？

E.　阴道与宫颈外口连接部称穹隆

11．某患者，女，12 岁，骑自行车时不慎跌倒，伤及外阴部，如出现外阴血肿，最易发生在：　B.　大阴唇

12．下列哪项无腹膜覆盖?E. 卵巢

8．月经后子宫内膜哪层再生　A.　基底层

9．对于月经的描述，错误的是：C.　月经周期的长短主要和黄体期有关

10．雌激素的生理作用错误的是：D.　使宫颈口闭合，粘液减少.变稠，拉丝度减少

11．月经周期中内分泌变化，正确的是 E.　月经前雌.孕激素共同作用，对下丘脑和垂体产生抑制

13．某 30 岁妇女，孕 1 产 0，月经规则，4/35 天一次，拟妊娠生育，末次月经为 3 月 xx 年 5 月 12 日，请推算预产期是 B. xx 年 2 月 19 日 ．骨盆外测量中最主要经线是 C. 骶耻外径

．下列错误的是 E. 枕左前位听胎心是在脐右下方听到 ．下列哪项不属于胎盘功能检查 E. 甲胎蛋白的测定

10. 4.观察产程进展时，进行胎心监测，哪项正确 C. 每次听诊 1 分钟

5．产妇，29 岁，孕 3 产 1 人流 2，孕 40 周，LOA，胎心 128 次/分，宫缩 40—45’’/1-3’，肛查：宫口开 4cm，入

院后首选的处理是？B 进产房接生

7. 新生儿出生后，心率 92 次/分，呼吸浅、慢，全身瘫软，皮肤苍白，嘴唇青紫，Apgar 评分为？B. 3 分

10.下列哪项符合正常产褥子宫复旧的规律：B 产后 4 周时，子宫颈完全恢复正常状态 11.产褥期是指产后:C 6 周

12.关于正常产褥，哪项是错误的：C 子宫复旧主要是子宫细胞数减少和体积缩小

10.下列属于正常妊娠期内分泌系统功能变化的是：B 分娩后若不哺乳，于产后 1 周内 PRL 降至非孕时水平

11.下列妊娠期消化系统的变化正确的是：E 妊娠期间易诱发胆石症

12.妊娠期卵巢的变化下列哪项是正确的：E 妊娠黄体的功能于孕 10 周后胎盘取代 13.妊娠期乳腺变化下列哪项正确：D 妊娠期无乳汁分泌可能与大量孕激素有关 14.妊娠期与泌乳无关的激素是：E 绒毛膜促性腺激素 24.产褥感染，最常见的是：A 急性子宫内膜炎

25.女性生殖系统的防御机制，哪一项最重要：A 阴道的自净作用 26.异常产褥病率的主要原因是：E 产褥感染

27.严重的产褥感染可形成“冰冻骨盆”的是：D 急性盆腔结缔组织炎

29.足月自然产后三天，出现下腹疼痛，体温正常，恶露多，有臭味，子宫底脐上一指，子宫体软，本例应考虑为：

A 子宫内膜炎

岁，孕 1 产 0，足月妊娠，胎膜早破，自然分娩后第三天，宫体平脐，宫体压痛，WBC ×10 /L,，最可能的诊断是：B 急性子宫内膜炎及子宫肌炎

岁，孕 1 产 0，孕 39 周，因胎膜早破临产 16 小时，相对性头盆不称，行剖宫产术，术中出血 40ml， D 宫底平脐有压痛，恶露血性混浊

40.产后 1—2 周寒战高热，下肢肿胀.疼痛，皮肤发白：B 产后下肢血栓性静脉炎

41.产后 3—4 天，体温 38℃，子宫体轻压痛，恶露量多且臭：A 子宫内膜炎，子宫肌炎 45.产妇因患肝炎病不能哺乳，退奶时禁用的方法是：A 大剂量雌激素 46．异位妊娠最常见的着床部位是：B.输卵管 4．关于输卵管妊娠，下列哪项正确？C. 子宫内膜的形态学变化与孕卵存活及绒毛的活力有关

7．输卵管妊娠和阑尾炎的主要鉴别点是： E. 停经、阴道少量流血伴休克

8．10．女，30 岁，因停经 42 天，少量阴道流血两天，行吸宫术，吸出物为“蜕膜组织”。首先应考虑何种疾病？E．输卵管妊娠 9．11．患者 30 岁，停经 46 天后，下腹部隐痛半月余，其后阴道持续少量出血 3 天多,：D．陈旧性宫外孕 12．女性，24 岁，10 天前因停经 41 天，今晨突然晕

倒在地，体温 37 5℃，血压 75/，脉搏 100 次/分，最准确的诊断是：C. 右输卵管妊娠破裂　1. 早期先兆流产最先出现的症状是 E. 少量阴道流血

2. 先兆流产与难免流产的主要鉴别要点是 D. 宫口开大与否

3. 3. 初产妇，25 岁，停经 50 天，阵发性腹痛伴阴道流血 3 天，妇查：宫颈口开大 1cm，。最可能的诊断是 C. 不可避免流产

4. 初产妇，30 岁，孕 0，平时月经规则，因停经 43 天阴道流血 3 天就诊，妇查：阴道少量血液，宫颈口关闭，子宫孕 40 天大小，妊娠试验阳性。对该病人的处理应首先 B. 镇静休息　5. 某妇，婚后 2 年，漏服避孕药三天后停经 50 天，妊娠试验阳性，阴道流血 1 周，略少于月经量，伴有腹痛。应选择哪项措施为最佳 D. 行吸宫术

13. 关于流产的临床表现，下述哪项是正确的___ A. 主要症状是阴道流血和腹痛 15. 关于过期流产，下列哪项错误 C. 术前用孕激素以提高子宫肌肉对催产素的敏感性

2. 前置胎盘阴道出血的特点是：A. 无痛性阴道流血

3. 确诊前置胎盘，下列何项首选超检查可见胎盘阴影覆盖子宫颈内口

4. 孕 2 产 1，因停经 7＋月，阴道流血 3 天，增多 2 小时，急诊入院，查血压 90/60mmHg，P112 次/分，型超声检

查

5.孕 35 周，少量阴道流血 1 天入院，不伴腹痛，查：宫底剑突下四横指，LSA,臂浮，胎心 150 次/分，骨，恰当处理是：B.期待疗法

6.妊娠 37 周患者，早晨醒来时发现躺在血泊中，急诊送入院,查:血压 90/60mmHg,脉搏 1xx 年,月经 5～6 天/28～30 天，妇查：宫颈光，宫体平，大小正常，B. 全身抗炎治疗

1.更年期妇女，妇查：子宫不大，阴道不规则流血，首先考虑 D.无排卵型功血 2.青春期功血的治疗原则是 D.止血、调整周期、促进排卵

6.疑为无排卵性功血，理想的取内膜活检的时间是 D.月经来潮前 1—2 日 7.下列哪项可诊断为子宫性闭经？C.雌激素试验阴性

8.用孕激素治疗闭经出现撤药性阴道流血，表示 D.子宫内膜已受雌激素影响

岁妇女，第一胎产后出血达 800ml，产后无乳汁分泌。现产后 11 个月尚未见月经来潮，自觉畏寒、周身无力，毛发脱落明显。本例属于哪类闭经？C.垂体性闭经 、 孕激素试验阳性说明：D、 卵巢无激素分泌 关于子宫内膜异位症的治疗，下列何项是错误的:C 性激素诊疗已成为临床上治

疗内膜异位症的主要非手术疗法，适用于肝功能正常的各类该病患者 12.诊断子宫内膜异位症的最佳方法是 D 腹腔镜检查

13.子宫内膜异位症痛经的特点：C 痛经发生在月经前，经期加重，经后缓解　14.葡萄胎最可靠的诊断依据是 E.阴道流血中可见成串的水泡样组织

15.某妇,27 岁,停经 3 个月,不规则阴道流血 10 天,近日有恶心,频吐,宫底高度平脐,位闻及胎心音,下列哪项检查最有助于诊断 E. B 型超声 16.妊娠滋养细胞肿瘤不包括下列何种疾病 A.葡萄胎

17.临床诊断良性卵巢肿瘤的处理，何项是错误的 B 年轻双侧肿瘤，可行双侧附件切除术 18.恶性卵巢肿瘤的处理原则，下述哪项错误 D 晚期患者估计手术不能完全切除者，可不行手术而改为化疗

19.妊娠合并卵巢肿瘤，以下何项是错误的____：D 妊中期发现卵巢肿瘤，不论良恶性均可等待胎儿足月行剖宫同时切除肿瘤

20.下列哪种肿瘤对放射治疗最敏感：D 无性细胞瘤

21.卵巢囊肿发生蒂扭转，其蒂的组成是：B 骨盆漏斗韧带、输卵管、卵巢固有韧带 22.下列各种疾病中哪项与雌激素无关：D 卵巢无性细胞瘤 23.子宫肌瘤的症状与下述哪项关系最密切 B 肌瘤的生长部位

24.肌壁间肌瘤的临床特点为 B 大的壁间肌瘤易致月经周期缩短，经量增多，经期延长 25.下列哪项不是子宫内膜癌的高危因素：D 早婚，增生性紊乱者 26.下列哪种疾病是慢性盆腔炎的表现:B 输卵管卵巢囊肿 27.下列哪项不是盆腔炎的相关病变 C 卵巢巧克力囊肿

28.女性生殖系统的防御机制，哪一项最重要 A 阴道的自净作用 29.霉菌性阴道炎的诱发因素，下列哪项不正确 D 月经来潮 30.霉菌性阴道炎的临床表现，哪项是错误的 C 阴道粘连.闭锁 31.正常女性阴道内正常寄生菌主要为 B 阴道杆菌

32.关于细菌性阴道病下列哪项不对 D 白带涂片发现线索细胞即可确诊 33.下述何项提示胎盘功能低下？ E. 孕 36 周，尿 E3 测定 8 mg/24h,1 周后测定为 4 mg/24h 34.病理性缩复环常见于 D 头盆不称

35.分娩时子宫破裂，下述哪项正确 E 胎儿先露部于内诊时不易触到

36.初产妇，孕 39＋周，估计胎儿体重 3800g，临产 16 小时，宫口开 1cm，以 5％葡萄糖.催产素 5u 静脉点滴， E 立即停滴催产素并作剖宫产术

37.关于产后出血的定义哪项是正确的 D 胎儿娩出后，24 小时内阴道流血＞500ml 38.产后出血最常见的原因是 D 子宫收缩乏力

39.与产后出血无关的有 E 早产 13. 初产妇，孕 40 周，产前无痛性阴道流血三次，自然分娩，胎盘娩出后阴道流血 500ml，E 子宫收缩乏力

40.关于子宫乏力性产后出血，首选的处理是：B 按摩子宫，并注射宫缩剂

41.初产妇，以产钳助产娩出一活婴，产后 4 小时伤口疼痛，里急后重，解大便一次，黄稀，镜检 WBC0～1 个/HP，少许粘液，其诊断哪一项可能性最大？ E 阴道壁血肿

42.胎儿娩出后，随即阴道大量出血，最佳的处理办法是： B 阴道检查有无软产道裂伤 43.关于产后出血的预防，下列哪项是正确的？E 产后 2 小时内在产房内观察宫缩及阴道流血情况

44.下列关于产后出血原因，哪项是错误的？B 完全性植入胎盘 45.下列疾病中哪种不易发生 DIC 而致产后出血 23. 宫缩乏力性出血的诊断要点，哪一项是错误的？E 子宫底轮廓清、质硬

46.胎盘滞留所致产后出血的处理，哪项不对？D 植入性胎盘，应行人工剥离胎盘术

47.关于产后出血的预防，下述哪一项是错误的 E 双胎孕妇，第一胎娩出后，立即肌注催产素

48.临床上，产妇第一位死因为：C 产后出血

49.初产妇，35 岁，孕 42 周，临产 10 小时，检查：胎心音×01xx 年 5 月 31 日。孕 4 月左右感胎动，持续活跃至今。一月前出现下肢水 肿，渐加重，近一周出现头痛胸闷而于 xx 年 3 月 25 日入院。入院查：BP170/100 mm Hg，P96 次/分，Rxx 年不孕就诊，月经 6－7 天/30 天，量不多，暗红色，经期后期有点滴暗红色血迹，痛经，以月经前三天显著，妇科检查：阴道通畅，宫颈轻糜，大小质地正常，无触痛，子宫后位，固定，正常大小，质中，后窟窿有触痛性结节.左附件区可扪及一 5cm×4cm 大小包块，囊性，压痛，活动欠佳，似与子宫相连。B 超：子宫后位，5cm×3cm×2cm 大小，左侧附件区可探及一×大小包块，内回声不均，囊壁较厚与子宫相邻。问：

1.此病患初步诊断考虑什么？列出你的依据。 2.进一步诊断可采用什么措施最好，为什么？

某×，23 岁，孕 1 产 0，因停经 3 月，腹痛 4 小时入院，患者 Lmp 99 年元月 4 日，EDC ，停经在当地医院，确诊为早孕，但未行妇查，早孕反应不明显，无其他不适，4 小时前患者突感腹痛，较剧.伴恶心.呕吐，急送来院。查体：T 38℃，P 110 次/分，R 25 次/分，BP 1xx 年前有剖宫产史，孕 39＋3 周，估计胎儿体重 3800g，临产 16 小时，宫口开 1cm，以 5%葡萄糖.催产素 5u 静脉点滴，2 小时后宫口开 2cm,人工破膜，4 小时后宫口开 9cm，但产妇烦躁不安，疼痛难忍，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/355141021140011102