

2024 年河北省卢龙县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题完整题库及答案【最新】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 具有中枢和周围抗多巴胺双重作用的是

- A: 多潘立酮
- B: 莫沙必利
- C: 甲氧氯普胺
- D: 西沙必利

答案：C

2. 指本次不良反应经采取相应的医疗措施后的结果；如不良反应已经好转，后患者又死于原患疾病或与此不良反应无关的并发症，此栏应填“好转”

- A: 用药原因
- B: 用药起止时间
- C: ADR / ADE 过程描述
- D: 不良反应 / 事件的结果

答案：D

3. 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的药物是

- A: 叶酸
- B: 苜丝肼
- C: 奥美拉唑
- D: 克拉维酸钾

答案：C

4. 试验样本数常见病不少于 2000 例的评价阶段是

- A: I 期临床试验
- B: IV 期临床试验
- C: III 期临床试验
- D: II 期临床试验

答案：B

5. 运动员禁用药物中， β 受体阻断剂产生的危害是

- A: 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡
- B: 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖
- C: 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患
- D: 易造成人体严重脱水、肾衰竭

答案：A

6. 患者，女，53 岁，既往有痛风史，长期坚持服药控制。近日因高血压就诊，该患者禁用的药物是

- A: 卡托普利
- B: 氢氯噻嗪
- C: 洛伐他汀
- D: 普萘洛尔

答案：B

7. 服用氨基糖苷类药时应该禁用的是

- A: 酒

B: 脂肪

C: 食醋

D: 食盐

答案：C

8. 临终关怀是对于预期寿命少于几个月的慢性病终末期患者的一项特殊疗护项目

A: 10

B: 5

C: 12

D: 6

答案：D

9. 根据时辰药理学，选择最适宜的给药时间，可增强药物疗效、避免不良反应、提高用药依从性避免导致肾上腺皮质功能下降的是

A: 清晨服利尿药

B: 清晨服抗抑郁药

C: 清晨服糖皮质激素

D: 清晨服氨基糖苷类

答案：C

10. 过敏性疾病患者可出现

A: 红细胞/血红蛋白减少

B: 中性粒细胞增多

C: 血小板增多

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：D

11. 第二代抗组胺药氯雷他定治疗过敏性鼻炎的用法、用量是

- A: 一次 4mg，每日 1 次
- B: 一次 2mg，每日 3 次
- C: 一次 4mg，每日 3 次
- D: 一次 10mg，每日 1 次

答案：D

12. 滴虫性阴道炎

- A: 聚甲酚磺醛
- B: 庆大霉素
- C: 咪康唑
- D: 甲硝唑

答案：D

13. （2016 年真题）美国食品药品监督管理局（FDA）根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。

- A: B 级
- B: A 级
- C: C 级
- D: D 级

答案：D

14. 中国药学会医院药学专业委员会推荐的国内药历格式不包括

- A: 正文
- B: 基本情况
- C: 用药记录
- D: 病历摘要

答案：A

15. 可能导致因心力衰竭和呼吸衰竭而死亡的是

- A: 精神刺激剂
- B: 蛋白同化制剂
- C: 肽激素类
- D: 易制毒药品

答案：D

16. 患者，男，65 岁，慢性咳嗽、喘息 10 余年，活动后症状明显，近 7 天症状加重入院，伴便秘，每周 2 次排便。既往有高血压病史 12 年；长期口服硝苯地平控释片 30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温 36.6℃，P82 次/分，R22 次/分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿啰音，杵状指。辅助检查：血常规 WBC $11.2 \times 10^9/L$ ，肺功能 FEV₁/FVC60%，FEV₁55%。治疗方案如下：氨溴索注射液 30mg tid iv gtt，莫西沙星氯化钠注射液 0.4g bid iv gtt，异丙托溴铵溶液 0.5mg bid 雾化吸入，布地奈德混悬液 1mg bid 雾化吸入

- A: 30ml，早餐时一次性服用
- B: 每次 10ml，每日 3 次，餐前给药
- C: 每次 10ml，每日 3 次，餐后给药
- D: 30ml，晚餐时一次性服用

答案：A

17. 轻度贫血，Hb 为（）

- A: 90~120g/L
- B: 小于 60g/L
- C: 60~90g/L
- D: 60~120g/L

答案：A

18. 以下所列处方书写的各项要求中，最正确的是

- A: 处方中不得使用药品缩写名称
- B: 每张处方不得合开中西药品
- C: 每张处方不得超过 5 种药品
- D: 每张处方不得超过 3 日用量

答案：C

19. 可用于有机磷农药重度中毒，缓慢静脉注射 1~1.2g, 30 分钟后如不显效，可重复给药，好转后逐渐停药的药物是

- A: 碘解磷定
- B: 乙酰胺
- C: 亚硝酸钠
- D: 维生素 K1

答案：A

20. 患者，女，55 岁，因反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸、胃灼热、间断积食来诊，食管测压提示食管下括约肌压力小于 6mmHg，结合胃镜检查 results，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑 20mgqd 强化抑酸治疗。

- A: 应整片吞服
- B: 适宜餐前 30 分钟服用
- C: 长期服用可能会出现维生素 K 缺乏
- D: 用药后可能出现头痛、便秘等不良反应

答案：C

21. 最方便、最安全、最经济的给药途径是

- A: 静脉注射
- B: 直肠给药
- C: 肌肉注射
- D: 口服给药

答案：D

22. 关于药物经济学研究方法，下列说法误的是

- A: 成本效果分析不能对医疗与非医疗项目进行比较
- B: 成本效用方法不能对不同疾病间进行比较
- C: 最小成本法不能对不同疾病间进行比较
- D: 成本效益方法能对医疗与非医疗项目进行比较

答案：B

23. (肾功能不全者的抗菌药物给药方案调整)肾功能中度损害时，抗菌药减低至正常剂量的

- A: $1/10 \sim 1/5$
- B: $3/5 \sim 3/4$
- C: $1/5 \sim 1/2$
- D: $1/7 \sim 1/5$

答案：C

24. 患者，女，24 岁，患有缺铁性贫血并伴有慢性腹泻，实验室检查：Hb55g/L，血清铁 $12 \mu\text{g/L}$ ，首选的治疗方案是()

- A: 口服铁剂及维生素 C
- B: 注射维生素 B
- C: 静脉滴注铁剂
- D: 雄性激素治疗

答案：C

25. 缺铁性贫血患者常表现为()

- A: 血红蛋白减少
- B: 红细胞增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：A

26. 慢性非特异性结肠炎患者服用美沙拉秦期间应定期监测

- A: 脾功能
- B: 呼吸功能
- C: 肾功能
- D: 肝功能

答案：C

27. 使用抗过敏药治疗荨麻疹的患者，拟进行变应原皮试的时间是在

- A: 停用抗过敏药之后
- B: 停用抗过敏药 36~48 小时后
- C: 停用抗过敏药 48~72 小时后
- D: 停用所用药物之后

答案：C

28. 可吸附砷、沉淀汞的是

- A: 药用炭混悬液
- B: 3%~5%鞣酸溶液
- C: 1%氯化钠溶液
- D: 鸡蛋白

答案：D

29. 他汀类与贝特类药物联合使用时，最容易出现毒性风险是

- A: 急性心肌梗死
- B: 横纹肌溶解
- C: 十二指肠溃疡
- D: 输尿管结石

答案：B

30. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

- A: 口服避孕药致阿米替林清除率下降
- B: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎
- C: 氯霉素在新生儿体内蓄积可导致灰婴综合征
- D: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等

答案：A

31. 是前药，其活性代谢产物是强效的选择性的甲型和乙型流感病毒神经氨酸酶抑制剂，通常用于甲型或乙型流感病毒治疗的是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 更昔洛韦
- C: 干扰素
- D: 奥司他韦

答案：D

32. 患者，男，64 岁，因“右足肿痛”就诊。查体：右足第一跖趾关节红肿、触痛明显。化验结果：血尿酸 $588.1 \mu\text{mol/L}$ 。诊断为“急性痛风性关节炎”。患者既往有高血压、高胆固醇血症、冠心病病史，目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释片 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

- A: 别嘌醇片
- B: 双氯芬酸钠片
- C: 贝诺酯片
- D: 阿司匹林片（300mg）

答案：B

33. 适用于阿司匹林哮喘伴过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

- A: 茶碱片
- B: 异丙托溴铵气雾剂
- C: 孟鲁司特钠咀嚼片
- D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：C

34. 患者，男，36 岁。临床诊断“大三阳”，其临床意义是

- A: HBsAg、HBeAb 和 HBcAb 同为阳性
- B: HBsAg、HBeAg 和 HBcAb 同为阳性
- C: HBsAg 阳性
- D: HBeAg 阳性

答案：B

35. 某患者，女，27 岁，多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁 3 个月。血 FT

- A: 碳酸锂

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

B: 丙硫氧嘧啶

C: 左旋咪唑

D: 碘化钾

答案：B

36. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

A: 非那雄胺

B: 青霉素

C: 维生素 C

D: 门冬胰岛素

答案：A

37. 冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如无用药禁忌证，欲服用阿司匹林进行治疗，最佳剂量范围是（）

A: 25~50mg / d

B: 25~75mg / d

C: 75~150mg / d

D: 150~300mg / d

答案：C

38. 能减弱华法林的抗凝作用的食物是

A: 韭菜

B: 芒果

C: 地瓜

D: 维生素 K

答案：A

39. (2017 年真题) 可分泌到乳汁中引起新生儿黄疸的药物是 ()

- A: 诺氟沙星
- B: 头孢克洛
- C: 复方磺胺甲噁唑
- D: 阿莫西林

答案: C

40. 患者，男，42 岁。患艾滋病，进行抗病毒治疗。以下药物不属于核苷酸类逆转录酶抑制剂的是

- A: 替诺福韦
- B: 拉米夫定
- C: 双脱氧胞苷
- D: 奈韦拉平

答案: D

41. 患者，男，55 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，医师建议首先改变生活方式（控制饮食等）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀 20mg/d 治疗。

- A: 40mg
- B: 60mg
- C: 80mg
- D: 20mg

答案: C

42. 过敏性皮炎常表现为 ()

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 中性粒细胞增多
- C: 红细胞增多

D: 血红蛋白减少

答案：A

43. 药物相互作用有发生在体内的药动学、药效学方面的作用；亦有发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

A: 用药时同服甲氧氯普胺

B: 抗酸药合用四环素类

C: 磺胺类药与青霉素合用

D: 阿司匹林合用格列美脲

答案：D

44. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

A: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，其药理效应增强

B: 慢乙酰化者服用异烟肼后，其半衰期延长至 2~4.5h

C: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

D: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病

答案：D

45. 长期服用苯妥英钠，可能导致

A: 血清碱性磷酸酶升高

B: γ -谷氨酰转移酶升高

C: 丙氨酸氨基转移酶升高

D: A / G 比值 < 1

答案：B

46. 主要降胆固醇的抗氧化剂是

- A: 他汀类
- B: 贝丁酸类
- C: 普罗布考
- D: 考来烯胺

答案: C

47. (2016 年真题) 与左旋多巴合用，可提高疗效的是 ()。

- A: 苄丝肼
- B: 克拉维酸钾
- C: 奥美拉唑
- D: 叶酸

答案: A

48. 治疗胃食管反流病，雷尼替丁的正确服药时间是

- A: 餐后、睡前
- B: 早餐前 30min
- C: 症状发作时、餐后 1.5h 和睡前
- D: 三餐前 30min

答案: A

49. 患者，男，28 岁，主诉：发作性四肢抽搐 2 年，加重 2 月，化验结果显示 TSH 增高，FT3，FT4 减低，临床诊断为甲状腺功能减退，欲使用左甲状腺素钠治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是

- A: 100 μ g，qd，早餐后半小时，顿服
- B: 100mg，qd，晚餐后顿服
- C: 100mg，qd，睡前顿服

D: 100 μ g, qd, 早餐前半小时, 顿服

答案: D

50. 缺铁性贫血患者应服用

A: 叶酸片

B: 硫酸亚铁片

C: 维生素 B12

D: 苯妥英钠注射液

答案: B

51. 脑梗死的分期, 恢复期

A: 15 天

B: 1~6 个月

C: 2~3 个月

D: 1 个月内

答案: B

52. 痛风缓解期, 在关节炎症控制 1~2 周后开始使用的药物

A: 呋塞米

B: 别嘌醇

C: 阿司匹林

D: 秋水仙碱

答案: B

53. 以下临床用药的事例中, 由于药物相互作用影响药物分布的是

A: 阿司匹林合用格列美脲

B: 磺胺类药与青霉素合用

C: 抗酸药合用四环素类

D: 同服甲氧氯普胺或丙胺太林

答案：A

54. 患儿，女，4 岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 鞣酸蛋白？

B: 洛哌丁胺？

C: 药用炭？

D: 小檗碱？

答案：B

55. 以下药物中，可以导致血钾升高的药物不包括（）

A: 阿米洛利

B: 螺内酯

C: 卡托普利

D: 呋达帕胺

答案：D

56. 下列情况的首选药物是高 TG 血症

A: 弹性酶

B: 贝特类

C: 胆酸螯合剂+贝特类

D: 他汀类

答案：B

57. 用于房颤时控制心室率的药物是

- A: 卡托普利
- B: 胺碘酮
- C: 维拉帕米
- D: 缬沙坦

答案：C

58. 以下不同人群中，白细胞或红细胞计数正常值参考范围的数值最高的是

- A: 成人女性
- B: 成人男性
- C: 新生儿
- D: 儿童

答案：C

59. 流感病毒感染使用抗菌药物

- A: 非适应证用药
- B: 过度治疗用药
- C: 盲目联合用药
- D: 超适应证用药

答案：A

60. 患者，男，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 莫西沙星对厌氧菌无效
- B: 莫西沙星属于氟喹诺酮类
- C: 莫西沙星对非典型病原体无效
- D: 莫西沙星可覆盖社区获得性肺炎的常见病原体

答案：C

61. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。
日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞 8.0×10

- A: 糖尿病
- B: 高脂血症
- C: 肝炎
- D: 感染性疾病

答案：A

62. 铁剂联用维生素 C

- A: 延缓或降低抗药性
- B: 促进机体的利用
- C: 协同作用
- D: 作用不同的靶点

答案：B

63. 对乙酰氨基酚的妊娠毒性分级是（）

- A: A 级
- B: C 级
- C: X 级
- D: B 级

答案：D

64. 贫血的临床表现与下列哪项有关

- A: 血红蛋白下降的速度
- B: 缺乏叶酸
- C: 铁元素缺乏
- D: 红细胞减少

答案：A

65. （2018 年真题）患者，男，69 岁，因高血压长期服用抗高血压药，近日患者出现足踝部水肿引起此不良反应的药物是（）

- A: 卡托普利
- B: 普萘洛尔
- C: 非洛地平
- D: 多沙唑嗪

答案：C

66. 患者，女，48 岁，因耐药菌引起的心内膜炎使用万古霉素治疗。

- A: 心功能抑制
- B: 红人综合征
- C: 凝血功能障碍
- D: 呼吸窘迫症状

答案：B

67. 患者男性，45 岁，反复发作夜间呼吸困难 1 个月，加重 1 天就诊。体格检查：血压 180 / 110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 氨茶碱
- B: 速尿
- C: 吗啡

D: 氨溴索

答案: C

68. 表现为疲劳、软弱、全身不适、颅内压增高、皮肤干燥瘙痒、四肢痛为哪种维生素滥用的危害

A: 维生素 B

B: 维生素 A

C: 维生素 C

D: 维生素 D

答案: B

69. 支原体肺炎首选 ()

A: 阿奇霉素

B: 青霉素

C: 多西环素

D: 甲氧西林

答案: C

70. 下列药物中，不属于兴奋剂的是

A: 钙通道阻断剂

B: 精神刺激剂

C: β 受体阻断剂

D: 利尿剂

答案: A

71. 妥布霉素可导致

A: 不可逆性肾小管坏死

B: 前列腺素合成障碍

C: 肾小球滤过率下降

D: 结晶沉积

答案：C

72. 患者用药咨询的内容是

A: 减肥、补钙、补充营养素

B: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品

C: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法

D: 抗菌药物的合理使用

答案：C

73. 患者，男，58 岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀 40mgqd。患者用药期间应定期监测的生化指标是

A: RBC

B: BUN

C: Hb

D: ALT

答案：D

74. 一般情况下，为治疗感冒连续服用抗感冒药的时间不应该超过

A: 7 日

B: 3 日

C: 5 日

D: 9 日

答案：A

75. 可能导致因心力衰竭和呼吸衰竭而死亡的兴奋剂是

A: 普萘洛尔

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 可卡因
- C: 人生长激素
- D: 麻黄碱

答案：D

76. 归属公共网络资源的是

- A: www.merck.com
- B: www.ashp.org
- C: [www.google](http://www.google.com)
- D: www.cmt.com.cn

答案：C

77. (2015 年真题) 患者，男，28 岁，2 天前因淋雨后出现发热，体温最高达 39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病。可首选的抗菌药物是 ()。

- A: 亚胺培南西司他丁
- B: 阿米卡星
- C: 头孢拉定
- D: 头孢哌酮舒巴坦

答案：C

78. (2017 年真题) 因可提高血液携氧量，被长跑运动员用于提高成绩，因而被列为兴奋剂管理的药物是 ()

- A: 甲睾酮
- B: 哌替啶
- C: 可卡因
- D: 人促红素

答案：D

79. (2019 年真题) 患者，女，80 岁，高血压病史 28 年，近日自觉感憋气，昨夜出现呼吸困难，不能平躺，喘憋，咳粉红色泡沫样痰，诊断为心力衰竭，应选用的药物是

- A: 氟桂利嗪
- B: 硝酸异山梨酯
- C: 呋塞米
- D: 胺碘酮

答案：C

80. 药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息}世界卫生组织的网址是

- A: org. cn
- B: www. cm
- C: org. cn
- D: www. cp

答案：D

81. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 应给予少量、多次、清淡饮食
- B: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止
- C: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星

D: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液

答案: C

82. 长期大剂量应用头孢哌酮治疗慢性感染，需要监测的临床指标是

A: 血压

B: 血糖

C: 凝血功能

D: 血脂

答案: C

83. 服用帕罗西汀等选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的患者，如果欲更换用单胺氧化酶抑制剂，必须先停用（）

A: 7 天

B: 5 天

C: 10 天

D: 14 天

答案: D

84. 布洛芬作为非处方药主要用于治疗

A: 抑郁

B: 感冒

C: 鼻炎

D: 发热

答案: D

85. 地西泮中毒的解救药物是()

A: 硫代硫酸钠

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 氟马西尼

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/356032211101011030>