@考试必备

备考专用资料

科学规划内容 – 系统复习

备考题库训练 – 题海战术

多重模拟测试 – 强化记忆

高频考点汇编 – 精准高效

历年真题演练 – 考前冲刺

注：下载资料前请认真核对、仔细预览，确认无误后再点击下载。

祝您逢考必过，成功上岸，一战成名

目　录

【模拟题】 1
【口诀】 1
知识点 1 • 支气管哮喘的用药 1
【模拟题】 1
【口诀】 2
知识点 2 • 心衰——心功能分级 2
【模拟题】 2
【口诀】 2
知识点 3 • 糖尿病患者用药时间 2
【模拟题】 3
【口诀】 3
知识点 4 • 甲亢术后护理 3
【模拟题】 4
【口诀】 4
知识点 5 • 不同性质脱水的临床特点 4
【模拟题】 6
【口诀】 6
知识点 6 • 烧伤面积及深度 6
【模拟题】 8
【口诀】 8
知识点 7 • 子宫韧带 8
【模拟题】 9
【口诀】 9
知识点 8 • 不同妊娠周数的子宫高度 9
【模拟题】 10
【口诀】 10
知识点 9 • 小儿预防接种 10
【模拟题】 11
【口诀】 11
知识点 10 • 小儿辅食添加 11
【模拟题】 11
【口诀】 12
知识点 11 • 常见的先心病 12
【模拟题】 13
【口诀】 14

知识点 12 • 尿液保存——常用防腐剂的作用及用法 14
【模拟题】 14
【口诀】 15
知识点 13 • 骨骼肌状态——肌力分级 15
【模拟题】 15
【口诀】 15
知识点 14 • 常见热型 16
【模拟题】 16
【口诀】 16
知识点 15 • 常用的漱口液及作用 16
【模拟题】 17
【口诀】 17
知识点 16 • 尿液异常 17
【模拟题】 18
【口诀】 18
知识点 17 • 常用的洗胃溶液及禁忌药物 18
【模拟题】 19
【口诀】 19
知识点 18 • 瞳孔的观察 19

【模拟题】

1. 社区护士在工作的社区进行支气管哮喘的健康讲座，介绍当前控制哮喘最有效的抗炎药物是：

A.茶碱类　　B.色甘酸钠

C.糖皮质激素　　D.抗胆碱类药物

1.【答案】C。解析：糖皮质激素是当前控制哮喘最有效的抗炎药物。常用口服制剂为泼尼松或甲泼尼龙，静脉用药主要有氢化可的松、地塞米松。

【口诀】

记忆口诀："激动控症，抗炎吃糖，解喘饮茶，预防色狼"。

知识点 1·支气管哮喘的用药

1.β肾上腺素受体激动剂（沙丁胺醇）：控制哮喘急性发作的首选药，吸入给药。

2.色甘酸钠：对预防运动和过敏原诱发的哮喘最有效，一般在4周内见效。

3.糖皮质激素：控制气道炎症。吸入给药为主，用后漱口，预防感染。

4.茶碱类（氨茶碱）：解痉平喘。

【模拟题】

2. 男性，65岁，冠心病患者，体力活动后明显受限，有心悸，气短，休息较长时间方可缓解，可诊断为：

A.心功能I级　　B.心功能II级

C.心功能III级　　D.心功能IV级

2.【答案】C。解析：心功能I级：日常活动量不受限制，一般活动不引起乏力、呼吸困难等心衰症状；心功能II级：体力活动轻度受限，休息时无自觉症状，但平时一般活动可出现上述症状，休息后很快缓解；心功能III级，体力活动明显受限，休息时无症状，低于平时一般活动量时即可引起上述症状，休息较长时间后症状方可缓解；心功能IV级：任何体力活动均会引起不适，休息时亦有心衰的症状，稍有体力活动后症状即加重。

【口诀】

记忆口诀："一无二轻三明显，四级不动也会喘"。

知识点 2·心衰——心功能分级

分级	临床表现
Ⅰ级	日常活动不受限制
Ⅱ级	体力活动轻度受限制，平时一般活动可引起气急、心悸，休息后很快缓解
Ⅲ级	体力活动明显受限制，低于平时一般工作量即引起气急、心悸，休息较长时间缓解
Ⅳ级	体力活动重度受限制，休息时亦气急、心悸。如无需静脉给药，可在室内或床边活动者为Ⅳa级，不能下床并需静脉给药支持者为Ⅳb级。

【模拟题】

3. 口服降糖药物需要同第一口饭嚼服的是：

A.达美康　　B.诺和龙

C.二甲双胍　　D.拜糖平

3.【答案】D。解析：拜糖平属于α-葡萄糖苷酶抑制剂，应与第一口饭同时服用。

【口诀】

记忆口诀：饭前排尿，饭中吃糖，饭后吃瓜。

知识点 3·糖尿病患者用药时间

分类	代表	适应证	用法	其他
双胍类	苯已双胍（降糖灵）、二甲双胍	超重的Ⅱ型糖尿病	餐中或餐后服用	单独应用不会导致低血糖
磺脲类	格列本脲（优降糖）、格列吡嗪	Ⅱ型糖尿病	早餐前半小时1次口服	易导致低血糖
α-葡萄糖	阿卡波糖（拜糖平）	餐后血糖高者	与第一口饭同时嚼服	易引起腹胀、腹痛、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/356105154133010111