北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科找答案》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：股骨闭合性骨折后，体温可能出现的情况（　）。A.上午正常，下午高热

B.通常不超过 38℃

C.时高时低不规则

D.常在 38.5℃以上

E.一般低于正常

2、单项选择题：新生儿期诊断先天性肌性斜颈最主要的依据是（　）。A.头偏向健侧、下颌转向患侧

B.面部不对称

C.颈椎畸形

D.两眼不在同一平面

E.胸锁乳突肌中下段包块

3、单项选择题：有关单纯骨软骨瘤的临床表现，下列哪项不符合（　）。A.多见于年轻人

B.多发于干骺端

C.生长年龄结束后肿瘤不停止生长

D.1%病人可以恶变

E.单发性骨软骨瘤比多发性恶变机会少

4、单项选择题：男性青年，外伤导致胫腓骨上 1/3 处开放性粉碎性骨折。行彻底清创，术中摘除游离骨块后伤肢行长期牵引及固定，但 6 个月骨折仍然不愈合，最大可能的原因是（　）。A.骨折处血液循环差

B.伤肢固定不确实

C.彻底清创时摘除过多碎骨块

D.功能锻炼不够

E.未及时行切开复位及内固定

5、单项选择题：指间关节增生性关节炎的典型体征（　）。A.梭形肿胀

B.腊肠样肿胀

C.Heberdon 结节

D.扣眼畸形

E.鹅颈畸形

6、单项选择题: 为了测定小儿麻痹症后遗症患者的臀中肌肌力，下列哪项试验是最正确的（　）。A.Caenslen 征

B.Thomas 征

C.Shoemaker 征

D.Trendelenburg 征

E.Dugas 征

7、单项选择题：桡骨茎突部狭窄性腱鞘炎松解术后患者仍诉持续性疼痛，并不断加重，伴有切口远侧感觉迟钝，原来的疼痛与现在感觉到的不同，叩诊瘢痕很痛，最可能的问题是（　）。A.桡神经感觉支神经瘤

B.拇长伸肌的一个副支仍未松解

C.顽固性腱鞘炎，需进一步固定解决

D.反射性交感神经营养障碍，或上肢营养障碍综合征

E.局部感染

8、单项选择题：骨折不愈合的因素中哪项是错误的（　）。A.年龄过小，过度肥胖

B.骨折部软组织损伤严重

I11、单项选择题：男性，24 岁，由 8 米高处坠下，臀部着地，伤后 12 小时入院。脐下三指以远感觉明显减退或消失，除右足跖趾关节稍能活动，其余双下肢自主运动消失，小便潴留。X 线片示 T10 椎体压缩，有骨折片突向椎管，下列哪项是早期关键性的治疗（　）。A.积极而强有力的抗生素治疗

B.导尿并留置导尿管

C.做好护理，勤翻身以防压疮

D.尽早手术，解除压迫

E.高低桌法复位后上石膏背心

12、单项选择题：手部外伤后，手指不能主动活动，可能（　）。A.有关手指的骨骼已骨折

B.有关手指的血供已中断

C.有关手指的神经已断裂

D.有关手指的肌腱已断裂

E.有关手指的关节已骨折脱位

13、单项选择题：有关化脓性关节炎与关节结核的鉴别，下列哪项无价值（　）。A.是否有高热等急性全身表现

B.局部是否有红肿、疼痛、皮温明显增高

C.血和关节液的白细胞总数和中性粒细胞增多的程度

D.浮髌试验阳性

E.关节液是否培养出革兰阳性球菌

14、单项选择题：膝关节后交叉韧带损伤，以下不正确的是（　）。A.后交叉韧带损伤在足球运动中比较少见

B.要提防膝关节脱位

C.保守治疗重点在加强股四头肌肌力

D.手术治疗是要重建后交叉韧带

E.以上都不是

15、单项选择题：女，23 岁，右手被机器碾伤，手掌部及五指多处挫裂伤，屈伸指肌腱、主要血管神经及掌骨、指骨均无损伤，经清创缝合后观察。关于此患者处理下列哪项不正确（　）。A.术后用敷料将手掌部及五指一起覆盖，用绷带环绕包扎

B.抬高患肢，以利静脉回流

C.术后 3 天，用激素及脱水剂，减少组织水肿

D.注射破伤风抗毒血清

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/356112202021010123