

2024 年河北省路南区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题大全带答案（培优）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 后记

- A: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量
- B: 医师签名、药品金额
- C: 主要实验室数据
- D: 临床诊断、费别

答案：B

2. 不宜与 5-羟色胺再摄取抑制剂合用的抗震颤麻痹药是

- A: 司来吉兰
- B: 复方左旋多巴
- C: 金刚烷胺
- D: 苯海索

答案：A

3. (治疗骨质疏松药的应用注意事项)，妊娠期使用过量可导致胎儿畸形、甲状旁腺功能抑制而使新生儿长期低血钙抽搐，应慎用的是

- A: 甲状旁腺激素
- B: 氟制剂
- C: 钙制剂
- D: 维生素

答案：D

4. 舒筋活络酒不宜联用的是

- A: 阿托品
- B: 氢氧化铝
- C: 苯巴比妥
- D: 可待因

答案：C

5. 卡马西平治疗三叉神经痛无效时，可改服

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 麦角胺咖啡因片
- C: 阿司匹林
- D: 苯妥英钠

答案：D

6. (用药与尿液检查异常)阿司匹林可能引起

- A: 尿血红蛋白
- B: 尿沉渣结晶
- C: 尿酮体
- D: 尿肌酐

答案：A

7. 肝脏具有十分重要和复杂的生理功能。首先是人体内各种物质代谢和加工的中枢，其次是有生物转化和解毒功能，所有进入人体的药物或毒物，都会在肝脏发生氧化、还原、水解、结合等化学反应，最后以原形药或代谢物的形式排出体外。

- A: 肝硬化
- B: 糖尿病

C: 急性胰腺炎

D: 缺铁性贫血

答案：A

8. 长期使用可降低血小板数量，可引起紫癜的药物是

A: 卡马西平

B: 阿苯达唑

C: 文拉法辛

D: 氟西汀

答案：B

9. 肾衰竭者

A: 不能导泻

B: 不能用强利尿剂

C: 不能催吐

D: 禁止洗胃

答案：B

10. 下列药物不良事件中，属于假、劣药品事件的是

A: “亮菌甲素事件”

B: “拜斯亭(西立伐他汀)事件”

C: “万络(罗非昔布)事件”

D: “康泰克 PPA 事件”

答案：A

11. 患者，男，71 岁。患良性前列腺增生症。下列药物中不能用于治疗该病的是

A: 5 α 还原酶抑制剂

B: 选择性 α_1 受体阻断剂

C: 雄激素

D: 抗胆碱药物

答案：C

12. 静滴、静注不良反应发生率较高

A: 药物的使用

B: 生活和饮食习惯

C: 药物制剂因素

D: 生理因素

答案：A

13. 尤以铅中毒疗效好的解毒剂是

A: 二巯丁二钠

B: 依地酸钙钠

C: 青霉胺

D: 二巯丙醇

答案：B

14. 可用于治疗口腔溃疡，大剂量服用后，尿液可能呈黄色的药物是

A: 维生素 A

B: 维生素

C: 复合维生素 B

D: 维生素 C

答案：C

15. 能有效抑制肠道内胆固醇的吸收，禁用于妊娠期和哺乳期的是（）

A: 普罗布考

B: 依折麦布

C: 烟酸类

D: 他汀类

答案：B

16. 患者，男，58 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

B: 停用二甲双胍肠溶片

C: 停用阿托伐他汀钙片

D: 停用瑞格列奈片

答案：B

17. 急性或轻型肝炎时，肝功能检查结果可能显示的是

A: AST/ALT 比值 <1

B: AST 下降

C: ALT 下降

D: AST/ALT 比值 >1

答案：A

18. 患者术后，给予肠外营养液 10%GS500ml、50%GS250ml、20%脂肪乳 250ml、8.5%复方氨基酸 750ml、水溶性维生素 10ml、脂溶性维生素 10ml、微量元素 10ml、10%氯化钠注射液 40ml、10%氯化钾注射液 30ml

A: 700kcal

B: 450kcal

C: 1150kcal

D: 200kcal

答案：B

19. 有关血清丙氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

- A: 丙氨酸氨基转移酶只存在于肝脏中
- B: 丙氨酸氨基转移酶是一组催化氨基酸之间氨基转移反应的酶类
- C: 血清丙氨酸氨基转移酶增高的程度与肝细胞被破坏的程度呈正比
- D: 丙氨酸氨基转移酶(ALT)与谷丙转氨酶(GPT)是两个反映肝脏功能的指标

答案：C

20. 以下治疗咳嗽的药物中，白天工作的驾驶员可选用止咳的非处方药是

- A: 氨溴索
- B: 苯丙哌林
- C: 羧甲司坦
- D: 可待因

答案：B

21. 调剂工作未执行双人核对制度，归属于

- A: 操作失误
- B: 管理缺失
- C: 患者经济拮据
- D: 产品缺陷

答案：B

22. 药品通用名容易混淆的抗病毒药是

- A: 阿糖腺苷

- B: 阿糖胞苷
- C: 氟胞嘧啶
- D: 氟尿嘧啶

答案：A

23. 可用于强心苷类中毒后快速型心律失常的药物是

- A: 异丙肾上腺素
- B: 阿托品
- C: 利多卡因
- D: 胺碘酮

答案：C

24. 敌百虫中毒

- A: 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃
- B: 静脉滴注烟酰胺
- C: 禁止使用肟类复能剂
- D: 静脉注射毒毛花苷 K 或毛花苷丙

答案：A

25. 患者，男性，72 岁，患有前列腺增生症，常出现尿频、排尿困难，排尿后尿不尽、残余尿增多现象。诊断为充盈性尿失禁，给予阿夫唑嗪治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

- A: 口干、便秘、尿潴留
- B: 鼻咽炎和尿路感染
- C: 直立性低血压
- D: 卧位和坐位时高血压

答案：C

26. 对合并糖尿病及肾病的高血压患者的降压目标是

- A: <160 / 90mmHg
- B: <140 / 85mmHg
- C: <130 / 80mmHg
- D: <150 / 90mmHg

答案：C

27. (2015 年真题) 患者，男，28 岁，2 天前因淋雨后出现发热，体温最高达 39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病。可首选的抗菌药物是 ()。

- A: 亚胺培南西司他丁
- B: 头孢哌酮舒巴坦
- C: 阿米卡星
- D: 头孢拉定

答案：D

28. 与诺氟沙星合用可提高对致病性细菌感染的疗效的是

- A: 酚酞
- B: 地芬诺酯
- C: 八面体蒙脱石
- D: 莫沙必利

答案：C

29. 服用氨基糖苷类药时应该禁用的是

- A: 食盐
- B: 脂肪
- C: 酒
- D: 食醋

答案：D

30. 伴有焦虑症的抑郁症患者宜选用

- A: 度洛西汀
- B: 帕罗西汀
- C: 阿米替林
- D: 文拉法辛

答案：B

31. 从饮食、运动上严格管理，最适合于

- A: 骨质疏松
- B: 糖尿病
- C: 焦虑障碍
- D: 高血压

答案：B

32. 患者，男性，45 岁，无痛性肉眼血尿 6 个月来诊，患者于 6 个月前无意中发现排尿全程尿色发深，呈酱油色，无腰痛，尿频，排尿困难，排尿后尿不尽，结合尿常规检查，诊断为良性前列腺增生。

- A: 奥昔布宁
- B: 非那雄胺
- C: 特拉唑嗪
- D: 坦索罗辛

答案：B

33. 患者入院诊断为肺部感染，病原学检查为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，使用万古霉素 1000mg/次，静脉滴注，每 12h1 次。为使血栓性静脉炎的发生风险最小化，临床需要将万古霉素溶液的浓度稀释为 4mg/ml。在配置时，需要 5%葡萄糖注射液的容量是（）

- A: 250ml
- B: 480ml
- C: 48ml
- D: 100ml

答案：A

34. 双侧肾动脉狭窄患者禁用的抗高血压药物为（）。

- A: 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂
- B: ACEI
- C: 利尿剂（噻嗪类）
- D: 利尿剂（袢利尿药）

答案：B

35. 钙制剂+维生素 D+双膦酸盐

- A: 妇女绝经后骨质疏松
- B: 原发性骨质疏松
- C: 老年性骨质疏松
- D: 抗癫痫药所致的骨质疏松

答案：C

36. 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 酚麻美敏口服液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚，应避免重复用药

B: 酚麻美敏口服液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药

C: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药

D: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药

答案：B

37. 三环类抗抑郁药中毒应

A: 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃

B: 禁止使用肱类复能剂

C: 静脉滴注烟酰胺

D: 静脉注射毒毛花苷 K 或毛花苷丙

答案：D

38. 采用锐器或指甲划过皮肤后，沿着划痕发生条状淡红色隆起，伴有瘙痒，常并发荨麻疹

A: 人工荨麻疹

B: 幼小荨麻疹

C: 冷性荨麻疹

D: 热性荨麻疹

答案：A

39. 抗类风湿关节炎药物中，服用 4~8 周后起效的是

A: 柳氮磺吡啶

B: 氯喹

C: 来氟米特

D: 青霉胺

答案：A

40. 紧急避孕药的服药时间须在性行为之后的

A: 24h 内

B: 72h 内

C: 12h 内

D: 48h 内

答案：B

41. 患者，男，70 岁，2 周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是（）

A: 肝素

B: 巴曲酶

C: 利伐沙班

D: 阿司匹林

答案：D

42. 属于核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂的是

A: 沙奎那韦

B: 奈韦拉平

C: 扎西他滨

D: 恩夫韦替

答案：C

43. (肾功能不全者的抗菌药物给药方案调整)肾功能中度损害时，抗菌药减低至正常剂量的

A: 3/5~3/4

B: $1/7 \sim 1/5$

C: $1/5 \sim 1/2$

D: $1/10 \sim 1/5$

答案：C

44. 阿糖胞苷属于

A: 抗真菌药

B: 抗过敏药

C: 抗肿瘤药

D: 抗病毒药

答案：C

45. 治疗药物选择的基本原则及方法叙述错误的是

A: 有效性是选择药物的首要标准

B: 经济性方面主要考虑药费，排除其他治疗成本

C: 用药安全是药物治疗的前提

D: 给药方便性可能影响患者对治疗的依从性

答案：B

46. KDIGO 推荐的 CKD 分期方法主要依据指标是

A: 肾小球滤过率 (GFR)

B: 尿微量白蛋白肌酐比值 (ACR)

C: 尿微量白蛋白排泄率 (AER)

D: 肌酐清除率 (CrCl)

答案：A

47. 患者,男,80 岁,因发热、咳嗽、咳痰 2 天就诊诊断为社区获得性肺炎,给予左氧氟沙星、甘草合剂、氨溴索、对乙酰氨基酚、维生素 C 等治疗。患者用药 3 天后出现失眠、烦躁不安等症状最可能引起该症状的药物是()

- A: 甘草合剂
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 左氧氟沙星
- D: 氨溴索

答案: C

48. (2016 年真题) 患者,女,24 岁,患有缺铁性贫血并伴有慢性腹泻,实验室检查: Hb55g/L, 血清铁 12 μ g/L, 首选的治疗方案是()

- A: 口服铁剂及维生素 C
- B: 静脉滴注铁剂
- C: 雄性激素治疗
- D: 注射维生素 B12

答案: B

49. 下列口腔溃疡治疗药物可降低毛细血管的通透性,减少炎症的渗出的是

- A: 冰硼散
- B: 维生素 C
- C: 甲硝唑含漱剂
- D: 地塞米松黏贴片

答案: D

50. 关于微生态制剂,下列说法不正确的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

A: 可制约致病菌的生长繁殖

B: 对促进营养物质的吸收没有帮助

C: 减少肠内毒素的生成

D: 维持肠道正常菌群的平衡

答案: B

51. 结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论属于 () 分级。

A: C 级

B: A 级

C: D 级

D: B 级

答案: D

52. 有机氟杀虫农药中毒的特效解毒剂是

A: 毒扁豆碱

B: 碘解磷定

C: 乙酰胺

D: 维生素 K1

答案: C

53. 餐前 1 小时及睡前服用的药物是 ()

A: 吉法酯

B: 雷贝拉唑

C: 枸橼酸铋钾

D: 瑞巴派特

答案: C

54. 静脉注射青霉素的适宜溶媒是

A: 复方氨基酸注射液

- B: 5%葡萄糖注射液
- C: 50%葡萄糖注射液
- D: 0.9%氯化钠注射液

答案：D

55. 适用于年轻、震颤突出的患者

- A: 司来吉兰
- B: 苯海索
- C: 左旋多巴
- D: 恩托卡朋

答案：B

56. 适用于 1-dopa 治疗伴疗效减退、症状波动患者的是

- A: 左旋多巴
- B: 司来吉兰
- C: 恩托卡朋
- D: 苯海索

答案：C

57. 患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

- A: 如大便次数规律（如每日 1 次），聚乙二醇 4000 散可按需使用
- B: 美托洛尔会影响阿司匹林的抗血小板活性，应停用
- C: 同时使用双氯芬酸钠与阿司匹林会增加消化道出血风险，两药不宜合用
- D: 阿托伐他汀钙用于冠心病的治疗，需长期规律用药

答案：B

58. 可迅速崩解和释放药物的制剂

- A: 透皮贴剂
- B: 滴丸剂
- C: 泡腾片剂
- D: 膜剂

答案: C

59. 以下咨询问题的分类属于适应证的是

- A: 这种药需要服用多久
- B: 这次拿的"×××"(商品名)是我以前一直服用的"格列齐特"吗
- C: 中午忘吃药了怎么办
- D: 这药能治我这种病吗

答案: D

60. 在药师应该具备的诸项专业技能中，作为药师的最基本工作的是

- A: 药品警戒技能
- B: 处方调剂
- C: 处方点评
- D: 处方审核

答案: B

61. 痛经伴有精神紧张者可口服

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 谷维素
- C: 布洛芬
- D: 阿司匹林

答案: B

62. 酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之对中枢神经出现抑制，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加发生不良反应的几率。

- A: 呋喃唑酮
- B: 依替米星
- C: 克林霉素
- D: 庆大霉素

答案：A

63. IV级临床研究的结论或II、III级临床研究的推论属于循证医学证据推荐强度的

- A: E 级
- B: C 级
- C: D 级
- D: B 级

答案：B

64. 处方中"餐后给药"的外文缩写是

- A: ac
- B: qn
- C: po
- D: pc

答案：D

65. 患者，女，8 岁，体重 22kg，因出现咳嗽、呼吸困难急诊就诊，症状在 2 天内逐步加重。出现这些症状前，先出现病毒性上呼吸道感染的症状（咽喉痛、流涕和咳嗽）3 天。在过去的 2 年，患者有过几次急性支气管炎发作，并在 3 个月前因肺炎住院。患者目前未接受任何药物治疗。查体：中度呼吸窘迫伴呼气喘鸣音，偶尔咳嗽，呼气相延长，胸部过度膨胀，胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙凹陷。听诊时可闻及双侧吸气和呼气喘鸣声，左侧呼吸音减弱。呼吸 30 次 / 分、血压 110 / 83mmHg、心率 130 次 / 分、体温 37.8℃，动脉血气分析血氧饱和度（SaO₂）90%。

- A: 口服泼尼松龙，0.5~1.0mg/kg，持续 5~7 日
- B: 口服福莫特罗
- C: 雾化大剂量布地奈德
- D: 雾化噻托溴铵

答案：B

66. 患者，男，28 岁，2 天前因淋雨后出现发热，体温最高达 39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病，可首选的抗菌药物是：

- A: 阿米卡星
- B: 头孢哌酮舒巴坦
- C: 头孢拉定
- D: 亚胺培南西司他丁

答案：C

67. 抗结核治疗中，主要针对细胞内有抗菌杀菌作用的是

- A: 吡嗪酰胺
- B: 乙胺丁醇
- C: 利福平

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

D: 异烟肼

答案：A

68. 制定疾病的防治指南、国家基本药物目录、非处方药目录、医疗保险目录等以及药品淘汰时都参考循证医学的研究结果表明

- A: 有利诊断特殊疾患
- B: 改变降脂治疗观念
- C: 列为行政决策的依据
- D: 有助个体化给药

答案：C

69. 向患者发放合理用药宣传材料是

- A: 质问方式
- B: 主动方式
- C: 指令方式
- D: 被动方式

答案：B

70. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用

- A: 2%过氧化氢溶液
- B: 2%酚甘油滴耳液
- C: 3%酚甘油滴耳液
- D: 3%过氧化氢溶液

答案：D

71. 下列白细胞计数中，成人静脉血的正常参考值为

- A: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- B: $(4.3 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- C: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- D: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9/L$

答案：C

72. 失神发作首选

A: 卡马西平

B: 拉莫三嗪

C: 丙戊酸钠

D: 苯妥英钠

答案：C

73. 患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

A: 3 次

B: 2 次

C: 1 次

D: 4 次

答案：D

74. 痛风缓解期，在关节炎症控制 1~2 周后开始使用的药物

A: 秋水仙碱

B: 阿司匹林

C: 呋塞米

D: 别嘌醇

答案：D

75. 治疗咳嗽应依据咳嗽的频率和程度选药，剧咳者宜首选的止咳非处方药是

- A: 吗啡
- B: 右美沙芬
- C: 苯丙哌林
- D: 可待因

答案：C

76. 有助于药师明确被问询问题的咨询服务方法步骤是

- A: 对文献进行评价、分析和整理
- B: 对问题进行确定并归类
- C: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- D: 确立有效的检索方法、查阅文献

答案：A

77. 服用异烟肼抗结核治疗时，应注意的事项是

- A: 用药期间不宜食用富含组胺类的食物
- B: 服药期间不宜饮茶
- C: 用药期间宜吃高蛋白食物
- D: 服药期间不宜饮酒

答案：A

78. （2018 年真题）患者，女，30 岁，因感冒所致发热（体温 38.5℃）并伴有头痛、全身酸痛到药店购药，药师应推荐的药品是（）

- A: 氯苯那敏片
- B: 酚麻美敏片
- C: 萘甲唑啉滴鼻液
- D: 对乙酰氨基酚片

答案：D

79. 处方外文缩写 OU 代表()

- A: 双眼
- B: 右耳
- C: 左眼
- D: 左耳

答案: A

80. 发热（发烧）指人体体温升高，超过正常范围，主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况，发热分为低热、中等度热、高热、超高热。中等度热是指体温范围

- A: 38.1℃～39.0℃
- B: 39.1℃～41.0℃
- C: 37.4℃～38.0℃
- D: 37.0℃～38.3℃

答案: A

81. 首选用于治疗慢性荨麻疹的药物是

- A: 西替利嗪片
- B: 氯苯那敏胶囊
- C: 异丙嗪片
- D: 醋酸氟轻松软膏

答案: A

82. 发热的程度按体温状况分级。"低热"者的体温是

- A: 38.1℃～39℃
- B: 41℃以上
- C: 37℃以上
- D: 37.4℃～38℃

答案：D

83. 患者男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 抗菌药物
- B: 糖皮质激素
- C: 布洛芬
- D: 阿司匹林

答案：B

84. 低盐饮食、避免情绪大波动，最适合于

- A: 糖尿病
- B: 高血压
- C: 焦虑障碍
- D: 骨质疏松

答案：B

85. 心衰治疗中能够快速控制体液潴留的药物是（）

- A: β 受体阻断剂
- B: 肾上腺素
- C: 阿托品
- D: 利尿剂

答案：D

86. 下列药学服务的重要人群中，特殊人群是指

- A: 需要重新选择药品或调整用药方案者
- B: 应用特殊剂型者

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 药物治疗窗窄、需要做监测者

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/356203130100011030>