

2024 年湖南省龙山县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试内部题库【名师系列】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

- A: 莫沙必利
- B: 复方阿嗪米特肠溶片
- C: 维生素 B1
- D: 胰酶片

答案：C

2. （2015 年真题）解救有机磷中毒过程中，如阿托品应用过量，应立刻给予（）。

- A: 毛果芸香碱
- B: 东莨菪碱
- C: 山莨菪碱
- D: 麻黄碱

答案：A

3. 百日咳的临床表现是

- A: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达 2~3 个月
- B: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛

C: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血

D: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰

答案：A

4. 静脉滴注时间应控制在 6h 以上的药物是

A: 培氟沙星

B: 万古霉素

C: 青霉素

D: 两性霉素 B

答案：D

5. 以下所列项目中，不属于评价二级文献的标准的是

A: 出版或更新的频率

B: 检索路径多少及费用

C: 提供的信息内容是否有参考文献的支持

D: 索引的完备程度

答案：C

6. 可用于评价肾功能的指标不包括

A: Cr

B: BUN

C: AST

D: 尿沉渣结晶

答案：C

7. 下列处方中常见的外文缩写，其含义是"每晚用药"的是

A: qs

B: qh

C: qn

D: qd

答案: C

8. 归属公共网络资源的是

A: www. googl

B: www. merck. com

C: www. ashp. org

D: www. cmt. com. cn

答案: A

9. 药物相互作用是双向的，既可能产生对患者有益的结果，使疗效协同或毒性降低；也可能产生对患者有害的结果，使疗效降低和毒性增强，有时会带来严重后果，甚至危及生命。

A: 敏感化作用

B: 非竞争性拮抗作用

C: 减少不良反应

D: 竞争性拮抗作用

答案: A

10. 患者，女，27岁，2年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血 T₃、T₄ 及 TSH 检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A: 海带

B: 紫菜

C: 虾皮

D: 不含碘的食用盐

答案: D

11. 茶碱属于

- A: CYP1A2 底物药物
- B: CYP3A4 诱导剂
- C: CYP3A4 抑制剂
- D: CYP2C19 底物药物

答案：A

12. 应贮存在凉暗处的药物是

- A: 硫酸亚铁片
- B: 头孢拉定
- C: 托烷司琼注射剂
- D: 重组人促红细胞生成素

答案：C

13. 从事药学服务的药师应具备较好的投诉应对能力，正确、妥善地应对投诉的重要意义是

- A: 警惕与防范用药错误
- B: 提高用药顺应性
- C: 增进患者对药师工作的信任
- D: 使患者获得有关的用药指导

答案：C

14. 下列抗感冒药中，归属于处方药的是

- A: 含伪麻黄碱的复方制剂
- B: 对乙酰氨基酚片
- C: 奥司他韦片
- D: 含金刚烷胺的复方制剂

答案：C

15. 可引起血肌酐增高的是

- A: 急性胰腺炎
- B: 严重肝病
- C: 胃溃疡
- D: 肾衰竭

答案：D

16. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

- A: 阿嗝米特肠溶片
- B: 乳酶生
- C: 多潘立酮片
- D: 奥美拉唑

答案：B

17. 患者，男，60 岁，因上臂出现湿疹到药店购药，药师应推荐的药品是()

- A: 氢化可的松软膏
- B: 利巴韦林软膏
- C: 特比萘芬乳膏
- D: 10%樟脑软膏

答案：A

18. 能增加感染和肿瘤风险的抗风湿药物是

- A: 肿瘤坏死因子(TNF- α)拮抗剂
- B: 青藤碱

C: 白芍总苷

D: 雷公藤多苷

答案: A

19. (2017 年真题) 半衰期小于 30min 且治疗指数低的药物通常选择 ()

A: 2~3 个半衰期给药 1 次

B: 静脉滴注给药

C: 每日给药 1 次

D: 每个半衰期给药 1 次

答案: B

20. 患者，女，65 岁，今日因天气骤变出现急性支气管炎症状，出现喘息困难，无其他基础疾病，可给予的治疗药物是

A: 马来酸氯苯那敏片 4~8mg tid

B: 喷托维林 25mg tid

C: 沙丁胺醇气雾剂 1~2 喷 q6h

D: N-乙酰半胱氨酸片 600mg bid

答案: C

21. 写明稀释比例和使用时间，是指

A: 医嘱清楚准确

B: 修订医嘱及时沟通

C: 医嘱完整不漏项

D: 实现个体化治疗

答案: C

22. 患者，女，33 岁，患有高铁血红蛋白血症，可选用的治疗药物是

- A: 青霉胺
- B: 纳洛酮
- C: 亚甲蓝
- D: N-乙酰半胱氨酸

答案：C

23. 卡托普利主要通过下列哪项而起抗慢性心功能不全的作用

- A: 扩张血管
- B: 拮抗钙
- C: 利尿降压
- D: 抑制血管紧张素转化酶

答案：D

24. 相互作用使不良反应减少的联合用药是

- A: 苄丝肼联用左旋多巴
- B: 阿托品联用氯磷定
- C: 普萘洛尔联用美西律
- D: 阿托品联用吗啡

答案：D

25. 老年（ ≥ 65 岁）帕金森患者，或伴认知障碍，首选

- A: 复方左旋多巴？
- B: 苯海索？
- C: 普拉克索？
- D: 金刚烷胺？

答案：A

26. 应用高剂量时可导致脑病的抗菌药物是

- A: 头孢唑林
- B: 青霉素
- C: 美罗培南
- D: 头孢哌酮

答案：A

27. 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 双氯芬酸钠
- B: 尼美舒利
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 美洛昔康

答案：C

28. 下尿路感染的最突出表现是（）

- A: 伴明显腰痛
- B: 膀胱刺激征
- C: 发热
- D: 肾区叩击痛

答案：B

29. 给药 1 次后可提供长达 1 年的药物是

- A: 甲地孕酮硅胶环
- B: 探亲避孕药
- C: 口服低剂量孕激素避孕药
- D: 长效复方口服避孕药

答案：A

30. 流感患者应用抗病毒药+抗生素属于

- A: 超剂量用药
- B: 超适应证用药
- C: 非适应证用药
- D: 过度治疗用药

答案: C

31. 患者男性，45 岁，反复发作夜间呼吸困难 1 个月，加重 1 天就诊。体格检查：血压 180 / 110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 吗啡
- B: 速尿
- C: 氨溴索
- D: 氨茶碱

答案: A

32. 属于非麻醉性强效镇咳药，起效迅速，抑制外周传入神经，也可部分抑制咳嗽中枢的药物的是

- A: 右美沙芬
- B: 苯丙哌林
- C: 羧甲司坦
- D: 可待因

答案: B

33. (2017 年真题) 处方中外文缩写 OS. 代表 ()

- A: 双眼
- B: 左眼

C: 左耳

D: 右耳

答案: B

34. 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病，引起药源性疾病的因素主要为

A: 基础疾病因素

B: 性别因素

C: 遗传因素

D: 年龄因素

答案: A

35. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 x 线示非特征性软组织肿胀。

A: 阿司匹林

B: 布洛芬

C: 尼美舒利

D: 对乙酰氨基酚

答案: D

36. 随着社会的发展，生活的节奏越来越快，科技给我们带来便利的同时，也给我们的生活和工作增添了不少压力，焦虑、抑郁、失眠等病症的发生率随之上升。

A: 地西泮

B: 艾司唑仑

C: 阿普唑仑

D: 唑吡坦

答案：D

37. 可提示隐性黄疸或亚临床性黄疸的是

- A: $STB 17.1 \mu\text{mol} / \text{L} \sim 171 \mu\text{mol} / \text{L}$
- B: $STB > 342 \mu\text{mol} / \text{L}$
- C: $STB 34.2 \mu\text{mol} / \text{L} \sim 171 \mu\text{mol} / \text{L}$
- D: $STB 17.1 \mu\text{mol} / \text{L} \sim 34.2 \mu\text{mol} / \text{L}$

答案：D

38. 就餐时随第一、二口食物给药的是

- A: 瑞格列奈
- B: 二甲双胍
- C: 胰岛素
- D: 阿卡波糖

答案：D

39. 肾功能不全患者宜选用的药物是

- A: 经肝肾双途径消除的药物
- B: 肾毒性小、经肝代谢的药物
- C: 经肝肠循环消除的药物
- D: 肝毒性小、经肾代谢的药物

答案：B

40. 避免与辛伐他汀合用的药物是（）

- A: 头孢哌酮
- B: 克拉霉素
- C: 万古霉素
- D: 美罗培南

答案：B

41. 6 个月～2 岁儿童的白细胞计数的正常范围值

A: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9/L$

B: $(10.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

C: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$

D: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

答案：A

42. 急性期

A: 1～6 个月

B: 1～3 个月

C: 1 个月内

D: 2 周

答案：C

43. 下列引起药源性疾病的事例中，其影响因素主要是"药物制剂因素"的是

A: 排钾利尿药增加心脏对强心苷的敏感性

B: 阿司匹林与华法林同服会增加出血风险

C: 以 50%乙醇、抗组胺药、抗抑郁药可增强催眠药的作用

D: 输液中颗粒物引起肺部异物肉芽肿

答案：D

44. 不宜咽或吞下所用药品；用药后不宜马上吃食或饮水的是

A: 舌下片

B: 咀嚼片

C: 含漱剂

D: 阴道栓剂

答案: C

45. 患者，女，35 岁，部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫病情控制不佳，提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊。患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

A: 阿卡波糖

B: 左乙拉西坦

C: 丙戊酸钠

D: 卡马西平

答案: D

46. 可有效治疗功能性消化不良的药物是

A: 泮托拉唑

B: 氯苯那敏

C: 赛庚啶

D: 氯雷他定

答案: A

47. 不宜采用放射性 ^{131}I 治疗的甲亢患者是

A: 老年甲亢患者

B: 成人 Graves 甲亢伴甲状腺 II 度以上肿大患者

C: 妊娠期、哺乳期女性甲亢患者

D: 甲亢合并白细胞和（或）血小板减少或全血细胞减少患者

答案: C

48. 在血液透析患者中每次给予元素铁

A: 100mg/次

B: 60mgqd

C: 60mgbid

D: 60mg tid

答案: A

49. 可引起尿胆红素阳性的是

A: 病毒性肝炎

B: 肾小球肾炎

C: 再生障碍性贫血

D: 肺结核

答案: A

50. 西咪替丁可引起的典型不良反应是

A: 高钾血症

B: 低镁血症

C: 定向力障碍、意识混乱

D: 血糖升高

答案: C

51. 防心绞痛药物

A: 去氨加压素

B: 甘草合剂

C: 胃黏膜保护剂

D: 硝酸甘油

答案: D

52. 可以与多种金属离子结合发生沉淀，影响药物吸收的是

- A: 酒中的乙醇
- B: 茶叶中的鞣酸
- C: 食醋中的醋酸
- D: 食盐中的氯化钠

答案: B

53. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检:端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，HR108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 支气管哮喘?
- B: 急性左心衰竭?
- C: 肺动脉栓塞?
- D: 肺结核?

答案: B

54. 患者,女 67 岁出现认知功能障碍 5 年,诊断为阿尔茨海默病,予以美金刚治疗。下列药物中,可增加美金刚血药浓度的是 ()

- A: CYP2D6 抑制剂
- B: 氯化铵
- C: 碳酸氢钠
- D: CYP3A4 制剂

答案: C

55. 痛风缓解期宜选用的治疗药物是 ()

- A: 泼尼松
- B: 阿司匹林

C: 苯溴马隆

D: 秋水仙碱

答案: C

56. 对多数药品而言，贮藏环境与药品保管的关系是

A: 在 10℃ 以上时，温度越低，对保管越有利

B: 在 0℃ 以下时，温度越低，对保管越有利

C: 在 2℃ 以上时，温度越低，对保管越有利

D: 在 8℃ 以上时，温度越低，对保管越有利

答案: C

57. 对于 ACEI 类药描述错误的是

A: 抑制血管紧张素转化酶 (ACE) 活性

B: 唯一的抑制心肌及血管重构药物

C: 明显降低全身血管阻力

D: 抑制交感神经活性作用

答案: D

58. 用后不宜马上进食的剂型是 ()

A: 直肠栓剂

B: 含漱剂

C: 软膏剂

D: 滴眼剂

答案: B

59. 可能诱发心血管脑病、引起肝癌、肾癌的是

A: 易制毒药品

B: 肽激素类

C: 蛋白同化制剂

D: 精神刺激剂

答案: C

60. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。目前体检：身高 160cm，体重 70kg。实验室检查：白细胞 $8.0 \times 10^9 / L$ ，红细胞 $4.0 \times 10^{12} / L$ ，总胆红素 $11 \mu mol / L$ ，总胆固醇 $6.0 mmol / L$ ，空腹血糖 $7.6 mmol / L$ 。

A: 低血糖

B: 肌痛

C: 乳酸性酸中毒

D: 心力衰竭

答案: C

61. 抗血小板药

A: 利伐沙班

B: 华法林

C: 肝素

D: 氯吡格雷

答案: D

62. 患者女 57 岁 BM312 诊断为 2 型糖尿病经生活方式干预，未能有效控制血糖，肝肾功能未见异常，初始治疗首选的药物是（）

A: 二甲双胍

B: 格列齐特

C: 阿卡波糖

D: 吡格列酮

答案: A

63. 多潘立酮药物不良反应

- A: 性功能障碍
- B: 黑便
- C: 睡眠障碍
- D: 男性乳房女性化

答案: D

64. (2015 年真题) 患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断口服沙丁胺醇 4mg tid 治疗。没有规律用药治疗。近日，因秋冬季节交替，出现明显喘憋，话不成句，被紧急送往医院。

- A: 沙丁胺醇片
- B: 沙丁胺醇气雾剂
- C: 福莫特罗吸入剂
- D: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂

答案: D

65. 属于一级文献的是

- A: 《国际药学文摘》
- B: 《中文科技资料目录：中草药》
- C: 《中国药学文摘》
- D: 《中国新药》

答案: D

66. 高血压合并心力衰竭不宜用下哪种药物

- A: 卡托普利
- B: 哌唑嗪
- C: 普萘洛尔

D: 氢氯噻嗪

答案: C

67. 头孢菌素注射剂作为皮肤过敏试验的浓度是

A: 250 $\mu\text{g/ml}$

B: 750 $\mu\text{g/ml}$

C: 100 $\mu\text{g/ml}$

D: 500 $\mu\text{g/ml}$

答案: D

68. 易经乳汁分泌药物的特性是

A: 分子量大

B: 蛋白结合率高

C: 弱酸性

D: 脂溶性高

答案: D

69. 关于患者用药注意事项的说法错误的是()

A: 应定期监测血压、心率

B: 在患者症状好转后,应立即停用比索洛尔

C: 应注意观察是否有黑便

D: 应定期监测地高辛血药浓度

答案: B

70. (2017 年真题) 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法, 错误的是 ()

A: 当单药治疗无效时可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药

B: 剂量递增尽可能采用最小有效剂量使不良反应减至最小

C: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判疗效

D: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗

答案：C

71. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

A: 华法林片

B: 双嘧达膜片

C: 对乙酰氨基酚片

D: 氯吡格雷片

答案：D

72. 肿瘤患者在化疗后出现焦虑，可对症给予

A: 劳拉西泮

B: 醋酸甲地孕酮—地塞米松

C: 苯海拉明—利多卡因—氢氧化镁铝

D: 吗啡

答案：A

73. 下列药物中，可逆性、选择性单胺氧化酶 A 抑制剂

A: 阿米替林

B: 氟伏沙明

C: 氯米帕明

D: 吗氯贝胺

答案：D

74. 服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

- A: 浓茶
- B: 咖啡
- C: 烟
- D: 酒

答案：D

75. 以下所列腹泻类别中，最适宜应用酶制剂的是()。

- A: 激惹性腹泻
- B: 肠道菌群失调所致的腹泻
- C: 消化性腹泻
- D: 病毒性腹泻

答案：C

76. 肾衰竭者不能

- A: 实施血液净化
- B: 强利尿
- C: 洗胃
- D: 催吐

答案：B

77. 因绝经期激素替代治疗应禁用的人群是

- A: 甲状腺切除后的患者
- B: 6 个月内有静脉血栓栓塞史的患者
- C: 合并高胆固醇血症的患者
- D: 合并轻度高血压的患者

答案：B

78. 营养性巨幼细胞性贫血主要因为缺乏

A: 叶酸和(或)维生素 B

B: 白细胞

C: 维生素 C

D: 鞣酸

答案：A

79. 通过增加房水经葡萄巩膜外流和减少房水生成降低眼压的 α_2 受体激动剂是

A: 溴莫尼定

B: 拉坦前列素

C: 噻吗洛尔

D: 毛果芸香碱

答案：A

80. (在乳汁中排泄的药物)地西泮可分布在乳汁中的机制是地西泮

A: 脂溶性高

B: 在脂肪与水中都有一定的溶解度

C: 呈弱碱性

D: 呈弱酸性

答案：A

81. 部分药品的中文药名容易混淆，药师在审核处方时应格外小心，防止处方出现用药错误。下列处方中符合适应证的是

A: 为社区获得性肺炎患者开具柔红霉素

B: 为疱疹病毒患者开具阿糖胞苷

C: 为闭塞性脑血管病、中心性视网膜炎患者开具曲克芦丁

D: 为肿瘤患者开具氟胞嘧啶

答案：C

82. 欧洲药物管理局 (EMA) 提议“限制临床使用多潘立酮”的主要原因是

- A: 可能引起心脏相关风险
- B: 消化不良患者常擅自服用
- C: 易发生严重的口腔溃疡
- D: 可能引起腹胀、胃灼热

答案：A

83. 新生儿白细胞计数的正常范围值

- A: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- B: $(10.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- C: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9/L$
- D: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

答案：D

84. 下列药物属于改善眼部调节功能的是

- A: 七叶洋地黄双苷滴眼液
- B: 山莨菪碱滴眼药
- C: 玻璃酸钠滴眼液
- D: 羟甲基纤维素钠滴眼液

答案：A

85. 患儿，男，5 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有“乒乓球”感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

- A: 坏血病
- B: 佝偻病

C: 脑瘫

D: 智障

答案: B

86. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g / L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 $300 \mu g / L$ 。

A: 输血

B: 右旋糖酐铁肌注

C: 维生素 B12 肌肉注射

D: 硫酸亚铁口服

答案: D

87. 以餐后血糖升高为主，伴餐前血糖轻度升高，应该首选的降糖药是

A: 罗格列酮

B: 二甲双胍

C: 阿卡波糖

D: 格列本脲

答案: A

88. 不作为根除幽门螺杆菌初次治疗方案的抗菌药是

A: 左氧氟沙星

B: 呋喃唑酮

C: 四环素

D: 阿莫西林

答案: A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/357012161142010024>