

2023-24 年河南省禹王台区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题王牌题库及参考答案（研优卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2019 年真题）患者，男，8 岁，静脉滴注美洛西林后立即出现胸闷、气短、呼吸困难，喉头水肿，考虑为青霉素类抗生素的过敏反应，按照其发生机制，该患者发生的过敏反应，在分型上属于（）

- A: IV 型变态反应
- B: I 型变态反应
- C: II 型变态反应
- D: III 型变态反应

答案：B

2. （2021 年真题）属于维生素 K 拮抗剂的抗凝血药物是（）

- A: 利伐沙班
- B: 依诺肝素
- C: 氯吡格雷
- D: 华法林

答案：D

3. 属于超短效胰岛素/胰岛素类似物的是

- A: 门冬胰岛素
- B: 甘精胰岛素
- C: 普通胰岛素
- D: 精蛋白锌胰岛素

答案：A

4. 可引起致死性肺毒性的抗心律失常药是()

A: 普萘洛尔

B: 奎尼丁

C: 胺碘酮

D: 利多卡因

答案：C

5. 仅对浅表真菌感染有效的药物()

A: 伊曲康唑

B: 灰黄霉素

C: 两性霉素 B

D: 氟康唑

答案：B

6. 氨苯蝶啶的作用部位在

A: 髓袢升支粗段皮质部

B: 近曲小管

C: 远曲小管和集合管

D: 髓袢升支粗段

答案：C

7. 属于血小板膜蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是

A: 奥扎格雷

B: 替罗非班

C: 阿司匹林

D: 氯吡格雷

答案：B

8. 急性缺血性脑卒中发作，应用溶栓药治疗时间窗是在发病后

- A: 3 小时内
- B: 8 小时内
- C: 12 小时内
- D: 24 小时内

答案：A

9. 维生素 A 缺乏时可患

- A: 糙皮病
- B: 夜盲症
- C: 成人佝偻病
- D: 脚气病

答案：B

10. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38. 8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82. 1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0. 59，每 6 小时一次。

- A: 克柔念珠菌
- B: 热带念珠菌
- C: 白色念珠菌
- D: 新型隐球菌

答案：A

11. (2015 年真题) 在痛风发作的急性期，应当首选的抗痛风药是 ()

。

- A: 别嘌醇
- B: 苯溴马隆
- C: 秋水仙碱
- D: 二氟尼柳

答案: C

12. 不属于口服避孕药所致不良反应的是 ()。

- A: 月经失调
- B: 突破性出血
- C: 低钙血症
- D: 增加血栓栓塞性疾病风险

答案: C

13. 维 A 酸类药物不能用于下述哪种疾病 ()

- A: 角化性皮肤病
- B: 银屑病
- C: 扁平疣
- D: 光敏性皮肤病

答案: D

14. 属于芳基乙酸类的是

- A: 阿司匹林
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 吲哚美辛
- D: 塞来昔布

答案：C

15. 主要作用于有丝分裂 M 期，干扰微管蛋白合成的药物是

- A: 氟尿嘧啶
- B: 多柔比星
- C: 高三尖杉酯碱
- D: 顺铂

答案：C

16. 下列属于短效糖皮质激素的是

- A: 氢化可的松
- B: 甲泼尼龙
- C: 泼尼松
- D: 泼尼松龙

答案：A

17. 典型不良反应为恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性的是

- A: 顺铂
- B: 奥沙利铂
- C: 亚叶酸钙
- D: 卡铂

答案：A

18. 属于非磺酰脲类胰岛素促泌剂的是

- A: 艾塞那肽
- B: 罗格列酮
- C: 阿卡波糖
- D: 瑞格列奈

答案：D

19. 普通儿童感冒患者，体温升高($>38.5^{\circ}\text{C}$)，宜选用的药物是()

- A: 右美沙芬片
- B: 对乙酰氨基酚滴剂
- C: 茶碱缓释片
- D: 氯苯那敏片

答案：B

20. 是 β -内酰胺酶抑制剂，常与青霉素组成复方制剂的是()

- A: 克拉维酸
- B: 他唑巴坦
- C: 氨曲南
- D: 美罗培南

答案：A

21. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是()。

- A: 艾塞那肽
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 那格列奈

答案：C

22. 小剂量孕激素用于

- A: 痛经
- B: 绝经期综合征
- C: 回奶
- D: 再生障碍性贫血

答案：A

23. (2020 年真题) 在体内主要经 CYP3A4 代谢的质子泵抑制剂是

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 铝碳酸镁
- C: 米索前列醇
- D: 兰索拉唑

答案：D

24. 西咪替丁治疗消化性溃疡病的机制是()

- A: 抑制胃壁细胞的 H
- B: 抗幽门螺杆菌
- C: 阻断 CTZ 的 D
- D: 阻断 H

答案：D

25. 下列主要用于防治遗传性血管神经水肿的药物是

- A: 黄体酮
- B: 环孢素
- C: 米非司酮
- D: 司坦唑醇

答案：D

26. () 与利福平合用时，在用利福平前和疗程中不需调整剂量

- A: 地高辛
- B: 氯霉素
- C: 氨茶碱
- D: 糖皮质激素

答案：A

27. 不易透过血-脑屏障，药理作用单一，主要用于治疗膀胱过度活动症的非选择性 M 受体阻断药是

- A: 托特罗定
- B: 奥昔布宁
- C: 索利那新
- D: 黄酮哌酯

答案：A

28. （2017 年真题）奥司他韦治疗流行性感冒，首次用药的时间是（）

- A: 出现流感症状后 36 小时内
- B: 出现流感症状后 72 小时内
- C: 出现流感症状后 96 小时内
- D: 出现流感症状后 100 小时内

答案：A

29. 轻症糖尿病患者宜选用

- A: 格列喹酮
- B: 珠蛋白锌胰岛素
- C: 正规胰岛素
- D: 二甲双胍

答案：D

30. 婴儿尿布皮炎外用激素制剂应限于

- A: 3~5 天
- B: 5~7 天
- C: 3 天

D: 2 周

答案：B

31. 患者，女，55 岁，2 型糖尿病史 5 年；心律失常病史 2 年长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法，错误的是

A: 可致甲状腺功能减退较为常见发病隐匿

B: 可掩盖低血糖症状（如心悸、手抖），但低血糖的其他症状（如出汗）仍然存在

C: 可致甲状腺功能亢进，同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常

D: 可致肺毒性，早期一般表现为咳嗽，但病情发展时可出现发热和呼吸困难，表现为急性肺炎

答案：B

32. 原发性肾病综合征患者，在院治疗时给予“注射用甲泼尼龙 40mgqd”静脉滴注，出院前调整为等效剂量的口服药物序贯治疗，适宜的方案是

A: 泼尼松片 30mgq

B: 泼尼松片 50mgqD

C: 地塞米松片 10mgqD

D: 泼尼松片 20mgqD

答案：B

33. 氢氯噻嗪的利尿作用机制是

A: 抑制髓袢升支粗段的 Na

B: 对抗醛固酮的 K

C: 抑制远曲小管近端的 Na

D: 抑制肾小管碳酸酐酶

答案：C

34. 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药是

- A: 美托洛尔
- B: 索他洛尔
- C: 硝酸甘油
- D: 利多卡因

答案：D

35. 容易引起周围神经炎的抗结核药物是

- A: 利福平
- B: 异烟肼
- C: 乙胺丁醇
- D: 链霉素

答案：B

36. （2020 年真题）通过抑制 5-HT 和去甲肾上腺素（NA）再摄取，增加突触间隙 5-HT 和 NA 浓度从而增强中枢 5-HT 和 NA 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 舍曲林
- B: 度洛西汀
- C: 吗氯贝胺
- D: 阿米替林

答案：B

37. 呋喃妥因主要用于

- A: 全身感染
- B: 尿路感染

C: 消化道感染

D: 呼吸道感染

答案：B

38. 可用于治疗甲癣、足癣、体癣和股癣等浅表性真菌感染的药品是()

。

A: 特比萘芬

B: 氟胞嘧啶

C: 伏立康唑

D: 两性霉素 B

答案：A

39. 口服吸收少，用于肠道感染的是

A: 氧氟沙星

B: 磺胺嘧啶

C: 甲氧苄啶

D: 呋喃唑酮

答案：D

40. (2021 年真题) 用于治疗湿性视网膜黄斑变性的药物是 ()

A: 硫酸阿托品眼用凝胶

B: 雷珠单抗注射液

C: 聚乙二醇滴眼液

D: 毛果芸香碱滴眼液

答案：B

41. 用药时需关注肺毒性的药物是

A: 长春新碱

B: 柔红霉素

C: 紫杉醇

D: 博来霉素

答案：D

42. 铂类化合物治疗期间，需要每周检查的项目是

A: 肝功能

B: 全血计数

C: 肾功能

D: 血钙

答案：B

43. 白女士，74 岁，以“间断性腹胀 1 月余”主诉入院。患者 1 个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史 14 年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：

A: 碱中毒

B: 高血钠

C: 高血镁

D: 高血钾

答案：D

44. 患者，男性，46 岁，经常头痛，头晕近 8 年。2 天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压 230 / 120mmHg。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为 202 / 120mmHg，且气急不能平卧，心率 108 次 / 分，早搏 3 次 / 分。两肺底有湿啰音。

A: 硫氰酸盐不超过 50 $\mu\text{g} / \text{ml}$ ，氰化物不超过 2 $\mu\text{mol} / \text{ml}$

B: 硫氰酸盐不超过 200 $\mu\text{g} / \text{ml}$ ，氰化物不超过 4 $\mu\text{mol} / \text{ml}$

C: 硫氰酸盐不超过 20 $\mu\text{g} / \text{ml}$ ，氰化物不超过 1 $\mu\text{mol} / \text{ml}$

D: 硫氰酸盐不超过 $100\ \mu\text{g}/\text{ml}$ ，氰化物不超过 $3\ \mu\text{mol}/\text{ml}$

答案：D

45. 首次用药可出现"首剂现象"的药物是()

A: 硝酸甘油

B: 依那普利

C: 氨氯地平

D: 哌唑嗪

答案：D

46. 氟他胺适用于治疗()。

A: 绒毛膜上皮癌

B: 晚期前列腺癌

C: 急性淋巴细胞白血病

D: 晚期睾丸肿瘤

答案：B

47. 不易发生“双硫仑样”反应的药物是()

A: 头孢哌酮

B: 头孢曲松

C: 头孢他啶

D: 头孢替安

答案：C

48. 属于第四代头孢菌素常用药物的是()。

A: 头孢吡肟

B: 头孢克洛

C: 头孢克肟

D: 头孢拉定

答案：A

49. 不宜与三环类抗抑郁药合用的药物是

A: 羟甲唑啉滴鼻液

B: 酚甘油滴耳液

C: 赛洛唑啉滴鼻液

D: 麻黄碱滴鼻液

答案：D

50. 服用抗帕金森病药恩他卡朋的患者，其尿液可变成

A: 蓝绿色

B: 淡绿色

C: 红棕色

D: 深蓝色

答案：C

51. 抗酸作用较弱而慢，但持久，对溃疡面有保护作用

A: 三硅酸镁

B: 碳酸钙

C: 氢氧化镁

D: 氢氧化铝

答案：A

52. 维生素 B

A: 成人佝偻病

B: 坏血病

C: 角膜软化症

D: 脚气病

答案: D

53. 预防急性肾衰竭可选用

A: 乙酰唑胺

B: 呋塞米

C: 氢氯噻嗪

D: 螺内酯

答案: B

54. 与核糖体 30S 亚基结合，阻止氨基酰 tR-NA 进入 A 位的抗菌药是

A: 万古霉素

B: 四环素

C: 青霉素

D: 氯霉素

答案: B

55. 主要抑制排卵的短效口服避孕药

A: 复方炔诺酮片

B: 雌二醇

C: 炔诺酮

D: 雌三醇

答案: A

56. 毛果芸香碱对眼的作用是

A: 缩瞳、降眼压，调节痉挛

B: 扩瞳、升眼压，调节麻痹

C: 扩瞳、降眼压，调节痉挛

D: 缩瞳、升眼压，调节痉挛

答案：A

57. 使用抗眼部细菌感染药利福平滴眼剂后，常见的不良反应是()

A: 全身过敏反应

B: 牙龈出血和感染

C: 头痛、偏头痛

D: 青光眼

答案：B

58. 四环素联用抗凝药需要

A: 肝毒性增加

B: 调整抗凝血药的剂量

C: 增加麦角中毒的风险

D: 口服吸收减少

答案：B

59. 下列关于托吡卡胺的描述错误的是

A: 可诱发闭角型青光眼

B: 哺乳期慎用

C: 滴眼后不应压迫泪囊

D: 可给予拟胆碱类药物解毒

答案：C

60. 以下药物的镇咳作用从弱到强排列正确的是

A: 苯丙哌林、可待因、吗啡

B: 喷托维林、右美沙芬、苯丙哌林

C: 可待因、吗啡、右美沙芬

D: 喷托维林、苯丙哌林、可待因

答案: B

61. (2021 年真题) 对角鲨烯环氧酶有非竞争性和可逆性抑制作用，属于丙烯胺类的抗真菌药物 ()

A: 环吡酮胺

B: 特比萘芬

C: 克霉唑

D: 米卡芬净

答案: B

62. 喷托维林与水合氯醛合用会出现

A: 反射亢进，异常发热、昏睡

B: 精神症状

C: 支气管平滑肌痉挛

D: 中枢神经系统和呼吸系统抑制作用增强

答案: D

63. 低精蛋白锌胰岛素是

A: 长效类胰岛素

B: α -葡萄糖苷酶抑制剂

C: 中效类胰岛素

D: 磺酰脲类

答案: C

64. 与肝素比较，低分子量肝素的特点不包括 ()

A: 应用期间应常规检测抗凝疗效及调整剂量

B: 半衰期长，皮下注射吸收较好

C: 达肝素钠对延长 APTT 的作用较弱

D: 不易致出血

答案：A

65. 利尿作用极弱，具有降低眼内压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

A: 乙酰唑胺

B: 螺内酯

C: 氢氯噻嗪

D: 呋塞米

答案：A

66. 选择性直接作用于 M 胆碱受体，引起缩瞳，眼压下降，并有调节痉挛等作用的是

A: 碳酸酐酶抑制剂

B: α_2 受体激动剂

C: 拟胆碱药

D: 前列腺素衍生物

答案：C

67. 抢救糖尿病酮症酸中毒和高血糖高渗性昏迷患者宜选用

A: 格列喹酮

B: 普通胰岛素

C: 二甲双胍

D: 低精蛋白锌胰岛素

答案：B

68. (2019 年真题) 有些药品的不良反应源于药物制剂的辅料，紫杉醇注射液中可能引起过敏反应的辅料是 ()

- A: 聚氯乙烯
- B: 聚乙烯醇蓖麻油
- C: 邻苯二甲酸二辛酯
- D: 乙醇

答案: B

69. 对于急性白血病在一线耐药时使用，但作为二线用药的药物是

- A: 多柔比星
- B: 吡柔比星
- C: 柔红霉素
- D: 表柔比星

答案: A

70. 磺胺类药物应用于新生儿会导致

- A: 血小板减少
- B: 静脉炎
- C: 黄疸
- D: 腹部不适

答案: C

71. 氨茶碱的主要平喘机制为

- A: 松弛气道平滑肌
- B: 直接舒张支气管
- C: 激活鸟苷酸环化酶
- D: 抑制腺苷酸环化酶

答案: A

72. 治疗滴虫性阴道炎适宜使用的药物是（）

- A: 呋喃妥因
- B: 甲硝唑
- C: 庆大霉素
- D: 苄星青霉素

答案：B

73. 治疗高血压危象的药物是（）

- A: 依那普利
- B: 普萘洛尔
- C: 可乐定
- D: 硝普钠

答案：D

74. 与奥美拉唑、甲硝唑三联治疗幽门螺杆菌感染的是

- A: 红霉素
- B: 万古霉素
- C: 克拉霉素
- D: 罗红霉素

答案：C

75. 治疗膀胱过度活动症宜选用

- A: 利血平
- B: 坦洛新
- C: 托特罗定
- D: 尼莫地平

答案：C

76. (2016 年真题) 可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药品是

- A: 谷氨酸
- B: 氯化钾
- C: 硫酸镁
- D: 乳酸钠

答案：D

77. 可用于治疗老年骨质疏松，属于维生素 D 代谢产物的是

- A: 葡萄糖酸钙
- B: 瑞格列奈
- C: 骨化三醇
- D: 利拉鲁肽

答案：C

78. 治疗肾性尿崩症

- A: 乙酰唑胺
- B: 呋塞米
- C: 螺内酯
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

79. 易引起过敏性休克的药物是()

- A: 四环素
- B: 磺胺嘧啶
- C: 链霉素
- D: 青霉素

答案：D

80. 止吐方案：每日化疗前，联合应用 5-HT

- A: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- B: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- C: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- D: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：D

81. （2016 年真题）属于 5α 受体还原酶抑制剂的抗良性前列腺增生症的药品是

- A: 普适秦
- B: 度他雄胺
- C: 酚妥拉明
- D: 特拉唑嗪

答案：B

82. 袢利尿药主要作用于髓袢升支粗段，利尿作用强，其代表药物是()

- A: 依他尼酸
- B: 布美他尼
- C: 托拉塞米
- D: 呋塞米

答案：D

83. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用

- A: 3%过氧化氢溶液
- B: 2%酚甘油滴耳液
- C: 3%酚甘油滴耳液
- D: 2%过氧化氢溶液

答案：A

84. 室性心律失常可用

- A: 地高辛
- B: 普萘洛尔
- C: 地尔硫草
- D: 美西律

答案：D

85. 患者，女，68 岁。近期有急性心肌梗死病史。目前正在服用阿司匹林、氯吡格雷、普伐他汀和美托洛尔。近日因偶尔出现胃灼热不适感而就医，该患者应避免使用的药物是

- A: 雷贝拉唑
- B: 雷尼替丁德
- C: 奥美拉唑
- D: 法莫替丁

答案：C

86. 军团菌和支原体混合感染宜首选的抗菌药物是()。

- A: 利奈唑胺
- B: 罗红霉素
- C: 头孢他啶
- D: 头孢曲松

答案：B

87. 阿司匹林与华法林合用

- A: 诱发胃肠道溃疡出血

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 心源性水肿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/357050020056010024>