2024福建省城厢区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题完整题库（典优）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.（2019年真题）关于NSAIDS类药物所致不良反应的说法，正确的是（）

A：选择性COX-2抑制剂导致胃及十二指肠溃疡和出血的风险高于非选择性NSAIDS类药物

B：非选择性NSAIDS类药物导致的心血管风险高于选择性COX-2抑制剂

C：NSAIDS类药物所致的胃肠道不良反应中，以萎缩性胃炎最为常见

D：非选择性NSAIDS类药物可导致胃及十二指肠溃疡和出血等风险

答案：D

2.可使前者作用加强或延长的是

A：他莫昔芬

B：红霉素

C：氯丙嗪

D：维生素C

答案：C

3.依普黄酮可用于

A：儿童及青少年

B：妊娠期及哺乳期妇女

C：绝经期超过2年以上的妇女

D：低钙血症者

答案：C

4.不宜口服给药的药物是

A：洛伐他汀

B：硝苯地平

C：硝酸甘油

D：普萘洛尔

答案：C

5.不属于维生素B2缺乏临床表现的是

A：白内障形成

B：阴道炎

C：脚气病

D：口角炎

答案：C

6.下列属于 β 受体阻断剂的是

A：卡托普利

B：阿利吉仑

C：美托洛尔

D：螺内酯

答案：C

7.（2015年真题）患者，男，56岁。有高血压病史4年。体检：血压156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者用药过程中可能发生的典型不良反应是（）。

A：干咳

B：光过敏

C：低血糖

D：水肿

答案：A

8.口服治疗体癣，毛发癣，对深部真菌无效的药物是()

A：克霉唑

B：环丙沙星

C：灰黄霉素

D：咪康唑

答案：C

9.抗菌谱较广，还可用于治疗自身免疫性疾病

A：环磷酰胺

B：阿霉素

C：放线茵素D

D：丝裂霉素

答案：A

10.在动物骨髓造血组织中含量较多，有促进白细胞增生及抗放射线作用的是

A：鲨肝醇

B：维生素B4

C：丙酸诺龙

D：小檗胺

答案：A

11.下列关于碘苷说法错误的是

A：皮肤疾病可长期用药

B: 可用于疱疹性脑膜炎
C: 可延缓角膜上皮创伤愈合
D: 可用于单纯疱疹性角膜炎
答案：A

12.易发生持续性干咳不良反应的药品是()。
A: 福辛普利
B: 硝苯地平
C: 氢氯噻嗪
D: 硝酸甘油
答案：A

13.甲状腺危象宜选用
A: 普萘洛尔
B: 甲状腺片
C: 硫脲类
D: 硫脲类+大剂量碘
答案：D

14.肾上腺糖皮质激素类药物对电解质的影响是
A: 抑制钾的排泄
B: 抑制钠的排泄
C: 抑制钙的排泄
D: 抑制磷的排泄
答案：B

15.主要用于治疗皮肤真菌感染，可抑制角鲨烯环氧酶活性，属于丙烯胺类的抗真菌药物是

A：联苯苄唑

B：阿莫罗芬

C：制霉菌素

D：特比萘芬

答案：D

16.依诺沙星与华法林合用

A：不良反应叠加

B：后者血药浓度升高，不良反应增加

C：后者血药浓度下降，药效降低

D：药理作用拮抗

答案：B

17.以下药物肾结石患者禁用的是

A：苯溴马隆

B：别嘌醇

C：非布司他

D：秋水仙碱

答案：A

18.可抑制细菌的DNA依赖性RNA多聚酶的是()。

A：磷霉素

B：利福平

C：替考拉宁

D：舒巴坦

答案：B

19.具有阿片样作用，长期大量服用可产生欣快感，并可能出现药物依赖性的止泻药是()

A: 洛哌丁胺

B: 蒙脱石散

C: 地芬诺酯

D: 乳果糖

答案：C

20.肝素可增强抗凝血酶III活性，灭活下列哪组凝血因子

A: Ⅱa、Ⅲa、Ⅳa、Ⅴa、Ⅶa

B: Ⅱa、Ⅶa、Ⅷa、Ⅸa、Ⅹa

C: Ⅱa、Ⅸa、Ⅹa、Ⅺa、Ⅻa

D: Ⅱa、Ⅵa、Ⅶa、Ⅷa、Ⅸa

答案：C

21.（2017年真题）可能引起中性粒细胞减少的药物（）

A: 碘，碘化物

B: 丙硫氧嘧啶

C: 左甲状腺素

D: 鲨肝醇

答案：B

22.患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。

A: 不会促进乙酰胆碱的释放

B：不会导致Q～T间期延长及室性心律失常

C：不会导致催乳素增多

D：不会导致锥体外系反应

答案：A

23.患者，男，22岁，诊断为风湿热，可选用

A：苄星青霉素

B：万古霉素

C：阿莫西林

D：双氯西林

答案：A

24.不易透过血一脑屏障，药理作用单一，主要用于治疗膀胱过度活动症的非选择性M受体阻断药是

A：托特罗定

B：奥昔布宁

C：索利那新

D：黄酮哌酯

答案：A

25.口服存在首关效应的药物是

A：乙酰半胱氨酸

B：羧甲司坦

C：氨溴索

D：溴已新

答案：A

26.下列可用于治疗哮喘的是

A: 氯苯那敏
B: 孟鲁司特
C: 氮革斯汀
D: 氯雷他定
答案：B

27.属于叶酸类抗代谢类药物的是
A: 吉西他滨
B: 巯嘌呤
C: 长春瑞滨
D: 甲氨蝶呤
答案：D

28.适用于需要尽快解决急性症状的抗前列腺增生症药物是
A: 非那雄胺
B: 坦洛新
C: 丙酸睾酮
D: 西地那非
答案：B

29.老年人对苯二氮（艹卓）类药较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟缓等症状，在临床上称为
A: 戒断综合征
B: 震颤麻痹综合征
C: 老年期痴呆
D: “宿醉”现象
答案：D

30.导致胃肠道溃疡及出血风险较其他传统非甾体抗炎药低的是

A：吲哚美辛

B：塞来昔布

C：布洛芬

D：对乙酰氨基酚

答案：B

31.可直接地抑制凝血因子Xa，并与抗凝血酶Ⅱ结合，形成构象改变，使凝血酶抗Xa因子活性增强270倍，阻碍凝血酶（凝血因子Ⅱa）产生的抗凝血药是()。

A：水蛭素

B：依诺肝素

C：阿哌沙班

D：磺达肝葵钠

答案：C

32.可增高甲氨蝶呤血浆浓度的药物不包括

A：水杨酸类

B：碳酸氢钠

C：磺胺类

D：氯霉素

答案：B

33.急性化脓性中耳炎早期最有效的治疗是()

A：2%酚甘油滴耳

B：抗生素溶液滴耳

C：及早足量抗生素应用

D：抗生素加激素全身应用

答案：C

34.叶酸与维生素B12联用治疗

A：小细胞低血红蛋白性贫血

B：再生障碍性贫血

C：溶血性贫血

D：巨幼细胞贫血

答案：D

35.茚地那韦的作用靶点是

A：脱氧核糖核酸聚合酶

B：神经氨酸酶

C：HIV-1和HIV-2蛋白酶

D：HIV-1反转录酶

答案：C

36.关于替加环素的使用，错误的是

A：替加环素抑制CYP1A2、2C8、2C9、2C19、2D6和3A4介导的药物代谢

B：肾功能不全或接受血液透析患者无需对替加环素进行剂量调整

C：8岁以下儿童禁用替加环素

D：替加环素是P—gp的底物

答案：A

37.抗肿瘤抗生素

A：环磷酰胺

B：丝裂霉素

C：喜树碱类

D：顺铂

答案：B

38.（2020年真题）对某些癌症患者，在抗癌药物治疗后，还需使用重组人粒细胞刺激因子，其目的是

A：预防癌症复发

B：预防过敏反应

C：预防粒细胞缺乏

D：预防出血过多

答案：C

39.葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏者应禁用

A：替硝唑

B：哌嗪

C：伯氨喹

D：奎宁

答案：C

40.下列关于钠的作用特点描述，错误的是

A：调节体液渗透压、电解质及酸碱平衡

B：调节体内水量的恒定

C：不能调节体内水量的恒定

D：维持血压

答案：C

41.可与硝酸酯类药物发生相互作用的是

A：伐地那非

B：呋塞米

C: 坎利酮

D: 丙酸睾酮

答案：A

42.磷酸二酯酶抑制剂的机制

A: 抑制血小板表面的ADP受体

B: 抑制纤维蛋白原与血小板膜表面糖蛋白受体的结合

C: 使血小板内cAMP浓度增高而产生抗血小板作用

D: 抑制葡萄糖脱氢酶

答案：C

43.患者，女，46岁。以"口角歪斜3天"之主诉入院。3天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

A: 苯巴比妥

B: 卡马西平

C: 伊曲康唑

D: 苯妥英钠

答案：C

44.高效抑菌药是

A: 氯霉素

B: 异烟肼

C: 头孢菌素

D: 磺胺嘧啶

答案：D

45.毛花苷丙经弱碱水解去甲酰化的产物是

A：洋地黄毒苷

B：毛花苷丙（西地兰C）

C：去乙酰毛花苷（西地兰D）

D：地高辛

答案：C

46.关于艾塞那肽的注意事项描述，不正确的是()

A：肾移植患者慎用

B：本品可肌内注射

C：应注意是否有过敏性症状

D：服药期间应警惕急性胰腺炎症状

答案：B

47.伴有前列腺增生的哮喘患者不宜选用的药物是

A：白三烯受体阻断剂

B：M胆碱受体阻断剂

C：长效B2受体激动剂

D：磷酸二酯酶抑制剂

答案：B

48.治疗高血压危象的药物是()

A：普萘洛尔

B：硝普钠

C：依那普利

D：可乐定

答案：B

49.在使用减毒活流感疫苗后一段时间内不应服用奥司他韦，该时间是

A: 3周内

B: 1周内

C: 4周内

D: 2周内

答案：D

50.多烯磷脂酰胆碱作为保护肝细胞药的作用机制是

A: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用

B: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

C: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平

D: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞

答案：A

51.以下关于胰高血糖素样肽-1受体激动剂使用的描述，错误的是

A: 口服需快速通过胃肠道吸收的药物在注射本品前至少1小时服用

B: 建议与DPP-4抑制剂联用

C: 存在发生胰腺炎的风险

D: 不良反应主要发生于胃肠道

答案：B

52.某些慢性疾病使用地塞米松长期治疗，为减少外源性激素对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制，推荐给药时间是

A: 下午4时左右

B: 空腹

C: 中午12时左右

D: 上午8时左右

答案：D

53.下列药物中，与维生素D合用能出现高钙血症的药物是

A：考来烯胺

B：氢氯噻嗪

C：矿物油

D：硫糖铝

答案：B

54.属于ⅠA类抗心律失常药

A：普萘洛尔

B：胺碘酮

C：利多卡因

D：奎尼丁

答案：D

55.拮抗双香豆素类过量引起出血的适宜解毒药物是

A：鱼精蛋白

B：氨甲苯酸

C：氨甲环酸

D：维生素K

答案：D

56.整合素受体阻断剂的机制

A：抑制葡萄糖脱氢酶

B：使血小板内cAMP浓度增高而产生抗血小板作用

C：抑制纤维蛋白原与血小板膜表面糖蛋白受体的结合

D：抑制血小板表面的ADP受体

答案：C

57.硫脲类药物的基本作用是

A：抑制甲状腺过氧化物酶

B：抑制碘泵

C：抑制Na

D：抑制甲状腺蛋白水解酶

答案：A

58.（2017年真题）减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定,属于乙内酰脲类抗癫药的是（）

A：加巴喷丁

B：苯妥英钠

C：苯巴比妥

D：卡马西平

答案：B

59.（2019年真题）患者，男，64岁，因“慢性肾脏病、肾性高血压”入院，血压203/110mmHg，该患者宜首选（如果疗程超过2小时需密切监测血中硫氰酸盐水平）的降压药物是（）

A：美托洛尔

B：氨氯地平

C：硝普钠

D：贝那普利

答案：C

60.可拮抗阿托品所致的心动过速的是

A：美西律

B: 地高辛
C: 普萘洛尔
D: 地尔硫䓬
答案：D

61.白女士，74岁，以“间断性腹胀1月余”主诉入院。患者1个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史14年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：
A: 高钾血症
B: 预防急性肾衰竭
C: 充血性心力衰竭
D: 高钠血症
答案：D

62.关于茶碱给药途径叙述不正确的是
A: 进餐时或餐后服药，吸收较慢
B: 灌肠吸收慢
C: 空腹口服吸收快
D: 肌注有刺激性
答案：B

63.患者，女，41岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日6～8次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞8～10/HP，红细胞3～5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2片，口服，3次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2次/日。
A: 地芬诺酯对肠道作用类似吗啡
B: 为阿片受体激动剂

C：含地芬诺酯和阿托品

D：地芬诺酯是吗啡的衍生物

答案：D

64.甲地孕酮与利福平合用()

A：子宫内膜突破性出血

B：代谢加速而导致意外怀孕

C：抑制排酸作用

D：代谢加快而失效

答案：A

65.中度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选()

A：5-HT

B：每日化疗前，应用5-HT

C：5-HT

D：奥美拉唑+口服地塞米松

答案：C

66.影响血脂和血糖的药物是

A：呋塞米

B：螺内酯

C：氢氯噻嗪

D：乙酰唑胺

答案：C

67.伴有炎性肠病、溃疡、胃肠道梗阻和腹部手术史的糖尿病患者,不宜使用的降糖药物是（）

A：二甲双胍

B：阿卡波糖

C：格列美脲

D：比格列

答案：B

68.若无禁忌,冠心病或缺血性脑卒中患者均应长期使用的药物是

A：肝素

B：阿司匹林

C：依诺肝素

D：氯吡格雷

答案：B

69.属于芳基乙酸类的是

A：吲哚美辛

B：阿司匹林

C：塞来昔布

D：对乙酰氨基酚

答案：A

70.因抑制P-糖蛋白使地高辛浓度增加70%～100%的是

A：克拉霉素

B：硫酸镁

C：胺碘酮

D：呋塞米

答案：C

71.（2019年真题）主要通过选择性抑制5-HT再摄取而起到抗抑郁作用的药物是（）

A：帕罗西汀

B：马普替林

C：度洛西汀

D：吗氯贝胺

答案：A

72.阻断白三烯受体,起效缓慢,作用较弱,仅适用于轻、中度哮喘和哮喘稳定控制的药物是（）

A：茶碱

B：沙美特罗

C：氟替卡松

D：孟鲁司特

答案：D

73.属于抗胆碱药的是()

A：哌仑西平

B：雷尼替丁

C：氢氧化铝

D：奥美拉唑

答案：A

74.可为患者提供一定的能量，对于长期昏迷的患者尤为适用的药物是

A：螺内酯

B：阿米洛利

C：甘露醇

D：甘油果糖

答案：D

75.利多卡因的电生理作用错误的是

A：使传导减慢

B：提高心室颤动阈值

C：缩短复极时间

D：明显影响动作电位0相

答案：D

76.弥散性血管内凝血症的晚期可选用

A：尿激酶

B：氨甲环酸

C：低分子肝素

D：维生素K

答案：B

77.患者女性，30岁。以肺结核收治入院，给予抗结核治疗，链霉素肌内注射后，10分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状，继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

A：链霉素引起的神经肌肉阻滞作用

B：链霉素引起的神经毒性

C：链霉素引起的肾毒性

D：链霉素引起的过敏性休克

答案：D

78.主要用于在抗雌激素辅助治疗后或治疗过程中复发的，或是在抗雌激素治疗中进展的绝经后（包括自然绝经和人工绝经）雌激素受体阳性的局部晚期或转移性乳腺癌，该药物是

A：来曲唑

B：他莫昔芬

C：依西美坦

D：氟维司群

答案：D

79.（2015年真题）干扰肿瘤细胞转录过程和阻止RNA合成的抗肿瘤药是（）。

A：伊立替康

B：多柔比星

C：多西他赛

D：氟尿嘧啶

答案：B

80.甲氧苄啶联用华法林使

A：肾毒性增加

B：抗凝作用增强

C：半衰期缩短

D：白细胞减少风险增加

答案：B

81.下述种类的利尿药中，利尿作用最强的是

A：留钾利尿剂

B：噻嗪类利尿剂

C：碳酸酐酶抑制剂

D：袢利尿剂

答案：D

82.（2020年真题）主要用于解热镇痛，但几乎没有抗炎作用的药物是

A：阿司匹林

B：对乙酰氨基酚

C：吲哚美辛

D：塞来昔布

答案：B

83.又称为腺嘌呤，是生物体内辅酶与核酸的组成和活性成分，具有刺激骨髓白细胞增生作用的是

A：鲨肝醇

B：丙酸诺龙

C：小檗胺

D：维生素B4

答案：D

84.可引起巨幼红细胞性贫血的药物是()

A：伯氨喹

B：乙胺嘧啶

C：氯喹

D：甲氟喹

答案：B

85.联合应用可使部分患者血压升高的药物是

A：磷霉素氨丁三醇

B：磷霉素钠+万古霉素

C：利奈唑胺+苯丙醇胺

D：利奈唑胺+哌替啶

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/357055135046010024