

2024 年护士资格考试公共基础知识考试题库及答案 (共 480 题)

1. 高压氧下血氧含量增加，主要是由于（ B ）
A. 氧合血红蛋白的亲合力增加 B. 血浆中物理溶解氧增加 C. 血液中游离氧增加
D. 结合氧的离解减少 E. 机体耗氧量减少
2. 病人右腰背部皮肤疼痛，且有呈带状排列的群集米粒至黄豆大水疱，皮损局部治疗应选择（ B ）
A. 软膏 B. 湿敷 C. 粉剂 D. 酊剂 E. 洗剂
3. 下列传染病中，哪种属于甲类传染病（ B ）
A. 艾滋病 B. 鼠疫 C. 传染性非典型肺炎 D. 肺炭疽 E. 人感染高致病性禽流感
4. 脑室穿刺引流术后一般每天引流脑脊液量不超过（ E ）
A. 100ml B. 200ml C. 300ml D. 400ml E. 500ml
5. 输液中发现溶液不滴经检查为针头阻塞，其正确的处理方法是（ E ）
A. 调整针头位置 B. 静脉内推注等渗盐水冲开 C. 用手挤压胶管 D. 输液局部热敷

E. 更换针头重新穿刺

6. 对破伤风抗毒素皮肤试验阳性病人采用脱敏注射的原理是 (C)

A. 促进吞噬细胞对 IgE 的灭活作用 B. 抑制肥大细胞吸附 IgE C. 逐步结合消耗体内的 IgE

D. 与体内的 IgE 竞争受体 E. 封闭 IgE, 阻断与抗原结合

7. 有关一级预防的描述哪项是正确的 (E)

A. 又称临床前预防, 是使疾病不致发生 B. 主要是对疾病早发现、早诊断、早治疗

C. 又称临床预防, 即及时采取治疗措施 D. 主要是对疾病有效治疗, 防止疾病恶化

E. 又称病因预防, 即采取各种措施控制或消除病因与危险因素

8. 高压氧治疗的绝对禁忌证是 (C)

A. 肺结核 B. 有颅骨缺损者 C. 未经处理的气胸 D. 收缩压 > 150mmHg

E. 体温 > 38°C

9. 急性心肌梗死最突出的症状是 (B)

A. 休克 B. 心前区疼痛 C. 心律失常 D. 充血性心力衰竭 E. 胃肠道症状

10. 交感性眼炎一般发生在穿透性眼外伤后 (B)

A. 2 周 B. 2~8 周 C. 1 周 D. 2~8 个月 E. 2~8 天

11. 病人手指并拢一手掌面积为体表总面积的 (C)

A. 0.5% B. 0.75% C. 1.0% D. 1.25% E. 1.5%

12. 休克早期血压及脉搏的变化是 (D)

A. 收缩压下降, 舒张压下降, 脉搏细速 B. 收缩压正常, 舒张压下降, 脉搏细速

C. 收缩压正常, 舒张压升高, 脉搏缓慢 D. 收缩压正常, 舒张压升高, 脉搏细速

E. 收缩压升高, 舒张压正常, 脉搏细速

13. 防止烧伤休克的主要措施是 (D)

A. 保暖 B. 镇痛、镇静 C. 创面处 D. 补液治疗 E. 多饮水

14. 关于小儿生长发育, 下述哪项是错误的 (C)

A. 生长发育是连续的过程, 各年龄阶段发育的速度不同

B. 神经系统发育最早, 3 岁时神经细胞分化已基本完成

C. 淋巴系统发育于学龄期达成人水平 D. 生长发育存在个体差异

E. 生后头 3 个月体重增长最快

15. 过敏性紫癜与血小板减少性紫癜的主要区别是 (C)

- A. 毛细血管脆性试验阳性 B. 紫癜呈对称分布 C. 血小板正常
D. 下肢皮肤有紫癜 E. 有过敏史

16. 胆道 T 型引流管冲洗后注入 33%硫酸镁 15~20mL 的目的是 (A)

- A. 松弛括约肌, 以利引流 B. 镇静、解痉 C. 降低血压 D. 导泻 E. 消炎、止痛

17. 临床拟诊为肝管结石, 下列哪种成像技术为首选 (A)

- A. CT B. MRI C. CTA D. DSA E. MRA

18. 下列各类病人无须鼻饲法进食的是 (E)

- A. 昏迷病人 B. 口腔手术后病人 C. 早产儿 D. 破伤风病人 E. 休克病人

19. 确诊新型隐球菌性脑膜炎的主要实验室检查是 (A)

- A. 脑脊液涂片墨汁染色 B. 脑脊液细胞学检查 C. 脑脊液生化检查
D. 血液细菌培养 E. 脑脊液荧光素钠试验

20. 对缺氧和二氧化碳潴留同时并存者应 (C)

- A. 高浓度给氧为宜 B. 大流量给氧为宜 C. 低浓度持续给氧为宜
D. 低流量间断给氧为宜 E. 高浓度间断给氧为宜

21. 躯体石膏固定病人最严重的并发症是 (C)

A. 喷射性呕吐 B. 剧烈疼痛 C. 石膏综合征 D. 寒战 E. 末梢血运差

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/357064062120010012>