2024年广东省荔湾区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试大全带下载答案

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.患者，男，56岁，诊断为病毒性乙型肝炎。实验室检查：HbeAg（+），HBV-DNA≥20000IU/ml。ALT200U/L。现需要启动抗病毒治疗，采用干扰素α和核苷（酸）类抗病毒药物。

A：替比夫定

B：恩替卡韦

C：阿德福韦

D：拉米夫定

答案：B

2.控制被经济利益驱动的过度药物治疗体现

A：规范性

B：经济性

C：有效性

D：安全性

答案：B

3.患者，男，50岁，血压170/90mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是

A：利尿剂+ARB

B：α受体阻滞剂+ACEI

C：β受体阻滞剂+ARB

D：利尿剂+CCB

答案：D

4.药师应告知医师"合理用药信息"的事例是

A：他汀类药合用吉非贝齐或烟酸致横纹肌溶解症

B：培氟沙星引起跟腱炎、合用糖皮质激素可致跟腱断裂

C：长时间、大剂量应用头孢菌素类引起牙龈出血、手术创面渗血等反应

D：氟西汀或帕罗西汀与异烟肼等单胺氧化酶抑制剂合用引起5羟色胺综合征

答案：C

5.少数患者在口服时可出现前庭神经紊乱（如头晕、眩晕）的痤疮治疗药是

A：口服短效避孕药

B：米诺环素

C：维A酸

D：过氧化苯甲酰

答案：B

6.(用药导致的血常规异常)硝酸甘油

A：嗜酸性粒细胞减少

B：血小板减少

C：中性粒细胞减少

D：血红蛋白量增多

答案：D

7.填写具体；如患卵巢囊肿合并肺部感染注射头孢曲松引起不良反应，应填写肺部感染

A: 不良反应/事件的结果

B: 用药起止时间

C: 用药原因

D: ADR/ADE过程描述

答案：C

8.患者，男，65岁，患有骨质疏松症。根据患者饮食习惯，每日需补充元素钙600mg。药师为其推荐碳酸钙(0. 5g/片)，该患者适宜的用法用量是

A: 1片tid

B: 4片qd

C: 6片qd

D: 2片tid

答案：A

9.房颤合并支气管哮喘患者，适用于控制心室率的药物为

A: 利伐沙班

B: 地尔硫卓

C: 硝苯地平

D: 胺碘酮

答案：B

10.能够给予当即解答的就当即解答

A: 保护患者的隐私

B: 及时回答不拖延

C: 解释的技巧

D: 特别关注特殊人群

答案：B

11.非磺酰脲类促胰岛素分泌剂

A: 瑞格列奈

B: 伏格列波糖

C: 格列吡嗪

D: 罗格列酮

答案：A

12.pH碱性的感染尿液常见

A: 尿酸盐结晶

B: 草酸盐结晶

C: 酪氨酸和亮氨酸结晶

D: 磷酸盐结晶

答案：D

13.欧洲药物管理局(EMA)提议“限制临床使用多潘立酮”的主要原因是

A: 可能引起腹胀、胃灼热

B: 可能引起心脏相关风险

C: 消化不良患者常擅自服用

D: 易发生严重的口腔溃疡

答案：B

14.以下用药，属于“禁忌证用药”的是

A: 黄体酮用于输尿管结石

B: 治疗感冒、咳嗽给予抗菌药

C: 脂肪乳用于急性肝损伤、脂质肾病、脑卒中

D: 无治疗指征盲目补钙

答案：C

15.脑出血急性期体位应注意的是（）

A：仰卧位

B：抬高床头15-30°

C：俯卧位

D：侧卧位

答案：B

16.患者，男，26岁，因“咳嗽伴间断发热1周”入院，查体：T38.9℃，P90次/分，R21次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞16.9×109/L，中性粒细胞百分比84.6%；胸部CT示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A：肝功能不全者

B：肾功能不全者

C：推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在15～20mg/L并且长疗程的患者

D：老年人

答案：A

17.患者，男，68岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热2天”入院。查体：体温39.1℃，血压138/80mmHg，心率102次/分，呼吸32次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数11.2×109/L，中性粒细胞百分比85%。胸部x线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A：阿奇霉素

B：阿莫西林一克拉维酸钾+阿奇霉素

C：左氧氟沙星+阿奇霉素

D: 多西环素

答案：B

18.控制癫痫持续状态应入院后首选（）

A: 静脉注射丙戊酸钠

B: 静脉注射地西泮

C: 口服硫酸镁

D: 肌肉注射地西泮

答案：B

19.根据药物对胎儿的危害,美国FDA将妊娠用药毒性分为A、B、C、D、X五个级别,正常剂量维生素D的妊娠毒性分级是()

A: D级

B: A级

C: X级

D: C级

答案：B

20.下列药物属于肝药酶诱导剂的是：

A: 卡马西平

B: 氟康唑

C: X丙沙星

D: 胺碘酮

答案：A

21.有强烈的血管收缩作用，输液过程中不慎渗出血管，可致组织坏死的药物是

A: 多巴胺

B：去乙酰毛花苷

C：米力农

D：维拉帕米

答案：A

22.（2015年真题）细菌感染腹泻患者宜选用（）。

A：小檗碱

B：阿苯达唑

C：乳果糖

D：干酵母

答案：A

23.患者，男，68岁，肺癌晚期，平日清晨、晚间8点使用吗啡缓释片控制疼痛。目前出现暴发性疼痛，应采取的治疗措施是

A：即刻加用吗啡缓释片一次

B：即刻加用可待因片一次

C：即刻加用芬太尼透皮贴剂

D：即刻加用吗啡片一次

答案：D

24.运动员禁用药物中，利尿剂产生的危害是

A：能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖

B：长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡

C：诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患

D：易造成人体严重脱水、肾衰竭

答案：D

25.患者女45岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片20mgbid，甲硝唑片0.4gbid，克拉霉素片50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊0.6gbid。

A: 维生素B12缺乏

B: 维生素B2缺乏

C: 维生素A缺乏

D: 维生素B6缺乏

答案：A

26.口服铁剂宜选用

A: 2价铁

B: 3价跌

C: 1价铁

D: 4价跌

答案：A

27.患儿男1岁4个月家长为预防幼儿缺钙,每日给患儿服用维生素D5000IU,3个月后患儿出现乏力、恶心、呕吐食欲不振等症状化验结果血钙18mg/dI，25-OH-D3水平632ng/ml诊断为维生素D中毒下列处理措施错误的是（）

A: 停饮牛奶

B: 停用维生素D及强化食品

C: 增加日晒

D: 停用钙剂

答案：C

28.患者，女性，62岁，自述近日常有一过性黑矇，雾视、视野中有黑点，一侧面部无力、麻木。医师诊断为短暂性脑缺血。

A: 300mg/d

B: 300～500mg/d

C: 75～150mg/d

D: 200～300mg/d

答案：C

29.女性，32岁，3年来月经量增多，乏力、心悸。体检面色较苍白。血红蛋白80g／L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞7×109／L，血小板120×109／L，血清铁300μg／L。

A: 输血

B: 硫酸亚铁口服

C: 维生素B12肌内注射

D: 右旋糖酐铁肌注

答案：B

30.用后不宜马上进食的剂型是()

A: 滴眼剂

B: 含漱剂

C: 直肠栓剂

D: 软膏剂

答案：B

31.季节性过敏性鼻炎主要的诱因是

A: 花粉

B: 尘埃

C: 真菌

D: 季节

答案：A

32.患者，女，35岁，临床诊断为高甘油三脂血症，临床上给予非诺贝特进行治疗，该药正确的用量为()

A: 0.5g，qd

B: 0.5g，tid

C: 0.2g，qd

D: 0.1g，tid

答案：D

33.属于蛋白酶抑制剂的抗HIV药物是

A: 阿德福韦

B: 利托那韦

C: 拉替拉韦

D: 替诺福韦

答案：B

34.增加药物排泄，作用减弱

A: 氨茶碱

B: 胰岛素

C: 地西泮

D: 呋塞米

答案：A

35.《国家非处方药目录》收录的治疗过敏性鼻炎的药物不包括

A: 丙酸倍氯米松鼻喷雾剂

B: 羟甲唑啉滴鼻液

C: 赛洛唑啉滴鼻液

D: 1%麻黄碱滴鼻液

答案：A

36.大量或长期使用抗生素可能导致

A: 粪便细胞显微镜检查检出真菌

B: 血白细胞减少

C: 血清血红蛋白升高

D: 血清总胆固醇升高

答案：A

37.患者，女，51岁，体检时发现血压160/105mmHg，糖耐量试验餐后2小时血糖为9.56mmol/L（正常参考范围＜7.8mmol/L），三酰甘油1.52mmol/L（正常参考范围0.56～1.70mmol/L），总胆固醇6.26mmol/L（正常参考范围＜5.2mmol/L），低密度脂蛋白胆固醇4.85mmol/L（正常参考范围2.1～3.1mmol/L），高密度脂蛋白胆固醇1.20mmol/L（正常参考范围1.20～1.65mmol/L），血肌酐50μmol/L（正常参考范围45～84μmol/L），蛋白尿（++）。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

A: 氢氯噻嗪

B: 依那普利

C: 复方利血平

D: 特拉唑嗪

答案：B

38.可以杀伤结核分枝杆菌，最大限度地降低传染性的早期杀菌活性药是

A: 乙胺丁醇

B: 氨苄西林
C: 氧氟沙星
D: 莫西沙星
答案：A

39.血清 γ-谷氨酰转移酶正常参考区间是
A: 男性 11～50U/L
B: 男性＜40U/L
C: 成人＜40U/L
D: 成人＜50U/L
答案：A

40.数小时到数天即可改善症状，不影响前列腺体积和血清 PSA 水平的是（）
A: 奥昔布宁
B: 非那雄胺
C: 特拉唑嗪
D: 米多君
答案：C

41.某患者，女，14 岁，尿频、尿急、尿痛 3 天，伴腰痛。肾区叩击痛，血分析见白细胞及中性粒细胞百分比升高，尿分析见尿液浑浊，尿白细胞+++，临床诊断为急性肾盂肾炎。
A: 左氧氟沙星
B: 阿奇霉素
C: 头孢噻肟
D: 林可霉素
答案：C

42.急性肾盂肾炎常见

A：蜡样管型

B：颗粒管型、透明管型

C：细胞管型

D：白细胞管型

答案：D

43.以下关于调剂资格的叙述正确的是

A：具有中专(药学专业)以上学历即可从事处方调剂

B：具有执业药师资格或取得药学专业技术职务任职资格者可从事处方调剂

C：具有专科(药学或相关专业)以上学历即可从事处方调剂

D：具有本科(药学或相关专业)以上学历即可从事处方调剂

答案：B

44.非甾体抗炎药的不良反应,可致肝损害，产生黄疸、肝炎

A：布洛芬

B：保泰松

C：塞来昔布

D：美洛昔康

答案：B

45.I期临床试验是初步的临床药理学及人体安全性评价试验阶段。试验对象主要为健康受试者，试验样本数一般为

A：20～30例

B：10～18例

C：36～40例

D: 12～13例

答案：A

46.服药后1h内限制饮水的药物是

A: 磺胺类药物

B: 微生态制剂

C: 胃黏膜保护剂

D: 镇静催眠药

答案：C

47.（2016年真题）患者，女，55岁，因“反复发作胸骨后疼痛2年，伴反酸，胃灼热，间断积食”而就诊。食管测压提示食管下括约肌（LES）压力＜6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片20mgbid强化抑酸治疗。

A: 用药后可能出现口干，便秘等不良反应

B: 长期用药后可能会出现维生素K缺乏

C: 应整片吞服

D: 适宜餐前30分钟服用

答案：B

48.嗜酸性粒细胞正常参考区间是

A: 0.20～0.40

B: 0.03～0.08

C: 0～0.01

D: 0.01～0.05

答案：D

49.下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是：

A: 服用过量可能出现甲状腺激素功能亢进症状

B: 妊娠期妇女必须联合使用丙硫氧嘧啶

C: 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用

D: 需要终身服药

答案：B

50.可引起A/G比值<1的是

A: 各种原因脱水所致的血液浓缩

B: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害

C: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等

D: 摄入不足、消化不良时

答案：B

51.成本-效果分析

A: 是成本-效果分析的-种特例

B: 治疗结果采用临床指标表示，如治愈率

C: 药物利用指数(DUI)

D: 成本和治疗结果均用货币表示

答案：B

52.注意个体化用药体现

A: 安全性

B: 有效性

C: 经济性

D: 规范性

答案：D

53.药品名称

A: 这次拿的“×××”（商品名）是我以前一直服用的“格列齐特”吗

B: 这药能治我这种病吗

C: 这种药能报销吗

D: 中午忘吃药了怎么办

答案：A

54.较易导致肾损伤的药品是

A: 酮康唑

B: 阿米卡星

C: 新霉素

D: 氯化钾

答案：C

55.给幼儿患者选用糖浆、水剂、冲剂等较合适，体现儿童用药原则中的

A: 避免食物的影响

B: 根据儿童特点选择适宜的给药方案

C: 密切监护

D: 严格掌握用药剂量

答案：B

56.（2017年真题）患者女，68岁体重54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查ALT20IU/L，血肌酐（Cr）1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为1日1.5～6g，分2～3次给药肌酐清除率为31~50ml/min时剂量为每12小时1g；肌酐清除率为16～30ml/min时剂量为每24小时1g；肌酐清除率为6~15ml/min时量为每24小时0.5g；肌酐清除率≤5ml/min时剂量为每48小时0.5g。

A: 30ml/min

B: 25.5ml/min

C: 34ml/min

D: 40ml/min

答案：B

57.《中国药典》规定"凉暗处"除避光外，温度不应超过（）

A: 15℃

B: 4℃

C: 20℃

D: 10℃

答案：C

58.餐前服用，可以促进胃排空的药品是

A: 瑞舒伐他汀片

B: 复方铝酸铋片

C: 二甲双胍片

D: 甲氧氯普胺片

答案：D

59.急性荨麻疹的治疗首选药物是

A: 第二代非镇静抗组胺药

B: 第一代抗组胺药

C: 肾上腺糖皮质激素

D: 1：1000 肾上腺素注射液

答案：A

60.患者，男，68岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热2天”入院。查体：体温39．1℃，血压138／80mmHg，心率102次／分，呼吸32次／分，左肺可闻及湿性哕音。化验结果：白细胞计数11．2×109／L，中性粒细胞百分比85％。胸部x线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A: 阿奇霉素

B: 莫西沙星

C: 氨苄西林～舒巴坦

D: 哌拉西林一他唑巴坦

答案：B

61.患者，女，31岁，1个月前顺一健康男婴。近2周出现心境低落、乏力纳差、失眠焦虑，有自杀倾向，无法哺乳。诊断为产后抑郁症，给予氟西汀片20mgqd。关于该患者用药教育的说法，错误的是（）

A: 为尽快恢复哺乳，患者应在症状改善1个月后逐渐减量,直至停药

B: 应足量和足疗程用药，疗效不佳可考虑换药

C: 氟西汀应于每日早餐后服用

D: 向患者解释“剂量滴定原则”，提示其用药剂量可能需要逐渐增加

答案：A

62.长期应用苯二氮类药物不能突然停止使用，是因为（）

A: 首剂效应

B: 药物依赖

C: 后遗效应

D: 毒性反应

答案：B

63.Ⅳ期临床试验是在广泛使用条件下，考察药品的疗效和不良反应，试验样本数常见病不少于

A：1000 例

B：2000 例

C：4000 例

D：3000 例

答案：B

64.Ⅰ期临床试验样本数为

A：常见病≥2000 例

B：常见病≥1000 例

C：100～300 例

D：20～30 例

答案：D

65.关于冰毒的中毒解救措施，错误的是

A：碱化尿液

B：洗胃

C：利尿

D：催吐

答案：A

66.可能导致 γ-谷氨酰转移酶升高的药物是

A：阿司匹林

B：苯妥英钠

C：氯氮平

D：胰岛素

答案：B

67.临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

A：二巯丙醇

B：依地酸钙钠

C：二巯丁二钠

D：青霉胺

答案：A

68.痛风慢性期应长期使用的促尿酸排泄药是

A：秋水仙碱

B：别嘌醇

C：阿司匹林

D：丙磺舒

答案：D

69.关于乙型肝炎病毒表面抗体的描述错误的是

A：乙型肝炎恢复期可出现HBsAb阳性

B：大多数HBsAg的消失和HBsAb的出现，意味着HBV感染的恢复期和人体产生了免疫力

C：HBsAb是一种保护性抗体

D：HBsAb是HBsAg的对应抗体，但非中和抗体

答案：D

70.下列药物中属于弱阿片类药物的为（）

A：可待因

B：吗啡

C：哌替啶

D: 羟考酮

答案：A

71.脂溶性维生素A宜餐后服用的原理是

A: 餐后胃酸分泌增多有利于吸收

B: 利用油脂增加其溶解

C: 延长在胃肠道滞留时间

D: 减少被胃酸破坏

答案：B

72.可引起泌尿生殖系统异常，指趾畸形的是

A: 氮芥类

B: 甲巯咪唑

C: 雌孕激素

D: 沙立度胺

答案：A

73.流行性出血性结膜炎可选用

A: 0.1%羟苄唑滴眼剂

B: 2%色甘酸钠滴眼剂

C: 0.1%碘苷滴眼剂

D: 四环素眼膏

答案：A

74.适宜进餐时给药，可以减少脂肪吸收率的药物是

A: 奥利司他

B: 甲氧氯普胺

C: 氢氧化铝

D: 多潘立酮

答案：A

75.急性肠炎可出现()。

A: 鲜血便

B: 胨状便

C: 脓血便

D: 稀糊便

答案：D

76.以保证正常起居（避免夜尿）的是

A: 氨基糖苷类

B: 利尿药

C: 阿苯达唑

D: 抗忧郁药

答案：B

77.正常剂量氯化钾的妊娠毒性分级是()

A: X级

B: B级

C: C级

D: A级

答案：D

78.帕金森病患者跌倒的最常见原因为（）

A: 姿势反射障碍

B: 体位性低血压

C: 不安腿综合征

D: 神经精神障碍

答案：A

79.患者，女，18岁，近半年来食欲亢进，多汗，体重明显减轻，伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤，心率104次/分。化验结果：血清促甲状腺激素（TSH）<0.1mU/L，FT3、FT4明显升高，肝、肾功能基本正常，白细胞计数正常。诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是

A: 注意休息与补充营养，使用甲巯咪唑治疗

B: 甲状腺全切除手术

C: 碘化钾治疗，定期复查

D: 选用放射性131Ⅰ治疗

答案：A

80.属于抗胆碱药的是

A: 普拉克索

B: 司来吉兰

C: 苯海索

D: 恩托卡朋

答案：C

81.氟尿嘧啶、甲氨蝶呤等抗肿瘤治疗应该禁用的是

A: 食醋

B: 脂肪

C: 酒

D: 食盐

答案：C

82.复发

A：治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药6周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同

B：患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次（同一菌株），尿细菌数>105cfu／ml

C：宜选用毒性小的抗菌药物

D：治疗后症状消失，尿菌阴转后在6周内再次出现菌尿，菌种与上次相同

答案：D

83.甲氨蝶呤归属

A：X级

B：D级

C：B级

D：C级

答案：A

84.患者,男,65岁,诊断为持续性心房纤颤,医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症,目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况,药师提出的合理化药物治疗建议,不包括()

A：患者在复律成功后,尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗

B：胺碘酮能增加华法林的抗凝活性,在逐渐降低胺碘酮剂量的时候,注意随时根据INR值调整华法林的剂量

C：因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用,建议换成氨氯地平等CCB降压药

D：胺碘酮可以显著抑制CYP2D6,减慢美托洛尔的代谢,应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/357135106052010024