

急救理论知识模拟题库与答案

1、属于软组织闭合性损伤的是()

- A、刺伤
- B、擦伤
- C、切割伤
- D、爆震伤
- E、撕脱伤

答案：D

2、中华人民共和国传染病防治法将传染病分为几类? ____ ()

- A、四类
- B、三类
- C、二类

答案：B

3、病人心肺复苏后，脑复苏的主要措施是：()

- A、维持有效的循环
- B、确保呼吸道通畅
- C、降温和脱水疗法
- D、加强基础护理

答案：C

4、非专业急救者遇到呼吸停止的无意识患者时应()

- A、先进行2次人工呼吸后立即开始胸外按压；
- B、呼救急救医疗服务体系；
- C、马上寻找自动除颤仪；
- D、先开始生命体征评估，再进行心肺复苏。

答案：A

5、患者女性，28岁。自高处坠下，额部着地，双眼眶青紫淤血，鼻腔有血性液体流出，主诉视力有所下降，可考虑()

- A、鼻出血
- B、颅前窝骨折
- C、脑损伤
- D、颅中窝骨折
- E、眼球损伤

答案：B

6、阿托品中毒样症状表现不包括()

- A、恶心

- B、 心动过速
- C、 狂躁
- D、 瞳孔扩大
- E、 惊厥

答案：A

7、患者女性，48岁。家住平房，生煤火取暖，晨起感到头痛、头晕、视物模糊而摔倒，被他人发现后送至医院。急查血液碳氧血红蛋白实验呈阳性，首要的治疗原则是()

- A、纠正缺氧
- B、注意保暖
- C、保持呼吸道通畅
- D、静脉输液治疗
- E、测量生命体征

答案：A

8、患者，男性，67岁，呼吸衰竭。血气分析显示患者存在呼吸性酸中毒，其主要治疗措施应该依靠()

- A、补充液体
- B、治疗原发病
- C、改善通气
- D、使用激素
- E、提高吸氧浓度

答案：C

9、病人,男,40岁。误服装在饮料瓶里的杀虫剂 毒物吸收后主要进行代谢的脏器为:()

- A、 脾脏
- B、 肾脏
- C、 肺
- D、 肝脏
- E、 心脏

答案：D

10、50KG 正常成人的血液总量有 ()

- A、 2000~2500ml
- B、 2500~3000ml
- C、 3000~3500ml
- D、 3500~4000ml

E、4000~5000ml

答案：D

11、采集血气分析标本的方法，下列哪项不正确（ ）

- A、选用 2ml 干燥注射器
- B、先抽少许经过稀释的肝素充盈针筒
- C、在严格无菌操作下抽动脉血 2ml 左右
- D、拔出针头后立即送检
- E、抽血后立即用软木塞封闭针头

答案：D

12、关于急诊科的布局，下列哪项不正确（ ）

- A、 尽量远离住院部
- B、 有独立的出入口通道
- C、 分诊室设立在入口明显位置
- D、 清创室与抢救室. 外科诊室相邻
- E、 抢救室靠近急诊科的进口处

答案：A

13、发生食物中毒的单位和接收病人进行治疗的单位，除采取抢救措施外，还应向什么机构报告（ ）

- A、 向上级领导报告；
- B、 向当地政府报告；
- C、 及时向所在地卫生行政部门报告。

答案：C

14、患者男性，80 岁，因突发心前区疼痛、疼痛难忍，并伴有胸闷、憋气，来医院就诊。患者既往有糖尿病史 10 年、胃溃疡 15 年、吸烟 60 年。经检查医生诊断为广泛前壁心肌梗死，入院后有心律失常，病情不稳定。（ ）急性心肌梗死患者预示室颤发生的心律失常是

- A、心房颤动
- B、室性心动过速
- C、室上性心动过速
- D、室性期前收缩
- E、三度房室传导阻滞

答案：B

15、诊断颅内压增高的主要依据是（ ）

- A、 头痛
- B、 呕吐

- C、 复视
- D、 视乳头水肿

答案： D

16、 下列疾病不易引起产后出血的是()

- A、 羊水过多
- B、 妊娠高血压疾病
- C、 前置胎盘
- D、 双胎妊娠
- E、 过期妊娠

答案： E

17、 脑出血的院前急救中， 下列哪项措施是错误的()

- A、 平稳搬运患者， 以免加重出血
- B、 快速充分补液， 以加强脑灌注压， 保证脑细胞氧供应
- C、 头位抬高 15~30°
- D、 注意保持呼吸道通畅， 及时吸出呼吸道分泌物
- E、 呕吐时将头偏向一侧， 防止呕吐物吸入气道

答案： C

18、 骨盆骨折后膀胱破裂最好的检查是()

- A、 液体排出量低于液体入量
- B、 膀胱镜检
- C、 静脉尿路造影
- D、 血尿
- E、 膀胱造影

答案： E

19、 心肌梗死相关动脉为后降支时心电图改变的导联是()

- A、 V1—V2
- B、 V3—V4
- C、 V5—V6
- D、 I， aVL
- E、 II， III， aVF

答案： E

20、 治疗休克的首要措施是 ()

- A、 补充血容量
- B、 去除引起休克的病因
- C、 应用血管收缩剂进行升压

D、应用皮质类固醇激素

E、纠正酸中毒

答案：A

21、II 型呼吸衰竭可给予吸入的氧浓度是()

A、 $<30\% \sim 35\%$

B、 $<50\%$

C、 $>50\%$

D、 $35\% \sim 40\%$

答案：A

22、心肺复苏时急救者在电击后应()

A、立即检查心跳或脉搏；

B、先行胸外按压，在 5 组（或者约 2 分钟）心肺复苏后再进行心跳检查；

C、立即进行心电图检查；

D、调节好除颤仪，准备第二次除颤。

答案：B

23、气管切开术的方法包括()()

A、气管切开术

B、经皮气管切开术

C、环甲膜切开术

D、微创气管切开术

E、以上都是

答案：E

24、物体刺入眼睛中, 以下措施中, 急救方法不正确()

A、马上把刺入物拔出

B、用纸杯等物盖在眼睛上, 保护眼睛不受碰触

C、送医院急救, 途中尽量减少震动

答案：A

25、地高辛的常见不良反应是()

A、心律失常、食欲缺乏

B、视力模糊

C、嗜睡、头痛

D、精神抑郁或错乱

E、皮疹

答案：A

26、男性，30岁，胸腹联合伤，第9、10肋骨闭合性骨折，肝破裂，P 110次/分，Bp12.3 / 9.3 kPa(92 / 70mmHg)，Hb 80g / L，最适当的治疗是：
()

- A、吸氧，止痛，输血，观察病情
- B、抗休克，待病情好转后手术
- C、先抗休克2~3H，如不好转，再转手术
- D、抗休克同时开腹手术

答案：D

27、一位伤者触高压电倒下，心跳、呼吸停止，立即首要采取的措施为：
()

- A、立即使伤者脱离高压电区
- B、立即心肺复苏
- C、立即拨打急救专线电话
- D、去叫人一同抢救
- E、立即进行体检

答案：A

28、急性闭角型青光眼在急性发作期哪项不能作为诊断要点()

- A、视力急剧下降
- B、恶心、呕吐
- C、眼压升高、眼球坚硬如石
- D、混合充血、角膜水肿、瞳孔散大
- E、眼底可见明显青光眼眼杯

答案：E

29、院内急会诊要求多长时间内到位()

- A、15分钟
- B、10分钟
- C、5分钟
- D、30分钟

答案：B

30、跌落伤伤势不取决于下列哪个因素_____。()

- A、跌落的高度；
- B、撞击地面的部位；
- C、地面的形态；
- D、跌落者的体重。

答案：D

31、支气管哮喘转送注意事项哪个不正确 ()

- A、 吸氧
- B、 保持静脉通道通畅
- C、 途中严密观察神志、呼吸、血压、心率、心律等变化。
- D、 给予强心药

答案：D

32、脑震荡的诊断依据包括:()

- A、 短暂的昏迷
- B、 明显的近事遗忘
- C、 明确的外伤史
- D、 以上均是

答案：D

33、复苏后病人应严密监测脉搏、心率和血压，一般血压维持在 ()
mmHg ()

- A、 100-120/60-70 mmHg
- B、 80-90/50-60 mmHg
- C、 90-100/60-70 mmHg
- D、 90-100/50-60 mmHg

答案：C

34、关于给药途径，下列哪个说法是正确的_()

- A、 心内注射优于静脉注射
- B、 中心静脉优于外周静脉
- C、 骨内注射剂量是静脉注射的 2~3 倍
- D、 所有的药物均可经支气管给药

答案：B

35、预防中暑最首要的措施是()

- A、 加强高温适应
- B、 注意锻炼，增强体质
- C、 注意饮足量开水
- D、 注意饮足量盐开水
- E、 改善劳动条件

答案：E

36、正常人体温度最高的位置()

- A、 前额
- B、 直肠

- C、 腋下
- D、 口腔
- E、 腹股沟

答案： B

37、处理鼻出血的方法中哪项是错误的()

- A、 轻微出血可采用局部止血法
- B、 凡有较多量的出血均应立即行后鼻孔栓塞
- C、 一时找不到出血点可先行鼻腔填塞
- D、 有明显出血点已不出血者可用冷冻或烧灼止血
- E、 局部止血同时全身可适当应用止血药

答案： B

38、麻醉处方应保存几年()

- A、 5 年；
- B、 3 年；
- C、 2 年

答案： B

39、急性左心衰竭，高度呼吸困难，烦躁不安时首选下列哪项急救措施()

- A、 吸氧
- B、 吗啡皮下注射
- C、 氨茶碱静脉注射
- D、 地西洋肌肉注射
- E、 端坐位，双腿下垂

答案： B

40、下列有关单纯性高热惊厥的描述不正确的是()

- A、 在一次发热疾病中很少连续发作多次
- B、 无神经系统阳性体征
- C、 热退一周后脑电图恢复正常
- D、 预后良好
- E、 转变为癫痫的可能性大

答案： E

41、抢救溺水时，患者的体位应是()

- A、 平卧位
- B、 头高脚低位
- C、 半卧位
- D、 俯卧位

E、侧卧位

答案：D

42、脑复苏采取降温措施，不论病人体温正常或升高，均应将体温降至亚冬眠（）℃或冬眠（）℃水平（）

A、 35℃ 、 33℃

B、 34℃ 、 31℃

C、 35℃ 、 32℃

D、 34℃ 、 32℃

答案：C

43、患者，男性，23岁，踝关节扭伤6小时，局部肿胀、疼痛明显，需进行冷敷，其目的是（）

A、促进末梢循环

B、促进炎症的消散

C、促进炎症的局限

D、减轻局部出血、疼痛

E、使血管扩张，减轻深部组织充血

答案：D

44、骨盆骨折最危险的并发症是（）

A、骨盆腔出血

B、膀胱破裂

C、尿道断裂

D、骶丛神经损伤

E、直肠损伤

答案：A

45、哮喘持续状态是指经一般支气管扩张药治疗后仍有（）

A、大量黏脓痰

B、明显发绀

C、哮喘24小时以上

D、肺不张

E、浅昏迷

答案：C

46、肾脏生成的激素有（）

A、抗利尿激素

B、肾上腺素

C、红细胞生成素

D、去甲肾上腺素

E、醛固酮

答案：C

47、预防氧中毒的关键措施是()

A、控制氧分压

B、加强气道湿化

C、治疗原发病

D、合适的氧疗装置

E、正确控制 FiO_2

答案：E

48、尿毒症病人病情危重的表现是()

A、高血压

B、BUN 升高

C、心包炎

D、贫血

E、骨病

答案：C

49、患者女性，24 岁。因与朋友生气后自服敌敌畏 150ml，因未被及时发现，约近 2 小时才送医院，来急诊科时，患者出现肺水肿、惊厥、昏迷等严重症状，导致抢救无效死亡。有机磷中毒的死亡原因是()

A、肺部感染

B、脑水肿

C、中间综合征

D、心脏骤停

E、呼吸衰竭

答案：E

50、热痉挛出现阵发性、对称性痉挛最常见的部位为()

A、背阔肌

B、咀嚼肌

C、腹直肌

D、腓肠肌

E、胸大肌

答案：D

51、适于采用包扎疗法的烧伤创面是()

A、面颈部浅度烧伤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/358007141041006031>