

## 2024 年贵州省三穗县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题大全附答案（达标题）

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2021 年真题）血培养结果为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，首选的抗菌药物是（）

- A: 头孢唑林
- B: 青霉素 G
- C: 左氧氟沙星
- D: 万古霉素

答案：D

2. 没有镇静和"宿醉"现象，不属于巴比妥类和苯二氮

- A: 佐匹克隆
- B: 异戊巴比妥
- C: 阿普唑仑
- D: 地西洋

答案：A

3. 患者，男，5 岁，体重 25kg，有癫痫病史、青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗。查体和实验室检查：白细胞计数  $15.8 \times 10^9 / L$ ，体温  $39.5^\circ C$ ，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注（说明书规定儿童剂量为一次  $20mg / kg$ ）

- A: 左乙拉西坦
- B: 地西洋

C: 乙琥胺

D: 丙戊酸钠

**答案: D**

4. (2018 年真题) 属于 M 胆碱受体阻断剂的平喘药是 ( )

A: 茶碱

B: 孟鲁司特

C: 噻托溴铵

D: 沙美特罗

**答案: C**

5. 林可霉素类的主要作用靶点是

A: 细胞内膜 PBP

B: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

C: 核糖体的 50S 亚基

D: 核糖体的 30S 亚基

**答案: C**

6. (2015 年真题) 属于超强效的外用糖皮质激素是 ( )。

A: 氢化可的松

B: 卤米松

C: 曲安奈德

D: 地塞米松

**答案: B**

7. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

- A: 妊娠及哺乳期妇女
- B: 腰椎间盘突出
- C: 骨髓功能抑制
- D: 严重心脏病

**答案：B**

8. 下列选项中，除抑制延髓咳嗽中枢外，还可阻断肺-胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射，并具有罂粟样平滑肌解痉作用的药物是()

- A: 右美沙芬
- B: 苯丙哌林
- C: 可待因
- D: 喷托维林

**答案：B**

9. (2016 年真题) 患者，女，26 岁，妊娠 3 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是

- A: 阿莫西林
- B: 青霉素 G
- C: 头孢氨苄
- D: 左氧氟沙星

**答案：D**

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

10. 可干扰细菌 DNA 回旋酶或拓扑异构酶 IV，影响细菌 DNA 合成的药物是

A: 多黏菌素

- B: 替加环素
- C: 环丙沙星
- D: 庆大霉素

**答案: C**

11. 不具有磺酰胺基结构，更容易引起耳毒性的药物是

- A: 呋塞米
- B: 托拉塞米
- C: 布美他尼
- D: 依他尼酸

**答案: D**

12. 乙胺丁醇用于

- A: 10 岁以上儿童及成人
- B: 13 岁以上儿童及成人
- C: 8 岁以上儿童及成人
- D: 6 岁以上儿童及成人

**答案: B**

13. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10/HP，红细胞 3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次/日。

- A: 作用于肠壁的阿片受体，抑制肠蠕动
- B: 修复消化道黏膜
- C: 平衡消化道正常菌群，提高免疫功能
- D: 吸附消化道内气体和各种病原体、毒素

**答案：A**

14. 对多种氨基糖苷类钝化酶稳定的药物是

- A: 链霉素
- B: 妥布霉素
- C: 庆大霉素
- D: 奈替米星

**答案：D**

15. (2021 年真题) 患儿。女，14 岁。因出现尿频、尿急、尿痛症状 2 天就诊，诊断为急性膀胱炎，患儿既往有癫痫病史，宜选用的治疗药物是 ( )。

- A: 阿奇霉素
- B: 环丙沙星
- C: 青霉素 G
- D: 呋喃妥因

**答案：D**

16. 用于治疗疥疮的药物有 ( )

- A: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比萘芬软膏
- B: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏
- C: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏
- D: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏

**答案：B**

17. 不可用于降低眼压的药物是 ( )

- A: 拉坦前列素滴眼剂
- B: 卡替洛尔滴眼剂

C: 毛果芸香碱滴眼液

D: 利福平滴眼剂

**答案：D**

18. 与鲑降钙素合用，有可能急速降血钙，出现严重低钙血症的是

A: 铁剂

B: 钙剂

C: 维生素 D

D: 阿仑膦酸钠

**答案：D**

19. 作用于 DNA 拓扑异构酶 I 的生物碱是

A: 羟喜树碱

B: 甲氨蝶呤

C: 来曲唑

D: 卡莫氟

**答案：A**

20. 属于 M 受体阻断剂的药物是

A: 拉坦前列素

B: 乙酰唑胺

C: 奥布卡因

D: 阿托品

**答案：D**

21. 聚乙二醇干扰素  $\alpha 2a$  可抑制的肝药酶是

A: CYP2C19

B: CYP2D6

C: CYP2C9

D: CYP1A2

**答案：D**

22. 红霉素不是下列哪些疾病的首选药物

A: 空肠弯曲杆菌肠炎

B: 白喉带菌者

C: 骨髓炎

D: 婴幼儿支原体肺炎

**答案：C**

23. 大剂量应用下列哪种维生素时，可使尿胆原呈假阳性

A: 维生素 E

B: 维生素 C

C: 维生素 B1

D: 维生素 B2

**答案：C**

24. 患者，男，70 岁。进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示胃多发性溃疡(A

A: 替米沙坦

B: 胶体果胶铋胶囊

C: 埃索美拉唑钠

D: 美托洛尔

**答案：B**

25.  $\beta$ -溶血性链球菌产生的一种蛋白质，现已有基因重组产品的是()

A: 重组人促红素

- B: 叶酸
- C: 链激酶
- D: 尿激酶

**答案：C**

26. 合并重度感染的糖尿病应使用()

- A: 二甲双胍
- B: 那格列奈
- C: 正规胰岛素
- D: 阿卡波糖

**答案：C**

27. 良性前列腺增生药物治疗的短期目标是

- A: 延缓疾病临床进展
- B: 缓解患者的下尿路症状
- C: 预防急性尿潴留
- D: 缓解患者的上尿路症状

**答案：B**

28. 作用机制是抗代谢的是

- A: 巯嘌呤
- B: 吉非替尼
- C: 枸橼酸他莫昔芬
- D: 紫杉醇

**答案：A**

29. 作用于髓袢升支厚壁段皮质部和远曲小管的利尿剂是

- A: 袢利尿剂

B: 碳酸酐酶抑制剂

C: 醛固酮受体阻断剂

D: 噻嗪类和类噻嗪类利尿剂

**答案：D**

30. (2021 年真题) 属于乙酰胆碱酯酶抑制剂，用于改善脑功能及抗记忆障碍的药物 ( )

A: 多奈哌齐

B: 尼莫地平

C: 吡拉西坦

D: 依达拉奉

**答案：A**

31. 口服吸收差，血药浓度低，仅适用于肠道感染及下尿路感染的是 ( )

A: 甲氧苄啶

B: 磺胺嘧啶

C: 诺氟沙星

D: 呋喃唑酮

**答案：D**

32. 糖尿病和胰腺炎血症患者应慎用的药物是

A: 呋塞米

B: 甘露醇

C: 螺内酯

D: 氢氯噻嗪

**答案：D**

33. 拓扑异构酶抑制剂

- A: 环磷酰胺
- B: 顺铂
- C: 丝裂霉素
- D: 喜树碱类

**答案：D**

34. 长期服用糖皮质激素不会产生下列哪种副作用()

- A: 高血钾
- B: 溃疡或出血穿孔
- C: 满月脸
- D: 肾上腺皮质萎缩

**答案：A**

35. 与多柔比星合用或配伍可增加心脏毒性的药物是()

- A: 利福平
- B:  $\beta$  受体阻断剂
- C: 阿糖胞苷
- D: 甲氨蝶呤

**答案：B**

36. 服用华法林过量可用下列哪种药物对抗

- A: 糜蛋白酶
- B: 维生素 K
- C: 维生素 A
- D: 鱼精蛋白

**答案：B**

37. 仅用于绝经后妇女,不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是()

- A: 阿仑磷酸钠
- B: 雷洛昔芬
- C: 阿法骨化醇
- D: 骨化三醇

**答案：B**

38. (2020 年真题) 曲妥珠单抗的适应证是

- A: 人表皮生长因子受体-2 (HER-2) 过度表达的乳腺癌
- B: 表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性的转移性非小细胞肺癌
- C: 晚期恶性黑色素瘤
- D: 转移性结直肠癌

**答案：A**

39. 氢氯噻嗪的药理作用是

- A: 抑制近曲小管碳酸酐酶活性
- B: 与醛固酮受体结合
- C: 提高血浆渗透性，产生组织脱水作用
- D: 抑制远曲小管  $\text{Na}^+-\text{Cl}^-$ -共转运子的功能

**答案：D**

40. 下列药物除哪项外都属于钙拮抗剂()

- A: 溴苄胺
- B: 地尔硫
- C: 硝苯地平
- D: 维拉帕米

**答案：A**

41. 袢利尿药中，静脉给药维持时间最长的是()

- A: 呋塞米
- B: 依他尼酸
- C: 布美他尼
- D: 托拉塞米

**答案：D**

42. 能与胰岛素竞争血浆蛋白，升高胰岛素血浆浓度的是

- A: 磺胺甲唑
- B: 格列喹酮
- C: 甲状腺素
- D: 普萘洛尔

**答案：A**

43. 可用维生素 B12 治疗的疾病是

- A: 缺铁性贫血
- B: 神经炎
- C: 慢性失血性贫血
- D: 再生障碍性贫血

**答案：B**

44. 属于抗菌增效剂的是

- A: 呋喃唑酮
- B: 磺胺嘧啶
- C: 氧氟沙星
- D: 甲氧苄啶

**答案：D**

45. 绒促性素属于

- A: 促性腺激素释放激素类似物
- B: 短效口服避孕药
- C: 雌激素类
- D: 促性腺激素

**答案：D**

46. 有关痤疮治疗用药注意事项，描述不正确的是()

- A: 对林可霉素磷酸酯凝胶过敏者禁用
- B: 过氧苯甲酰凝胶合用维 A 酸乳膏可加强疗效
- C: 维 A 酸的用药部位要避免强烈的日光照射，宜在晚间睡前应用
- D: 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用在同一时间、同一部位有物理性配伍禁忌

**答案：B**

47. 流行性脑脊髓膜炎首选药是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 磺胺甲
- C: 磺胺米隆
- D: 柳氮磺吡啶

**答案：A**

48. (2020 年真题) 患者，男，66 岁。BMI24kg/m<sup>2</sup>，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次/分。临床诊断为：(1)心绞痛急性发作；(2)心功能不全、心功能 III 级；(3)高血压病 3 级；(4)高脂血症。

- A: 贝那普利、阿托伐他汀等拮抗硝酸甘油的疗效
- B: 硝酸甘油片已经过期
- C: 硝酸甘油片单次剂量不足，次数不足
- D: 硝酸甘油片被吞服，而不是舌下含服

**答案：A**

49. 有关阿莫西林特点的说法正确的是()

- A: 广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效
- B: 口服吸收差，生物利用度小
- C: 对耐药金黄色葡萄球菌有效
- D: 耐酸、耐酶

**答案：A**

50. 以下食物与华法林钠不存在相互作用的是

- A: 红叶苋菜
- B: 菠菜叶
- C: 洋葱
- D: 脱皮黄瓜

**答案：D**

51. 维持和调节腹膜透析液渗透压的主要物质的是

- A: 脂肪乳
- B: 果糖
- C: 葡萄糖
- D: 维生素

**答案：C**

52. 用于散瞳的眼用药物是

- A: 复方托吡卡胺
- B: 噻吗洛尔
- C: 毛果芸香碱
- D: 溴莫尼定

**答案：A**

53. (2021 年真题) 属于 5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂的抗抑郁药物是 ( )

- A: 艾司西酞普兰
- B: 文拉法辛
- C: 马普替林
- D: 吗氯贝胺

**答案：B**

54. 鱼精蛋白可用于救治 ( )。

- A: 华法林过量导致的出血
- B: 肝素过量导致的出血
- C: 吗啡过量导致的呼吸抵制
- D: 异烟肼中毒导致的神经毒性

**答案：B**

55. 能松弛前列腺和膀胱括约肌，很少发生低血压的抗前列腺增生症药为

- A: 特拉唑嗪
- B: 坦洛新
- C: 酚苳明
- D: 乙酰唑胺

**答案：B**

56. 阿片类药物可影响患者驾驶能力属于

- A: 认知障碍
- B: 身体和精神依耐性
- C: 便秘、恶心、镇静功能受损
- D: 尿频、尿急、尿潴留

**答案：A**

57. 氯吡格雷应避免与奥美拉唑联合应用，因为两者竞争共同的肝药酶，该肝药酶是()。

- A: CYP2E1
- B: CYP2C19
- C: CYP286
- D: CYP2D6

**答案：B**

58. 下述关于双八面体蒙脱石的描述，错误的是

- A: 不被胃肠道吸收，不进入血液循环
- B: 具有吸附、收敛的作用
- C: 不良反应少，可用于治疗儿童的急、慢性腹泻
- D: 属于抗动力药

**答案：D**

59. 患者，男，41 岁。有吸烟史，间断少量饮酒。因“嗝气、反酸、上腹部疼痛”就诊。经查，医师诊断为“反流性食管炎”此时应给予治疗的药物是

- A: 雷尼替丁
- B: 东莨菪碱

C: 昂丹司琼

D: 泮托拉唑

**答案: A**

60. 下列从作用机制讲不属于抗血小板药物的是

A: 氯吡格雷

B: 氨甲环酸

C: 噻氯匹定

D: 双嘧达莫

**答案: B**

61. 下述药物可引起药物性鼻炎的是

A: 硼酸甘油滴耳液

B: 酚甘油滴耳液

C: 过氧化氢溶液

D: 麻黄碱

**答案: D**

62. 治疗 MRSA 的首选药物是

A: 青霉素

B: 四环素

C: 林可霉素

D: 万古霉素

**答案: D**

63. 可使磷酸化胆碱酯酶复活的药物

A: 匹鲁卡品

B: 毒扁豆碱

C: 碘解磷定

D: 阿托品

**答案：C**

64. 可单独用于原发性高血压的药物是

A: 甘露醇

B: 呋塞米

C: 氢氯噻嗪

D: 螺内酯

**答案：C**

65. (2021 年真题) 患者，男，48 岁，入院接受结肠癌手术，术后因合并肺部感染，静脉给予头孢哌酮舒巴坦钠治疗 6 天，观察到手术切口和静脉输液穿刺部位有少量渗血，实验室检验结果显示凝血功能异常。针对此症状，宜选用的治疗药物是 ( )

A: 重组人促红素

B: 维生素 K1

C: 维生素 B12

D: 重组链激酶

**答案：B**

66. 宜选用塞来昔布治疗的疾病是

A: 支气管哮喘

B: 痛风

C: 骨关节炎

D: 胃溃疡

**答案：C**

67. 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是()

- A: 普通胰岛素注射液
- B: 甘精胰岛素注射液
- C: 预混胰岛素注射液
- D: 精蛋白锌胰岛素注射液

**答案: A**

68. 通过抑制 5-HT 和去甲肾上腺素 (NA) 再摄取，增加突触间隙 5-HT 和 NA 浓度从而增强中枢 5-HT 和 NA 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 舍曲林
- B: 吗氯贝胺
- C: 阿米替林
- D: 度洛西汀

**答案: D**

69. 高钠血症是指

- A: 血钠 $>140\text{mmol/L}$
- B: 血钠 $>145\text{mmol/L}$
- C: 血钠 $>135\text{mmol/L}$
- D: 血钠 $>130\text{mmol/L}$

**答案: B**

70. 神经垂体功能不足引起的中枢性尿崩症具有良好抑制作用的药物是

- A: 醋酸去氨加压素
- B: 促性腺激素
- C: 催乳素
- D: 促肾上腺皮质激素

**答案：A**

71. 对甲硝唑无效或禁忌的肠外阿米巴病患者可选用

- A: 替硝唑
- B: 喹碘方
- C: 依米丁
- D: 氯喹

**答案：D**

72. 可引起出血性膀胱炎的抗肿瘤药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 氟尿嘧啶
- C: 环磷酰胺
- D: 多柔比星

**答案：C**

73. 属于留钾利尿药的是

- A: 布美他尼
- B: 托拉塞米
- C: 依他尼酸
- D: 依普利酮

**答案：D**

74. 下述保肝药中属于解毒类的是()

- A: 硫普罗宁
- B: 甘草酸二铵
- C: 多烯磷脂酰胆碱
- D: 复方甘草酸苷

**答案：A**

75. 止泻药()

- A: 硫酸镁
- B: 地芬诺酯
- C: 乳果糖
- D: 甘油

**答案：B**

76. 下列关于低镁血症的描述，错误的是

- A: 质子泵抑制剂可使镁的排泄增加
- B: 抗菌药物可增加镁的排泄
- C: 质子泵抑制剂可使镁的排泄减少
- D: 长期应用胰岛素，可引起镁向细胞内转移而导致低镁血症

**答案：C**

77. 易发生持续干咳不良反应的药品是

- A: 福辛普利
- B: 硝苯地平
- C: 硝酸甘油
- D: 氢氯噻嗪

**答案：A**

78. 右旋体是产生神经毒性的主要根源，故开发其左旋体，用于治疗敏感厌氧菌引起的多种感染性疾病的药物是

- A: 奥硝唑
- B: 替硝唑
- C: 多黏菌素

D: 甲硝唑

**答案: A**

79. 对地高辛中毒出现心动过缓者可静脉注射

A: 阿托品

B: 氯化钾、葡萄糖注射液

C: 苯妥英钠

D: 利尿剂

**答案: A**

80. 可抑制细菌  $\beta$ -内酰胺酶的是 ( )。

A: 磷霉素

B: 替考拉宁

C: 利福平

D: 舒巴坦

**答案: D**

81. (2016 年真题) 可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药品是

A: 硫酸镁

B: 乳酸钠

C: 氯化钾

D: 谷氨酸

**答案: B**

82. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

A: 驱钩虫+亚叶酸钙

B: 驱钩虫+注射右旋糖酐铁

C: 输血+注射右旋糖酐铁

D: 驱钩虫+口服铁剂

**答案：D**

83. 可使前者作用加强或延长的是

A: 维生素 C

B: 氯丙嗪

C: 红霉素

D: 他莫昔芬

**答案：B**

84. 能竞争 DNA 聚合酶的抗病毒药是

A: 碘苷

B: 阿昔洛韦

C: 利巴韦林

D: 拉米夫定

**答案：B**

85. (2018 年真题) 过度使用, 会导致大量的中间代谢产物 N-乙酰对苯醌亚胺堆积, 引起严重肝毒性的药物是 ( )

A: 塞来昔布

B: 阿司匹林

C: 双氯芬酸

D: 对乙酰氨基酚

**答案：D**

86. 分泌氮皮质激素的是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

A: 束状带和网装带

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/358060123043007022>