

2024 年安徽省鸠江区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题王牌题库附答案（预热题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 将药物治疗成本和所产生的效益归化为以货币为单位的数字，从而进行药物经济学评价，这一评价方法属于

- A: 成本-效用分析
- B: 成本-效益分析
- C: 最小成本分析
- D: 成本-效果分析

答案：B

2. 根据病原体、传播和症状的不同分为上呼吸道感染(上感)和流行性感冒(流感)。上感和流感在一年四季均可发病，尤以冬、春季较为多见。

- A: 严重高血压
- B: 急性胰腺炎
- C: 慢性荨麻疹
- D: 急性尿潴留

答案：D

3. 患者，女，53 岁，既往有痛风史，长期坚持服药控制。近日因高血压就诊，该患者禁用的药物是

- A: 洛伐他汀
- B: 氢氯噻嗪

C: 卡托普利

D: 普萘洛尔

答案：B

4. (2018 年真题) 患者, 女, 21 岁, 近半年来食欲亢进, 多汗体重明显减轻, 伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤, 心率 104 次/分, 化验结果: 血清促甲状腺素 (TSH) $<0.1\text{mU/L}$, FT3、FT4 明显升高, 肝肾功能基本正常, 白细胞计数正常, 诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是 ()

A: 注意休息补充营养, 使用甲巯咪唑治疗

B: 碘化钾治疗, 定期复查

C: 选用 ^{131}I 治疗

D: 甲状腺次全切除手术

答案：A

5. 苯二氮

A: 阿戈美拉汀

B: 米氮平

C: 艾司唑仑

D: 唑吡坦

答案：C

6. 处方正文书写的内容是

A: 医师签名

B: 药师签名

C: 药品通用名

D: 患者姓名

答案：C

7. 治疗病毒性腹泻宜选用的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 泛昔洛韦
- C: 双歧杆菌
- D: 山莨菪碱

答案：B

8. 主要不良反应有高血压、肝肾毒性的 DMARDs 是

- A: 利妥昔单抗
- B: 硫唑嘌呤
- C: 环孢素
- D: 氯喹

答案：C

9. 静脉滴注青霉素的适宜溶媒是

- A: 0.9%氯化钠注射液
- B: 复方氯化钠注射液
- C: 5%葡萄糖注射液
- D: 50%葡萄糖注射液

答案：A

10. 急性肾盂肾炎常见

- A: 蜡样管型
- B: 颗粒管型、透明管型
- C: 细胞管型
- D: 白细胞管型

答案：D

11. 属于 B 级高危药品的是

- A: 50%葡萄糖注射液
- B: 血液透析液
- C: 全胃肠外营养液
- D: 5%葡萄糖注射液

答案：C

12. 患者男,60 岁,诊断为高血压伴高尿酸血症,首选的药物是()

- A: 氯沙坦
- B: 螺内酯
- C: 美托洛尔
- D: 维拉帕米

答案：A

13. 某患者，女，27 岁，多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁 3 个月。血 FT

- A: 左旋咪唑
- B: 碳酸锂
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 碘化钾

答案：C

14. 治疗真菌性阴道炎首选的非处方药是

- A: 甲硝唑栓
- B: 硝酸咪康唑栓
- C: 克霉唑栓
- D: 聚甲酚磺醛栓

答案：B

15.（2019 年真题）患者，男，34 岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物昏迷入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制，可选用的解救药物是

- A: 亚甲蓝
- B: 维生素 K
- C: 纳洛酮
- D: 二巯丙醇

答案：C

16. 处方是医院药品消耗及药品经济收入结账的凭证和原始依据，体现其

- A: 有效性
- B: 技术性
- C: 法律性
- D: 经济性

答案：D

17. 可以导致中性粒细胞减少的药物是

- A: 甲巯咪唑
- B: 辛伐他汀
- C: 头孢氨苄
- D: 对乙酰氨基酚

答案：A

18. 肿瘤患者在化疗后出现痛性黏膜炎，可对症给予

- A: 吗啡

B: 苯海拉明—利多卡因—氢氧化镁铝

C: 劳拉西泮

D: 醋酸甲地孕酮—地塞米松

答案：B

19. 患者，女，实验室检查：血红蛋白 95g/L，临床诊断为缺铁性贫血，处方口服硫酸亚铁片，下列想患者交代的用药注意事项，错误的是：

A: 宜空腹服用

B: 宜同时补充维生素 C

C: 不宜与铝剂同时服用

D: 不宜同时进食牛奶和蛋类

答案：A

20. 隔日一次的外文缩写

A: tid

B: q4h

C: qn

D: qod

答案：D

21. 糖化血红蛋白检查结果可显示糖尿病患者过去 3~4 周的血糖水平，正常值为

A: 48%~60%

B: 4%~6%

C: 5.0%~8.0%

D: 3.8%~4.0%

答案：C

22. 属于质子泵抑制剂的是（）

- A: 铝碳酸镁
- B: 埃索美拉唑
- C: 法莫替丁
- D: 多潘立酮

答案：B

23. 可引起药源性肾脏疾病的药物是

- A: 含有马兜铃酸的中药
- B: 异烟肼
- C: 吡罗昔康
- D: 三环类抗抑郁药

答案：A

24. 属于时间依赖性抗菌药，且抗菌作用持续时间长，评估此类药物的 PK / PD 参数主要为 $AUC_{0\sim 24} / MIC$ ，一般推荐日剂量分 2 次给药方案的药物是

- A: 氨茶碱
- B: 头孢克洛
- C: 利奈唑胺
- D: 左氧氟沙星

答案：C

25. 患者，男，55 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，医师建议首先改变生活方式（控制饮食等）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀 20mg/d 治疗。

- A: 40mg
- B: 60mg

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 80mg

D: 20mg

答案：C

26. 提供的药物信息和建议是否均来自受过专门药学培训的人员

A: 归因性

B: 权威性

C: 合理性

D: 新颖性

答案：B

27. 容易引起肌酸激酶升高的药物是

A: 红霉素

B: 洛伐他汀

C: 奥美拉唑

D: 青霉素

答案：B

28. 可能导致血清总胆固醇升高的药物是

A: 苯妥英钠

B: 胰岛素

C: 阿司匹林

D: 氯氮平

答案：D

29. 中成药血脂康中含有的化学成分是

A: 阿托伐他汀

B: 辛伐他汀

C: 洛伐他汀

D: 依折麦布

答案: C

30. (2019 年真题) 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1，主诉夜间咳嗽、咽部有异物感，平躺时常有反酸、烧心、胸痛伴背痛，自用止咳糖浆无效。查体:咽红，听诊双肺未闻及干湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史:高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，血压控制在 140/85mmHg 左右，高脂血症 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

A: 布地奈德吸入剂

B: 单硝酸异山梨酯缓释片

C: 奥美拉唑肠溶胶囊

D: 多潘立酮片

答案: C

31. 中度药品不良反应是指

A: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

B: 没有临床症状，无须治疗

C: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

D: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无须治疗

答案: C

32. 血栓性疾病患者的凝血酶原时间可能短于

A: 16 秒

B: 10 秒

C: 18 秒

D: 12 秒

答案: D

33. 控制癫痫持续状态应入院后首选（）

- A: 口服硫酸镁
- B: 肌肉注射地西洋
- C: 静脉注射地西洋
- D: 静脉注射丙戊酸钠

答案：C

34. 肝肾两种途径清除的药物在严重肝功能减退时血药浓度升高

- A: 须谨慎使用，必要时减量给药
- B: 尽可能避免使用
- C: 一般无须调整剂量
- D: 必须减量应用

答案：D

35. 一位巨幼细胞性贫血患儿肌肉注射维生素 B

- A: 0.049~0.20ml
- B: 0.15~0.30ml
- C: 0.05~0.10ml
- D: 0.25~0.40ml

答案：C

36. 一般高血压患者服用降压药，建议控制在

- A: <140 / 80mmHg
- B: <140 / 90mmHg
- C: <130 / 80mmHg
- D: <120 / 80mmHg

答案：B

37. 根据 TDM 结果调整给药方案的方法不包括

- A: 重复一点法
- B: 稳态一点法
- C: 一点法
- D: 计分推算法

答案: D

38. 与成人相比，2 岁以下小儿对酸不稳定、弱碱性药物的吸收增加，其机制是

- A: 体液及细胞外液容量大
- B: 胃排空快
- C: 肝脏的相对重量约为成人的 2 倍
- D: 胃酸分泌少

答案: D

39. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

- A: 阿司匹林肠溶片应整片服用，不能嚼碎
- B: 氨氯地平片可于早上服用
- C: 阿司匹林肠溶片必须于晚上在餐后服用
- D: 若需减量，美托洛尔缓释片可掰开服用

答案: D

40. 血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的 8%~9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下，血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

A: 单核细胞

B: 嗜碱性粒细胞

C: 中性粒细胞

D: 淋巴细胞

答案：B

41. 女性，59 岁，间断咳嗽、咳痰 5 年，加重伴咯血 2 个月。患者表现为低热、乏力、食欲减退、咳白色黏痰、体重逐渐下降。

A: 异烟肼？

B: 青霉素？

C: 布地奈德？

D: 特布他林？

答案：A

42. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热(39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

A: 感染性腹泻

B: 动力性腹泻

C: 消化不良性腹泻

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

D: 分泌性腹泻

答案：A

43. 吸烟后易出现头晕、嗜睡、疲乏等不良反应的药物是

- A: 氯丙嗪
- B: 西咪替丁
- C: 呋塞米
- D: 胰岛素

答案：A

44. 弥漫性青铜色色素沉着

- A: 博来霉素
- B: 氟尿嘧啶
- C: 柔红霉素
- D: 白消安

答案：D

45. 可引起局部组织萎缩

- A: 甲硝唑含漱制剂
- B: 地塞米松粘贴片
- C: 硼酸甘油
- D: 氯己定

答案：B

46. 癌症患者出现突发性刺痛、戳痛时，可选用

- A: 加巴喷丁
- B: 布洛芬混悬液
- C: 丁溴东莨菪碱片
- D: 芬太尼注射剂

答案：A

47. (2018 年真题) 患儿, 14 岁, 体重 50kg, 体温 38.7℃, 使用布洛芬退热。单次给药剂量是 ()

- A: 300~600mg
- B: 500~1000mg
- C: 10~15mg
- D: 200~400mg

答案: D

48. 患者, 女, 27 岁, 妊娠 5 个月, 确诊为单纯性外阴阴道假丝酵母菌病, 首选用药方案是

- A: 咪康唑栓, 阴道给药, 每晚 1 粒 (200mg), 连用 7 日
- B: 口服甲硝唑 400mg, 每日 2 次, 连服 7 日
- C: 甲硝唑阴道栓 (片) 200mg, 阴道用药, 每晚 1 次, 连用 7 日
- D: 1: 2 服克林霉素 300mg, 每日 2 次, 连用 7 日

答案: A

49. 可引起视物模糊、辨色困难的药物是

- A: 阿米洛利
- B: 氯苯那敏
- C: 东莨菪碱
- D: 右美沙芬

答案: C

50. 据统计, 妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达 80% 左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则, 以确保胎儿及乳儿的安全。

- A: 洛伐他汀
- B: 阿昔洛韦

C: 氯霉素

D: 氯化钾

答案: A

51. 患者,女,49岁,近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊,临床诊断为下呼吸道细菌性感染,处方如下:

A: 维生素C片用法用量不合理

B: 氨溴索片给药剂量不合理

C: 阿司匹林泡腾片给药剂量不合理

D: 左氧氟沙星片给药间隔不合理

答案: D

52. 患者,男,72岁,因“冠心病、高血压、2型糖尿病”长期用药治疗,服用药物包括阿司匹林肠溶片、马来酸依那普利片、辛伐他汀片、富马酸比索洛尔片、盐酸二甲双胍缓释片、格列美脲片、硝酸甘油片。近日患者出现一些药物不良反应症状,前来药店咨询药师。

A: 辛伐他汀

B: 富马酸比索洛尔

C: 阿司匹林

D: 盐酸二甲双胍

答案: C

53. 患者,女,58岁,既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。目前体检:身高160cm,体重70kg。实验室检查:白细胞 $8.0 \times 10^9 / L$, 红细胞 $4.0 \times 10^{12} / L$, 总胆红素 $11 \mu mol / L$, 总胆固醇 $6.0 mmol / L$, 空腹血糖 $7.6 mmol / L$ 。

A: 辛伐他汀

B: 格列齐特

C: 二甲双胍

D: 非诺贝特

答案: C

54. 可引起粪便红细胞增多的是

A: 阻塞性黄疸

B: 溶血性黄疸

C: 细菌性痢疾

D: 急性胰腺炎

答案: C

55. 可导致嗜酸性粒细胞升高及维生素 K 减少的抗菌药物是

A: 头孢哌酮

B: 头孢唑林

C: 美罗培南

D: 青霉素

答案: A

56. 药物对妊娠的危险性分级中属于 X 级的是

A: 阿卡波糖

B: 链霉素

C: 甲氨蝶呤

D: 奥美拉唑

答案: C

57. 患者，女，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190 / 110mmHg，R30 次 / 分，P108 次 / 分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 肺动脉栓塞
- B: 支气管哮喘
- C: 急性左心衰竭
- D: 慢性支气管炎急性发作

答案：C

58. 脑梗死的治疗药物，抗凝治疗

- A: 阿司匹林
- B: 甘露醇
- C: 普通肝素
- D: 阿替普酶

答案：C

59. 以下对“发热指标”的叙述中，不正确的是

- A: 直肠温度超过 37.6℃
- B: 腋下温度超过 36.6℃
- C: 腋下温度超过 37.0℃
- D: 口腔温度超过 37.3℃

答案：B

60. 1 类手术切口应用第三代头孢菌素，应评判为

- A: 有禁忌证用药
- B: 过度治疗用药
- C: 联合用药不适宜

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

D: 无适应证用药

答案：D

61. 依据“处方”的含义及其重要意义，属于处方范畴的医疗文书是

- A: 药品出库单
- B: 病区用药医嘱单
- C: 病区领药单
- D: 临床诊断书

答案：B

62. 医学检查发现柏油样黑便并有光泽，通常见于

- A: 胃溃疡
- B: 直肠息肉
- C: 肛裂
- D: 痔疮

答案：A

63. 速效胰岛素的作用峰时为()。

- A: 0.6~1.5 小时
- B: 6~12 小时
- C: 0.25~0.5 小时
- D: 1.5~4 小时

答案：A

64. 治疗胆囊炎的药物需选用

- A: 消炎利胆片
- B: H₂ 受体阻断剂
- C: 质子泵抑制剂
- D: M 受体激动剂

答案：A

65. 具有耳毒性、肾毒性的抗结核药是

- A: 利福平
- B: 乙胺丁醇
- C: 异烟肼
- D: 链霉素

答案：D

66. 慢性功能性便秘

- A: 羧甲基纤维素钠
- B: 开塞露
- C: 比沙可啶
- D: 乳果糖

答案：D

67. 用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发 ADR 的药品不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；ADR 因果关系可评价为

- A: 可能无关
- B: 可能
- C: 很可能
- D: 待评价

答案：B

68. 香豆素类抗凝血药

- A: 氯吡格雷
- B: 肝素
- C: 华法林

D: 利伐沙班

答案: C

69. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排除毒物的同时，应积极使用特效拮抗剂。

A: 青霉胺

B: 依地酸钙钠

C: 二巯丁二钠

D: 二巯丙醇

答案: D

70. 可提示肝内或肝后胆管梗阻者的是

A: A/G 值低于 1

B: 丙氨酸氨基转移酶升幅很高

C: γ -谷氨酰转移酶升高

D: 血清碱性磷酸酶升高

答案: C

71. 长期应用氨基糖苷类抗生素，应定期检查器官功能，以防出现

A: 视力障碍

B: 智力障碍

C: 味觉障碍

D: 听力障碍

答案: D

72. 核苷酸类逆转录酶抑制剂

A: 齐多夫定

B: 依非韦伦

C: 利巴韦林

D: 利托那韦

答案: A

73. 早晨因咳嗽和打喷嚏引起的头痛，提示可能是

A: 脑肿瘤

B: 动脉瘤

C: 脑膜炎

D: 脑血管意外

答案: A

74. 通过重整患者的医嘱或药疗方案，评估药物治疗的有效性、安全性和经济性，核查患者的用药依从性，属于

A: 处方审核

B: 药学干预

C: 药物利用研究和评价

D: 药物治疗管理

答案: D

75. 洋地黄中毒引起的快速性心律失常，首选下列哪种药物

A: 普鲁卡因胺

B: 普萘洛尔

C: 苯妥英钠

D: 阿托品

答案: C

76. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的药物是

A: 辛伐他汀

- B: 甲基多巴
- C: 非诺贝特
- D: 依折麦布

答案：A

77. 静脉滴注阿昔洛韦的适宜溶媒是

- A: 复方氯化钠注射液
- B: 5%葡萄糖注射液
- C: 0.9%氯化钠注射液
- D: 50%葡萄糖注射液

答案：C

78. 从事药学服务的药师应具备较好的投诉应对能力。正确妥善地应对投诉的重要意义是

- A: 增进患者对药师工作的信任
- B: 使患者获得有关用药的指导
- C: 警惕与防范用药错误
- D: 提高用药顺应性

答案：A

79. 服药期间饮酒可引起低血糖反应的是

- A: 格列本脲
- B: 西咪替丁
- C: 硫酸亚铁
- D: 泼尼松

答案：A

80. 并不存在风险，目前不需采取措施；评判为

- A: 确认
- B: 验证
- C: 驳倒
- D: 待验证

答案：C

81. 第二代抗组胺药氯雷他定治疗过敏性鼻炎的用法、用量是

- A: 一次 10mg，每日 1 次
- B: 一次 4mg，每日 1 次
- C: 一次 2mg，每日 3 次
- D: 一次 4mg，每日 3 次

答案：A

82. 与阿莫西林配伍，可提高治疗的是()

- A: 苄丝肼
- B: 奥美拉唑
- C: 叶酸
- D: 克拉维酸钾

答案：D

83. 可透过胎盘屏障，可能引起胎儿甲状腺肿大及功能减退，在分娩时造成难产、窒息的药物是

- A: 苯海拉明
- B: 左甲状腺素
- C: 双氯芬酸
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：D

84. 下列“给药时间是依据生物钟规律而设定”的叙述中，最正确的是

- A: 清晨使用糖皮质激素？
- B: 餐后服用非甾体类抗炎药？
- C: 餐前服用氢氧化铝凝胶？
- D: 清晨服用驱虫药？

答案：A

85. 药名容易混淆的药物识别，安定 / 地西洋

- A: 退热药
- B: 抗心绞痛药
- C: 抗焦虑药
- D: 抗高血压药

答案：C

86. 早餐前半小时服用的药物是（）

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 雷贝拉唑
- C: 吉法酯
- D: 瑞巴派特

答案：B

87. 患者，男，49 岁，近 1 个月出现血压升高，BP155/95mmHg，同时伴有高尿酸血症，血尿酸 508 $\mu\text{mol/L}$ 。使用别嘌醇 100mgbid，氯沙坦钾 50mgqd，碳酸氢钠 1gtid 治疗。关于该患者用药指导的说法，正确的是（）

- A: 严格限制蛋白质的摄入，每天不超过 0.6g/kg
- B: 氯沙坦钾可引起血尿酸升高

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 关节疼痛时可选用贝诺酯止痛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/358130132045007022>