

角膜病、白内障、青光眼练习题

1.下列最易引起前房积脓的疾病是（） [单选题]

- A.角膜内皮炎
- B. 基质型角膜炎
- C.慢性泪囊炎
- D.匍行性角膜炎(正确答案)
- E.细菌性结膜炎

2.单纯疱疹病毒性角膜炎的特征是（） [单选题]

- A.角膜有植物外伤史
- B.角膜病灶可表现为树枝状、地图状(正确答案)
- C.脓性分泌物多
- D.角膜病灶可见“伪足”或“卫星样”
- E.以上都是

3.下列滴眼液滴眼时,强调要压迫泪囊区 3-5 分钟的为（） [单选题]

- A.1%阿托品滴眼液(正确答案)
- B.2%林可霉素滴眼液
- C.2.5%那他霉素
- D,0.5% 泼尼松滴眼液
- E.0.3%氧氟沙星滴眼液

4.细菌性角膜炎治疗的关键是（） [单选题]

- A.抗生素滴眼剂频繁滴眼(正确答案)
- B.热敷眼部
- C.口服大量维生素
- D.散瞳

E.治疗性角膜移植

5.单纯疱疹病毒性角膜炎是因为病毒通常侵犯哪对脑神经而引起复发感染（） [单选题]

A.动眼神经

B.滑车神经

C.外展神经

D.三叉神经(正确答案)

E.视神经

6.治疗单纯疱疹病毒性角膜炎,下列药物无效的为（） [单选题]

A.阿昔洛韦

B.更昔洛韦

C.干扰素

D.磺胺类药(正确答案)

E.三氟胸腺嘧啶核苷

7.不正确佩戴角膜接触镜所引起最严重的并发症是（） [单选题]

A.角膜新生血管

B.角膜上皮点状脱落

C.感染性角膜炎(正确答案)

D.结膜过敏

E.以上都不是

8.治疗真菌性角膜溃疡应首选（） [单选题]

A.无环鸟苷

B.庆大霉素

C.多黏菌素

D.两性霉素 B(正确答案)

E.利福

9.角膜溃疡应用 1%阿托品散瞳治疗是为了（） [单选题]

A、迅速控制感染

B、保护溃疡面

C、预防虹睫粘连(正确答案)

D、预防穿孔

E、以上均不是

10.角膜异物剔除后,患者眼痛、视力下降,结膜混合充血,角膜表面有黄白色病灶,前房积脓 1mm,最可能的诊断是（） [单选题]

A 匍行性角膜溃疡

B 蚕蚀性角膜溃疡

C 铜绿假单胞菌性角膜溃疡(正确答案)

D 真菌性角膜溃疡

E 病毒性角膜溃疡

11.年龄相关性白内障患者的最主要护理诊断是（） [单选题]

A.潜在并发症

B.焦虑

C.感知紊乱(正确答案)

D.自理缺陷

E.疼痛

12.患者女性,50 岁,参加晚宴回来凌晨出现眼胀痛,伴偏头痛,礼物模糊 5 个钟来诊。该患者最可能的诊断是（） [单选题]

A.急性闭角青光眼(正确答案)

- B.年龄相关性白内障
- C.角膜
- D.眼外伤
- E.视网膜动脉阻塞

13.角膜染色法主要用于判断（） [单选题]

- A.角膜的知觉
- B.角膜曲率
- C.角膜的透明度
- D.角膜上皮有无缺损或溃疡(正确答案)
- E.有无角膜后沉着物

14.可诱发急性闭角性青光眼的是（） [单选题]

- A.皮质性白内障初发期
- B.皮质性白内障膨胀期(正确答案)
- C.皮质性白内障成熟期
- D.皮质性白内障过熟期
- E.核性白内障

15.可使房角开放的药物是（） [单选题]

- A.乙酰唑胺
- B.20%甘露醇
- C.0.5%噻吗心安
- D.苏打片
- E.1%毛果芸香碱(正确答案)

16.哪一种感染原因导致的角膜溃疡病情发展最凶险（） [单选题]

- A.葡萄球菌

B.铜绿假单胞菌(正确答案)

C.真菌

D.病毒

E.肺炎球菌

17. 白内障手术前检查包括 () [单选题]

A.血压

B.血糖

C.心电图、胸透和肝功能检查

D.血、尿常规及出、凝血时间检查

E.以上均有(正确答案)

18. 目前较普遍应用的白内障摘除术为 () [单选题]

A.囊内摘除术

B.现代囊外摘除术

C.超声乳化术(正确答案)

D.针吸术

E.针拨术

19. 下列哪项白内障术前准备项目错误 () [单选题]

A.术前滴抗生素眼液

B.视功能检查

C.眼压检查

D.不是所有病人都要泪道冲洗(正确答案)

E.检查有无结膜炎

20.由年龄相关性白内障引起的暂时性近视为 () [单选题]

A、轴性近视

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/365244300033012002>