

# 急诊科考试题及答案

急诊科三基考试试卷及答案

姓名：\_\_\_\_\_ 分数：\_\_\_\_\_

一、选择题：共 25 题，每题 2 分

1.下列哪种情况不属于主动脉夹层、急性心肌梗死、急性左心衰竭、肺梗死？

答案：以上都不是。

2.一名 56 岁女性患者出现持续腹痛、腹胀、呼吸急促等症状，血糖 14.3mmol/l，pao<sub>2</sub> 56mmhg，胸片显示片状阴影，双侧少量胸腔积液。最可能的诊断是：

答案：肺炎。

3.某患者患有高血压近 20 年，近来出现头晕、心悸等症状，hb 75g/l，多次查尿比重为 1.010，心电图示 t 波高丛。其诊断为：

答案：肾性贫血。

4.一名 20 岁女性患者原因不明高热 3 周，突然昏迷、抽搐，凝血酶原时间正常，部分凝血活酶时间不凝。最可能的诊断是：

答案：以上都不是。

5.一名老年病人某日发热、腹泻后，突然昏迷、抽搐，血糖 39.4mmol/l，血钠 155mmol/l，酮体 (-)。最可能的诊断是：

答案：糖尿病酮症酸中毒。

6.一名 38 岁女性患者 2 个月来智力下降、记忆力减退、体重增加 10kg、毛发脱落，血清胆固醇 320mg/dl。最可能的诊断是：

答案：甲状腺机能减退。

7.一名 42 岁女性患者 1 日来发热、腹泻，继之昏迷。血压 80/50mmhg，血糖 2.8mmol/l，血钠 105mmol/l，尿量 30ml/h，便常规为白细胞 5~8 个/hp。最恰当的诊断是：

答案：低血糖。

8.一名 22 岁男性患者在公共汽车上突然出现腹痛，血压 0/0，双肺哮鸣音，四肢与腹部有隆起风团。应按照下列哪一项抢救？

答案：失血性休克。

9.一名 28 岁女性患者在购物时突然跌倒，面色苍白，右下腹痛，血压 80/50mmhg，hb 95g/l，咳嗽时腹痛。应考虑：

答案：宫外孕。

10.一名 61 岁女性患者全身骨痛，血浆总蛋白 143g/l，白蛋白 39g/l。最可能的诊断是：

答案：以上都不是。

1.一组工人出现了餐后 2 小时的头痛、头晕、胸闷、憋气等症状，伴随着口唇黏膜和指甲紫绀。最重要的治疗措施是吸氧、维生素 C、亚甲兰、硫代硫酸钠和高压氧舱。

2.对于一位倒在路旁的老人，经急救人员检查后发现没有反应，紧接着的急救措施应该是开放呼吸道、胸外按压、除颤，而不是口对口呼吸或掐人中。

3.对于一位 20 岁的男性，在肌注青霉素后突然晕倒，血压无法测量，最主要的抢救措施是立即静脉注射肾上腺素、静点地塞米松、间羟胺静脉注射、去甲肾上腺素静脉注射或静脉滴注低分子右旋糖苷。

4.对于一位 83 岁的男性，突然出现憋气，需要端坐，双下肢浮肿，右侧为主。最可能的诊断是急性左心衰竭，而不是主动脉夹层、急性心肌梗死、肺梗死或其他疾病。

5.对于一位患有高血压近 20 年的患者，最近出现头晕、心悸、hb 75g/l，多次尿比重为 1.010，心电图上显示 t 波高丛。其诊断可能是肾性贫血、慢性肾功能不全、高血压、高钾血症或其他疾病。

6.对于一位 56 岁女性，持续腹痛、腹胀、呼吸急促，呼吸 35 次/分，血糖 14.3mmol/l，pao<sub>2</sub>

56mmhg，胸片显示片状阴影，双侧少量胸腔积液。最可能的诊断是肺炎、胸膜炎、阑尾炎穿孔、坏死性胰腺炎或胃穿孔。

7.对于一位呕血量多，有血块，血压仅在 60mmhg 处听到 1 次搏动的病人，其失血量可能是 30%~40%，而不是小于 15%、15%~20%、20%~30%或 40%。

8.对于一位 20 岁女性，出现原因不明的高热 3 周，突然昏迷、抽搐，凝血酶原时间正常，部分凝血活酶时间不凝。最可能的诊断是系统性红斑狼疮、结核性脑膜炎、急性白血病、急性肝坏死或其他疾病。

9.对于一位急性阑尾炎患者，最少见的临床表现是食欲减退，而不是右下腹痛、右下腹压痛、白细胞升高或其他症状。

10.对于一位急性胆囊炎患者，最少见的临床表现是恶心、呕吐，而不是右上腹痛、右上腹或剑突下压痛、B 超发现胆囊炎症及结石或巩膜黄染。

11.对于一位肝硬化患者，突然出现腹痛、发热、便血、休克、腹水迅速增长，脾脏肿大，最可能的诊断是食道静脉曲张破裂出血，而不是原发性肝癌、腹腔感染、门静脉血栓形成或其他疾病。

e 无明显特征

答案：a

2.下列哪一项不是心肺复苏中的基本步骤？

a 开放呼吸道 b 胸外按压 c 口对口呼吸 d 除颤 e 掐人中

答案：e

3.下列哪一项不是急性心肌梗死的常见症状？

a 胸痛 b 气短 c 恶心、呕吐 d 面色苍白 e 头晕

答案：e

4.下列哪一项不是休克的常见症状？

a 面色苍白 b 出汗 c 心慌 d 呼吸急促 e 皮肤湿冷

答案：c

5.下列哪一项不是急性胃炎的常见症状？

a 腹痛 b 恶心、呕吐 c 腹泻 d 食欲不振 e 口干舌燥

答案： e

6.下列哪一项不是急性肠炎的常见症状？

a 腹痛 b 腹泻 c 恶心、呕吐 d 发热 e 口干舌燥

答案： e

7.下列哪一项不是急性胰腺炎的常见症状？

a 腹痛 b 恶心、呕吐 c 发热 d 腹泻 e 黄疸

答案： d

8.下列哪一项不是急性肝炎的常见症状？

a 乏力、乏力 b 食欲减退 c 恶心、呕吐 d 发热 e 腹泻

答案： e

9.下列哪一项不是急性肾炎的常见症状？

a 腰痛 b 发热 c 尿频、尿急 d 血尿 e 腹泻

答案： e

10.下列哪一项不是急性胆囊炎的常见症状？

a 右上腹痛 b 恶心、呕吐 c 发热 d 黄疸 e 腹泻

答案：e

二、填空题：（共 10 空，每空 1 分）

1. 心肺复苏的 ABCDE 原则中，A 代表\_\_\_\_\_，B 代表\_\_\_\_\_，C 代表\_\_\_\_\_，D 代表\_\_\_\_\_，E 代表\_\_\_\_\_。

答案：A 开放呼吸道，B 胸外按压，C 口对口呼吸，D 除颤，E 掐人中。

2. 急性中毒的常见处理方法是\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

答案：洗胃、导泻、解毒。

3. 急性心肌梗死的早期干预措施包括\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

答案：急救车输送、静脉溶栓、冠状动脉介入治疗。

4. 心电图检查是急性心肌梗死的重要诊断手段之一，常见的心电图表现包括 ST 段\_\_\_\_\_、T 波\_\_\_\_\_和 Q 波\_\_\_\_\_。

答案：ST 段抬高、T 波倒置、Q 波出现。

5. 急性胃炎的常见病因包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_  
、\_\_\_\_\_等。

答案：细菌感染、病毒感染、药物刺激。

6. 急性肠炎的常见病因包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_  
、\_\_\_\_\_等。

答案：细菌感染、病毒感染、寄生虫感染。

7. 急性胰腺炎的治疗原则是\_\_\_\_\_，并控制炎症的  
\_\_\_\_\_。

答案：禁食、扩张。

8. 急性肝炎的常见病因包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_  
、\_\_\_\_\_等。

答案：病毒感染、药物中毒、酒精中毒。

9. 急性肾炎的常见病因包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_  
等。

答案：细菌感染、病毒感染。

10. 急性胆囊炎的常见病因包括\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_等。

答案：胆石症、细菌感染。

三、简答题：（共5题，每题8分）

1. 简述心肺复苏的基本步骤及注意事项。

答案：心肺复苏的基本步骤包括 ABCDE 原则，即开放呼吸道、胸外按压、口对口呼吸、除颤和掐人中。在操作过程中需要注意保护患者隐私、确保安全、正确选择呼吸道开放方法、正确掌握胸外按压力度和频率、正确实施口对口呼吸、正确选择除颤方法和掌握掐人中的力度和方法。

2. 急性心肌梗死的诊断标准及处理原则。

答案：急性心肌梗死的诊断标准包括临床症状、心电图、心肌酶学检查等。处理原则包括急救车输送、静脉溶栓、冠状动脉介入治疗、给予抗血小板药、抗凝药等药物治疗，以及注意患者的营养、休息、心理疏导等。

3. 急性中毒的处理原则及方法。

答案：急性中毒的处理原则包括立即停止接触毒物、尽快将毒物排出体外、给予解毒剂等。常用的处理方法包括洗胃、导泻、解毒等。

4. 急性胃炎的治疗原则及注意事项。

答案：急性胃炎的治疗原则包括禁食、给予抗生素、抗酸药和保护胃粘膜的药物等。注意事项包括避免刺激性食物、忌烟酒、保持情绪稳定等。

5. 急性肾炎的病因、临床表现及治疗原则。

答案：急性肾炎的病因包括细菌感染、病毒感染等。临床表现包括腰痛、发热、尿频、尿急、血尿等。治疗原则包括抗感染治疗、对症治疗、饮食调理等。

2.全心衰属于哪一类型紫绀？**a** 中心性紫绀、**b** 周围性紫绀、**c** 混合性紫绀、**d** 以上都不是。

3.劳动后呼吸困难是下列哪种疾病的早期表现？**a** 肺炎、**b** 胸腔积液、**c** 心功能衰竭、**d** 肺梗死。

4.下列哪项是喉头水肿的临床表现？**a** 吸气性呼吸困难、**b** 呼气性呼吸困难、**c** 混合性呼吸困难、**d** 以上都不是。

5.钻顶样腹痛是哪种疾病的特点？**a** 阑尾炎、**b** 胰腺炎、**c** 胆道蛔虫病、**d** 溃疡病。

6.频繁剧烈呕吐后呕血见于？**a** Mallory-Weiss 综合征、**b** 胃溃疡、**c** 食道静脉曲张破裂出血、**d** 胃癌。

7.幽门梗阻的特点？**a** 呕吐胆汁伴胃型、**b** 呕吐宿食伴胃型、**c** 呕吐蛔虫伴肠型、**d** 呕吐物恶臭伴肠型。

8.高热是指体温超过多少摄氏度? a 37°C、b 38.2°C、c 39.1°C、d 41°C。

9.发热 4 日出现皮疹见于? a 水痘、b 猩红热、c 天花、d 麻疹。

10.传染性非典型性肺炎的病原体是? a 肺炎支原体、b 肺炎衣原体、c 军团菌、d。

11.抢救过敏性休克时, 应首先选用? a 多巴胺、b 地塞米松、c 异丙嗪、d 肾上腺素、e 钙剂。

12.院前处理突发昏迷, 首先选择? a 呼叫 120 急送医院、b 行心肺复苏术、c 测量血压、d 检查瞳孔、e 保持呼吸道通畅。

13.一个体重 60kg 的人, 全身总血量约为多少? a4000ml、b4500ml、c4800ml、d5500ml、e6000ml。

14.关于止血带，下列哪项是错误的？**a**止血带前，应先加衬垫、**b**手断离后，止血带应在上臂的中段、**c**每隔40~50，放松2~3次、**d**不要过紧或过松，远端动脉搏动消失即可、**e**标明止血带的时间。

15.对下列哪种胸部损伤的伤员，应优先抢救？**a**胸部挫伤、**b**肋骨骨折、**c**开放性气胸、**d**张力性气胸、**e**闭合性气胸。

16.判断心脏骤停最可靠的指征为？**a**心电图、**b**血压、**c**神志和呼吸、**d**瞳孔、**e**口唇紫绀。

17.开放性骨折的正确处理方法为？**a**必须先将骨的断端还纳后，再止血、包扎、固定、**b**先止血、再固定、最后包扎、**c**立即复位后，再止血、固定、包扎、**d**止血、包扎后、不固定也可以、**e**先止血、再包扎、最后固定。

18.异物插入体内，现场应立即？**a**拔除异物，填塞止血后送往医院、**b**拔除异物，加压包扎止血后送往医院、**c**不拔除异物，采取简单固定包扎措施后送往医院、**d**不要延误，立即将伤员送往医院、**e**以上方法均正确。

19.突然出现夜间阵发性呼吸困难，同时伴有双肺底部可闻及湿性罗音和黄疸，可能是支气管哮喘、急性左心衰竭、肺癌晚期、肺炎等疾病引起的。需要进一步检查以确定病因。

20.在心脏骤停的紧急情况下，首选的药物是肾上腺素。其他可选药物包括利多卡因、多巴胺、阿托品和胺碘酮。需要根据具体情况进行选择。

1.头痛伴随神志障碍可能是高热、颅内出血、脑炎或脑膜炎引起的。

2.血液成分异常导致的晕厥常见原因包括低血糖状态、过度换气综合征、重度贫血和高原性晕厥等。

3.前庭功能检查项目包括眼球震颤电图检查、平衡功能检查和半规管功能检查，以及听力测定。

4.急性胸痛伴低血压休克应考虑急性心肌梗塞、急性肺梗塞、主动脉夹层动脉瘤破裂、急性心脏压塞和张力性气胸等。

5.心悸伴出汗可能是甲状腺功能亢进、低血糖、嗜铬细胞瘤或更年期综合征等引起的。

6.突然出现严重呼吸困难可能是呼吸道异物、高压性自发性气胸、大块肺梗死或 ARDS 等疾病引起的。

8.小儿腹痛常见于肠蛔虫、肠套叠、嵌顿性疝和消化性溃疡等。

9.呕血的常见原因包括消化性溃疡、急性胃粘膜病变、食道静脉曲张破裂出血和胃癌等。

10.成人 Still 病的主要特征包括间歇性高热、皮疹和关节症状、淋巴结、肝脾肿大、白细胞增高和血沉快，以及类风湿因子和抗核抗体均阴性，血培养阳性等。

11.骨折的常见病因包括直接暴力、间接暴力、积累劳损和病理骨折等。

12.局麻药的中毒反应可能是一次用药超过最大剂量、药物误入血管内、注射部位血管丰富或药内未加肾上腺素，以及病人对局麻醉药过敏等原因引起的。

13.进行口对口人工呼吸时，需要使病人头后仰，托起下颌，每分钟吹气 6-8 次，交替进行。

14.烧伤的病程包括体液从血管渗出 6-8 小时最快，36-48 小时渗出达到高峰，48-72 小时转入吸收期，3-7 天后水肿逐渐消退等。

15.胃肠减压的适应症包括胃肠道梗阻、急性胃扩张、腹部手术后严重腹胀和急性胰腺炎等。

1.高血钾症的处理原则包括防治心律失常、降低血清钾浓度、停止钾盐摄入和改善肾功能。

2.低钾血症的临床表现包括软无力、腹胀、血钾浓度低于 3.5mmol/L 和心电图 T 波高而尖。

3.清创术是一种用手术处理新鲜伤口的方法，其原则包括受伤后 6-8 小时内清创者应作一期缝合，面、颈部伤口即使超过 24 小时，清创后应考虑缝合，关节附近或有大血管、神经等暴露的伤口，清创后应缝合，污染严重的伤口，清创后可作延期缝合。

4.临床上心外按压的有效表现包括挤压心脏时大动脉处摸到搏动，口唇由紫绀转为红润，散大的瞳孔开始缩小和收缩压超过 60mmHg。

5.原发性脑损伤指头部外伤时立即发生的脑损伤，临床主要包括脑震荡、脑水肿、脑挫裂伤、脑血肿和脑干损伤。

6.心源性晕厥、脑源性晕厥和血液成分异常所致的晕厥。

7.血液中还原血红蛋白增多和血液中异常血红蛋白增多。

8.持续性腹痛表示炎症、出血或缺血性病变。阵发性绞痛提示空腔脏器痉挛或阻塞性病变，持续性疼痛阵发性加剧多表示梗阻与炎症同时存在。

9.腹腔穿刺物对腹痛鉴别诊断有帮助。如为不凝血，多见于肝、脾、异位妊娠破裂。如为棕红色血液，多见于急性坏死性胰腺炎。若为棕红色伴恶臭，多见于肠坏死。混有食物，多见于胃、十二指肠穿孔。

10.急骤发病迅速出现昏迷，多见于颅脑损伤、脑血管意外、外源性中毒、中暑和某些中枢性神经系统的急性感染。

11.增生活跃。

12.抢救糖尿病酮症酸中毒时，出现重度脱水、休克、呼吸深快和意识障碍时提示病情危重需要抢救。

13.腹膜炎病人可因腹腔内积存消化液、血液、尿液及脓液引起腹膜刺激征，其中以消化液的腹膜刺激最强，血液刺激最弱。

14.桡骨小头半脱位多见于童年，肩部外伤出现方肩的最常见原因是肩关节脱位。

15.心肺复苏时可选用多巴胺和间羟胺等缩血管药。

16.出血提示休克的确切指征是收缩压小于 80mmHg 和心率大于 100 次/分。

17.一般说肌酐浓度在以下，表示内生肌酐清除率大多在正常范围；急性肾衰竭是指肌酐每日上升。

关节脱位、泌尿道肿瘤、周围性紫绀和混合性紫绀都是常见的疾病。胸腔闭式引流时，引流管插入胸腔的深度应为 4-6cm，另一端插入引流瓶水面下的深度应约为 2cm。道阻塞、气道不能被保护、需要高通气是呼吸系统疾病的特征。高血压急症指收缩压大于 20，急性化脓性胆管炎的特征是右上腹疼痛、黄疸和寒颤高热。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/368017042006006061>

