

2025 年执业护士资格考试实践能力第三次阶段测试（附答案）

一、单项选择题（共 100 题，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意）。

1、慢性支气管炎最重要的病因是

- A、过敏
- B、感染
- C、大气污染
- D、寒冷气候
- E、呼吸道防御功能低下

【参考答案】： B

2、一般认为心脏骤停多长时间会出现脑水肿

- A、15 分钟
- B、2 分钟
- C、3 分钟
- D、10 分钟
- E、1 分钟

【参考答案】： C

3、临床死亡的诊断依据是

- A、血压下降，脉搏测不到
- B、呼吸停止，反射性反应消失

- C、呼吸停止，瞳孔散大
- D、呼吸心跳停止，反射性反应消失
- E、脑电波平直

【参考答案】： D

4、佝偻病患儿护理诊断营养不良的依据是

- A、体重减轻
- B、身长不增
- C、多汗、夜惊
- D、肌肉松弛
- E、VD 摄入不足

【参考答案】： E

5、甲状腺术后喉返神经外支损伤可出现

- A、呼吸困难
- B、误咽
- C、音调降低
- D、声音嘶哑
- E、失音

【参考答案】： C

6、戴手套时，下列哪项是正确的

- A、戴手套的手不可触及未戴手套的手
- B、戴手套的手不可触及手套外面

- C、戴手套的手可触及另一只手套的内面
- D、戴手套的手可触及另一只手套的边缘
- E、未戴手套的手不可触及另一只手套的内面

【参考答案】： A

7、正常小儿白细胞分类以中性粒细胞占多数的年龄为

- A、生后 1~4 天及 1~2 岁后
- B、生后 4~6 天及 3~4 岁后
- C、生后 4~6 天及 4~6 岁后
- D、生后 2 周及 7~8 岁后
- E、生后 4~6 周及 12~14 岁后

【参考答案】： C

8、蛛网膜下腔出血最有特征性的体征是

- A、脑膜刺激征
- B、一时性意识障碍
- C、昏迷加深
- D、脉搏与呼吸减慢
- E、大脑强直

【参考答案】： A

9、某甲亢患者，拟行甲状腺全切除术，术前给予碘剂口服。在进行术前健康教育时，对服用碘剂的正确解释是

- A、减少甲状腺血流

- B、抑制甲状腺分泌
- C、抑制甲状腺合成
- D、增加甲状腺球蛋白分解
- E、防止缺碘

【参考答案】： A

10、李某，男性，26岁，腿部外伤后发展为气性坏疽，消毒其换下的敷料的最佳方法是

- A、75%酒精浸泡
- B、燃烧
- C、微波消毒灭菌
- D、高压蒸汽灭菌
- E、煮沸

【参考答案】： B

11、空气栓塞的发生原因不包括

- A、输液时空气未排尽
- B、输液完毕未及时拔除针头
- C、加压输液、输血无人守护
- D、输液管连接不紧密
- E、连续输液添加液体不及时

【参考答案】： B

12、肾后性少尿或无尿是由于

- A、休克
- B、甲状腺功能低下
- C、心力衰竭
- D、肾衰竭
- E、尿路梗死

【参考答案】： E

13、与消化性溃疡发病相关的损害性因素中，占主导的是

- A、幽门螺旋杆菌感染
- B、饮食失调
- C、吸烟
- D、精神因素
- E、胃酸、胃蛋白酶

【参考答案】： E

14、乳房检查最好在

- A、月经来潮时
- B、月经干净后
- C、月经后的 7~10 天
- D、排卵后
- E、下次月经来潮之前

【参考答案】： C

15、患者，女性，因颜面浮肿 3 天而收治入院，查内生肌酐清除率为 $65\text{ml} / \text{min}$ ，可判断其肾功能为

- A、正常
- B、轻度损害
- C、中度损害
- D、重度损害
- E、肾功能衰竭

【参考答案】： B

16、不属于慢性子宫颈炎病理表现的为

- A、子宫颈腺体囊肿
- B、子宫颈息肉
- C、子宫颈肥大
- D、子宫颈糜烂
- E、子宫颈陈旧裂伤

【参考答案】： E

17、长时间用全胃肠外营养，理想的静脉为

- A、上肢静脉
- B、头静脉
- C、大隐静脉
- D、颈外静脉
- E、颈内或锁骨下静脉

【参考答案】： E

18、乳腺淋巴转移的最常见部位是

- A、腋窝
- B、锁骨下
- C、锁骨上
- D、胸骨旁
- E、肝脏部位

【参考答案】： A

19、病人输液过程中，主诉胸部不适，即刻发生呼吸困难，严重紫绀，心前区听诊有响亮持续的水泡音，属于

- A、发热反应
- B、左心衰
- C、过敏反应
- D、急性肺水肿
- E、空气栓塞

【参考答案】： E

20、患者李某，66 岁，因老年慢性支气管炎，痰液黏稠不易咳出，为帮助祛痰，给予氧气雾化吸入，下列操作中，错误的一项是

- A、吸入前嘱病人先漱口
- B、用蒸馏水稀释药液在 5ml 以内
- C、氧流量需 6~8L / min

D、雾化吸入器进气口接氧气，湿化瓶中加入蒸馏水

E、嘱病人呼气时移开出气口

【参考答案】： D

21、骨折与脱位共有的特殊体征是

A、畸形

B、异常活动

C、骨擦音

D、弹性固定

E、关节空虚

【参考答案】： A

22、下列哪项不属于引起充血性心衰的诱发因素

A、呼吸道感染

B、输液过多过快

C、情绪激动

D、摄入钠盐过多

E、重度二尖瓣狭窄

【参考答案】： E

23、患者女，56岁。卵巢癌术后，拔出尿管后7小时未能自行排尿。查体：耻骨上部膨隆，叩诊呈实音，有压痛，考虑尿潴留。为患者提供的护理措施中，维护其自尊的是

A、教育其养成良好的排尿习惯

- B、耐心解释并提供隐蔽的排尿环境
- C、温水冲洗会阴以诱导排尿
- D、按摩其下腹部，使尿液排出
- E、调整体位以协助排尿

【参考答案】： B

24、某妇女，30 岁，孕 7 周，因妊娠剧吐 1 个月而收住院，禁食，给予静脉补液、纠正电解质紊乱，病情仍不见好转，此时应考虑

- A、心理作用
- B、终止妊娠
- C、进一步确诊
- D、保胎治疗
- E、抗生素治疗

【参考答案】： B

25、治疗破伤风的中心环节是

- A、控制痉挛
- B、预防并发症
- C、清除毒素来源
- D、中和游离毒素
- E、保持呼吸道通畅

【参考答案】： A

26、用煮沸方法杀灭物品上一般细菌时，至少需要在水中煮沸至100℃，且持续

- A、15～20 分钟
- B、25～30 分钟
- C、35～40 分钟
- D、45～50 分钟
- E、55～60 分钟

【参考答案】： A

27、关于换药顺序的描述正确的是

- A、先清洁伤口
- B、第二的是沾染伤口
- C、第三的是感染伤口
- D、最后是特异性感染伤口
- E、以上都是

【参考答案】： E

28、羊水过多是指妊娠的任何时期羊水量超过

- A、1000ml
- B、1500ml
- C、2000ml
- D、2500ml
- E、3000ml

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

【参考答案】： C

29、引起心肌炎最常见的病毒是

- A、轮状病毒
- B、脊髓灰质炎病毒
- C、疱疹病毒
- D、柯萨奇病毒 A
- E、柯萨奇病毒 B

【参考答案】： E

30、患者李某，。女性，32岁，体温 39.5℃，遵医嘱行乙醇拭浴时，置热水袋于足部，其目的主要是

- A、防止腹泻
- B、防止脑水肿
- C、防止局部冻伤
- D、避免病人寒战和不适
- E、防止反射性心律失常

【参考答案】： D

31、下列哪种为浅感觉

- A、触觉
- B、运动觉
- C、实体觉
- D、图形觉

E、振动觉

【参考答案】： A

32、麻痹性肠梗阻的疼痛特点是

A、持续性剧痛

B、阵发性绞痛

C、阵发性绞痛向背部放射

D、持续性腹痛加阵发性加剧

E、持续性满腹胀痛

【参考答案】： E

33、申请护士执业注册，应具备“具有完全民事行为能力”条件，申请者年龄至少应在

A、16 周岁以上

B、17 周岁以上

C、18 周岁以上

D、19 周岁以上

E、20 周岁以上

【参考答案】： C

34、人体能量最主要的来源是

A、糖

B、脂肪

C、蛋白质

D、纤维素

E、水

【参考答案】： A

35、患者李某，女性，42岁，乳腺癌根治术后24小时未排尿，下列措施不妥的是

A、行导尿术

B、给予利尿剂

C、热水袋敷下腹部

D、用温水冲洗会阴部

E、提供隐蔽的排尿环境

【参考答案】： B

36、产妇，29岁，第一胎，妊娠合并心脏病，孕37周，阴道侧切分娩一活婴，产后心功能Ⅱ级，在护理措施中，不正确的为

A、产后3天严密观察心衰的表现

B、产后24小时内绝对卧床休息

C、不宜母乳喂养

D、进食富含纤维素食物防便秘

E、至少住院观察2周

【参考答案】： C

37、急性心肌梗死时心律失常大多发生在梗死后

A、12h内

B、24h 内

C、36h 内

D、48h 内

E、72h 内

【参考答案】： B

38、患者，男性，55 岁，因食管癌吞咽困难 2 个月导致高渗性脱水，输液首选的液体是

A、0.9%氯化钠注射液

B、5%葡萄糖注射液

C、10%葡萄糖注射液

D、复方氯化钠注射液

E、葡萄糖氯化钠注射液高渗性脱水时缺水多于缺钠，细胞外液呈高渗状态，5%葡萄糖注射液不含钠，渗透压接近血浆，因此是首选液体。

【参考答案】： B

39、护理营养性巨幼红细胞性贫血，下列哪项措施不妥

A、改善饮食，多吃瘦肉、肝、肾、海产品等

B、尽可能延长母乳喂养时间

C、治疗首选维生素 B12、叶酸

D、恢复期加服铁剂

E、严重病例可同服维生素 C

【参考答案】： B

40、女性患者，23岁，再生障碍性贫血，输血治疗，输血前准备工作哪项不对

- A、取血做血型鉴定及交叉配血试验
- B、从血库取出血后勿剧烈震荡
- C、二人核对供血者和受血者的姓名、血型、交叉配血试验结果
- D、如输血量多，为避免寒冷刺激可予以加温
- E、输血前先滴注少量生理盐水

【参考答案】：D

41、瞳孔缩小可见于

- A、有机磷农药中毒
- B、一氧化碳中毒
- C、阿托品中毒
- D、异烟肼中毒
- E、浓氨水中毒

【参考答案】：A

42、张某，由于输液速度过快，量过多，突然出现呼吸困难，气促，咳嗽，咳出泡沫血性痰，下列急救措施中不妥的是

- A、立即停止输液
- B、20%~30%乙醇湿化吸氧
- C、置左侧卧位和头低足高位
- D、四肢轮流结扎

E、遵医嘱给予强心剂和利尿剂

【参考答案】：C

43、卷轴带用于包扎头顶和残肢端的包扎法是

A、环形

B、蛇形

C、螺旋形

D、8 字形

E、回反形

【参考答案】：E

44、休克早期的表现错误的是

A、烦躁不安

B、面色苍白

C、脉搏细弱

D、血压下降

E、尿量减少

【参考答案】：D

45、对于病人主观资料的记录，正确的是

A、病人希望得到良好的关心和照顾

B、家属希望能为病人提供良好的治疗药物

C、家属说“只要康复，所有治疗建议我们都愿意考虑”

D、病人说“记忆力差，阅读书籍常常读了后 5 行，忘了前 5 行”

E、查体后感到病人精神好，疼痛消失对于病人主观资料的记录应用病人的原话，并加引号。

【参考答案】： D

46、判断卡介苗接种是否成功的方法有

- A、血培养
- B、OT 试验
- C、血沉检查
- D、痰液检查
- E、肺部 X 线检查

【参考答案】： B

47、风湿性心脏病引起心律失常最多见的是

- A、阵发性室上性心动过速
- B、阵发性室性心动过速
- C、房室传导阻滞
- D、心房颤动
- E、心室颤动

【参考答案】： D

48、急性腹膜炎患者，诊断不明时不可

- A、禁食
- B、胃肠减压
- C、半卧位

D、输液维持水电解质平衡

E、用镇痛剂止痛

【参考答案】： E

49、有关风湿热舞蹈病的治疗正确的是

A、青霉胺

B、药物疗效不佳

C、水杨酸盐

D、泼尼松

E、红霉素

【参考答案】： B

50、连台手术时，手术人员不必要的无菌操作步骤是

A、先脱手术衣，后脱手套

B、冲洗手臂，用无菌巾擦干

C、消毒肥皂水刷手一遍

D、75%乙醇泡手 5 分钟

E、穿无菌手术衣，戴无菌手套

【参考答案】： C

51、下列哪项是正常产褥期的表现

A、产后 24 小时体温超过 38℃

B、产后第一天宫底达脐平

C、产后脉搏一般偏快

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/368060114027007023>