

2024 年福建省丰泽区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题完整版 (有一套)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 不应剧烈震动、开启前应充分降温的是

- A: 甘露醇注射剂
- B: 乙醚
- C: 降钙鼻喷雾剂
- D: 重组人促红素

答案: B

2. 长期应用需要监测患者的凝血功能和出血风险，必要时应联合维生素 K、维生素 B 治疗的药物是

- A: 头孢哌酮-舒巴坦注射剂
- B: 口服避孕药
- C: 阿司匹林肠溶片
- D: 肝素钠注射剂

答案: A

3. 环磷酰胺

- A: 出血性膀胱炎
- B: 心脏毒性
- C: 肺纤维化
- D: 溶血性尿毒症

答案: A

4. “从患者安全、环境污染和医务人员职业暴露多角度降低风险”的工作是

- A: 静脉药物配置
- B: 治疗药物监测
- C: 参与临床药物治疗
- D: 处方调剂

答案：A

5. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 腹泻可致电解质丢失，故须特别注意补充
- B: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用
- C: 首选口服补液，必要时静脉补液
- D: 小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用

答案：B

6. (2017 年真题) 慢性阻塞性肺病稳定期患者 (FEV₁<50%) 宜选用的治疗方案是 ()

- A: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素
- B: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素
- C: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂
- D: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药

答案：A

7. (2021 年真题) 患者,女,58 岁,诊断为骨性关节炎,经洛索洛芬单药治疗疼痛缓解不理想可联合使用的药物是 ()

- A: 美洛昔康
- B: 阿司匹林
- C: 曲马多
- D: 双氯芬酸

答案：C

8. 成年人血清中高密度脂蛋白胆固醇含量是

- A: 3.1~5.7mmol / L
- B: 0.56~1.70mmol / L
- C: 1.03~2.07mmol / L
- D: 2.1~3.1mmol / L

答案：C

9. 患者,男,50 岁,诊断为高血压、冠心病。医师处方:氨氯地平片 10mgpoqd; 美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd; 贝那普利片 20mgpoqd; 阿司匹林肠溶片 100mgpoqd; 辛伐他汀片 40mgpoqd。

- A: 双嘧达膜片
- B: 对乙酰氨基酚片
- C: 华法林片
- D: 氯吡格雷片

答案：D

10. 服用抗结核药异烟肼时,不

- A: 饮酒

B: 喝茶

C: 吃鱼

D: 吸烟

答案：C

11. 可导致血中胆固醇水平升高的药品是

A: 非诺贝特

B: 避孕药

C: 氟伐他汀

D: 二甲双胍

答案：B

12. 药师应掌握处方中常用的外文缩写，“每晚”用药的缩写是()

A: qn

B: prn

C: qd

D: qid

答案：A

13. 患者，男，28 岁，近期感觉低热、干咳并带有少量痰液，偶有咯血。经检查确诊为肺结核。治疗前身体检查肝、肾功能正常，无任何眼部疾病。患者在服药治疗期间，发现自己视物逐渐变得模糊，对交通信号灯辨别能力下降，目视前方物体时视野范围比平时减少。导致这一问题的药物应该是

A: 利福平

B: 对氨基水杨酸

C: 异烟肼

D: 乙胺丁醇

答案：D

14. 白细胞分类中，单核细胞参考范围为

A: 20%~40%

B: 1%~5%

C: 3%~8%

D: 50%~70%

答案：C

15. 治疗反复性偏头痛推荐应用的处方药是

A: 苯妥英钠

B: 麦角胺咖啡因

C: 谷维素

D: 阿司匹林

答案：B

16. 患者，女，25 岁，产后 2 个月，哺乳期，因尿路感染需要给予抗感染治疗，首选的药物是()

A: 左氧氟沙星

B: 阿米卡星

C: 头孢呋辛

D: 多西环素

答案：C

17. 为氧化剂，不能用于乐果中毒的洗胃液是

A: 淀粉溶液

B: 1: 5000 高锰酸钾

C: 3%鞣酸溶液

D: 活性炭混悬液

答案：B

18. 下列关于烫伤救治措施的说送正确的是()

A: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面,以防创面感染

B: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染

C: 烫伤患者的镇痛镇静药物首选氯丙嗪

D: I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏

答案：D

19. 耳蜗神经损伤及耳毒性

A: 庆大霉素

B: 氯霉素

C: 米诺环素

D: 阿奇霉素

答案：A

20. 下列哪项不属于激素避孕的作用机制

A: 改变宫颈黏液性状

B: 子宫兴奋和宫颈软化

C: 抑制排卵

D: 改变子宫内膜形态与功能

答案：B

21. 若空腹服药，则胃排空快，药物在短时间内进入十二指肠与小肠；餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃粘膜的刺激。因此，一般药品适宜餐后服用。

A: 餐前服用

- B: 清晨服用
- C: 餐中服用
- D: 餐后服用

答案：A

22. 荨麻疹患者常出现

- A: 血红蛋白减少
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 血小板计数增高

答案：B

23. 高血压合并肾脏疾病，首选

- A: 利尿药
- B: β 受体阻滞药
- C: α 受体阻滞药
- D: 血管紧张素转化酶抑制药

答案：D

24. 清晨 5 时至中午 11 时最低，下午 2 时至次日凌晨 1 时最高，是指

- A: 胃酸的分泌规律
- B: 胰岛 B 细胞的分泌规律
- C: 肝脏合成胆固醇的规律
- D: 糖皮质激素的分泌规律

答案：A

25. (2018 年真题) 举重运动员使用后，可短时间内急速降低体重，因此需按兴奋剂管理的药物是 ()

- A: 呋塞米
- B: 硝苯地平
- C: 缬沙坦
- D: 普萘洛尔

答案：A

26. 可加重老年人慢性便秘的药物是

- A: H
- B: 麻黄碱
- C: 氯丙嗪
- D: 异丙嗪

答案：D

27. 服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

- A: 酒
- B: 烟
- C: 浓茶
- D: 咖啡

答案：A

28. 患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断服用沙丁胺醇 4mg tid 治疗，没有规律用药治疗。因秋冬季交替出现明显喘憋，话不成句，被紧急送医预防治疗。

- A: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂
- B: 沙丁胺醇片
- C: 沙丁胺醇气雾剂
- D: 布地奈德气雾剂

答案：C

29. 容易氧化的药物是

- A: 阿扑吗啡
- B: 胃蛋白酶
- C: 牛痘菌苗
- D: 青霉素类

答案：A

30. 具有缩瞳和降低眼压的拟 M 胆碱药是

- A: 噻吗洛尔
- B: 毛果芸香碱
- C: 拉坦前列素
- D: 溴莫尼定

答案：B

31. （2018 年真题）老年女性，心功能衰竭，服用呋塞米及螺内酯片，正确的使用方法是（）

- A: 清晨服用
- B: 舌下含服
- C: 用温水调服
- D: 应同时碱化尿液

答案：A

32. 验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

- A: III 期临床试验
- B: II 期临床试验
- C: I 期临床试验
- D: 临床预试验

答案：A

33. 可提示轻度黄疸的是

- A: $>342 \mu\text{mol/L}$
- B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$
- C: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案：C

34. 容易造成溶血，葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者禁用的药物是

- A: 亚胺培南
- B: 环丙沙星
- C: 罗红霉素
- D: 磺胺甲噁唑

答案：D

35. 依据咳嗽的发病时间，夜间咳嗽者宜首选（）。

- A: 苯丙哌林
- B: 吗啡
- C: 可待因
- D: 右美沙芬

答案：D

36. 患者溃疡治愈后，因膝关节痛，需要长期服用非甾体抗炎药。为降低溃疡发生风险，首选的预防药物是（）

- A: 奥美拉唑
- B: 替普瑞酮
- C: 多潘立酮

D: 枸橼酸铋钾

答案：A

37. 弱酸性药物离子化减少

A: 肾小球滤过减少

B: 肾血流量减少

C: 肾小管分泌减少

D: 肾小管重吸收增加

答案：D

38. 患者，女，72 岁，主诉“眼干、眼红、刺激感、砂砾感”，医师初步诊断为干眼症，建议患者选用

A: 山莨菪碱滴眼液

B: 聚乙烯醇滴眼液

C: 吡诺克辛滴眼液

D: 左氧氟沙星滴眼液

答案：B

39. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160/105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol/L(参考范围<7.8mmol/L)，甘油三酯

1.2mmol/L(参考范围 0.56~1.70mmol/L)，总胆固醇 6.26mmol/L(参考值范围<5.2mmol/L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol/L(参考值范围

2.1~3.1mmol/L)，高密度脂蛋白胆固醇为 20mmol/L(参考值范围

1.2~6.5mmol/L，肌酐 60 μmol/L(参考值范围 45~84 μmol/L)。蛋白尿：++。临床诊断为高血压、高脂血症、糖耐量异常。

A: 复方利血平

B: 特拉唑嗪

C: 依那普利

D: 氢氯噻嗪

答案: C

40. 患者，女，38 岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力 2 日；查体：神清、气稍促，心律 95bpm，律齐，体温 39.1℃，血压 110 / 70mmHg；心肺听诊：两肺呼吸音粗，未及明显啰音；发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

A: 对于干性咳嗽可单用镇咳药；对痰液较多者应以祛痰为主，镇咳药合用祛痰剂。以利于痰液排出和加强镇咳效果

B: 右美沙芬可引起嗜睡，驾车、高空作业或操作机器者宜慎用；妊娠期妇女、严重高血压者、有精神病史者禁用

C: 对支气管哮喘时的咳嗽宜适当合用平喘药，缓解支气管痉挛，并辅助镇咳和祛痰

D: 镇咳药连续口服 1 周，症状未缓解或消失可改用肾上腺皮质激素

答案: D

41. 属于褪黑素受体激动剂的是

A: 唑吡坦

B: 艾司唑仑

C: 阿戈美拉汀

D: 米氮平

答案: C

42. 变异型心绞痛发作应首选的药物是

A: 氨氯地平

B: 单硝酸异山梨酯

C: 美托洛尔

D: 硝酸甘油

答案：A

43. 引起发冷、寒战、面部和四肢发绀，继而发热等输液反应的 DMARDs 是

- A: 硫唑嘌呤
- B: 氯喹
- C: 利妥昔单抗
- D: 环孢素

答案：C

44. （2019 年真题）患者，女，45 岁，常有上腹部饱胀、恶心食欲不振等消化不良症状。宜选用的药物

- A: 奥美拉唑肠溶胶囊
- B: 蒙脱石散
- C: 干酵母片
- D: 复方阿嗪米特肠溶片

答案：C

45. 药物对医学检查指标异常结果的影响，可能导致血清总胆固醇升高的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 阿司匹林
- C: 氯氮平
- D: 胰岛素

答案：C

46. （2018 年真题）患者，男，46 岁，拟行肠道手术，术前 1 天使用导泻药的方法是（）

- A: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射
- B: 5%氯化钙注射液静脉滴注
- C: 50%葡萄糖注射液湿敷
- D: 50%硫酸镁溶液口服

答案：D

47. (2019 年真题) 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1，主诉夜间咳嗽、咽部有异物感，平躺时常有反酸、烧心、胸痛伴背痛，自用止咳糖浆无效。查体：咽红，听诊双肺未闻及干湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，血压控制在 140/85mmHg 左右，高脂血症 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

- A: 布地奈德吸入剂
- B: 多潘立酮片
- C: 奥美拉唑肠溶胶囊
- D: 单硝酸异山梨酯缓释片

答案：C

48. 不适合儿童的抗癫痫药为 ()

- A: 苯巴比妥
- B: 苯妥英钠
- C: 丙戊酸钠
- D: 卡马西平

答案：A

49. 即使某些眼疾患者适宜应用抗菌药物 / 糖皮质激素眼用制剂。连续应用时间也不宜超过

- A: 5 天
- B: 7 天

C: 10 天

D: 3 天

答案：C

50. 儿科处方印刷用纸的颜色是

A: 淡蓝色

B: 淡绿色

C: 淡黄色

D: 淡红色

答案：B

51. 用药时须与食物同服的增强认知功能药物为（）

A: 多奈哌齐

B: 卡巴拉汀

C: 加兰他敏

D: 苯海索

答案：B

52. 用于治疗苯二氮?类药物中毒的特殊解毒剂是

A: 乙酰胺

B: 青霉胺

C: 氟马西尼

D: 纳洛酮

答案：C

53. (肾功能不全者的抗菌药物给药方案调整)肾功能重度损害时，抗菌药减低至正常剂量的

A: 1/10~1/5

B: $1/7 \sim 1/5$

C: $3/5 \sim 3/4$

D: $1/5 \sim 1/2$

答案：A

54. (2017 年真题) 良性前列腺增生症老年患者应用 α_1 肾上腺素能受体阻断治疗时可能导致的不良反应是 ()

A: 体位性低血压

B: 尿潴留

C: 干咳

D: 乳腺增生

答案：A

55. 患者，男，58 岁，高血压病史 5 年；吸烟史 40 年，日均 40 支。2 小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立；家属发现其说话迟钝、言语含混，左侧鼻唇沟变浅；意识清楚。急送医院急诊，BP170/100mmHg；血常规基本正常；头颅 CT 检查未见高密度病灶。诊断为脑梗死。

A: 阿司匹林肠溶片 300mgqdp

B: 华法林片 3mgqdp

C: 阿司匹林肠溶片 100mgqdp

D: 氯吡格雷片 75mgqdp

答案：C

56. 麻醉药品处方印刷用纸为

A: 淡黄色

B: 白色

C: 淡绿色

D: 淡红色

答案：D

57. 属于 X 级的药物是

A: 万古霉素

B: 阿莫西林

C: 葡萄糖

D: 沙利度胺

答案：D

58. 经口急性汞中毒出现的典型症状是（）

A: 腐蚀性口腔炎

B: 恶心、呕吐、口内有金属味

C: 肌肉震颤、抽搐

D: 恶心、呕吐、视物模糊

答案：A

59. 主要经肾脏排泄的药物或活性代谢产物易在体内蓄积，是由于

A: 肾功能随年龄增长而减退

B: 肝药酶活性的个体化差异影响大于年龄的增长

C: 脂肪组织随年龄增长而增加，血浆白蛋白浓度降低

D: 胆汁分泌缺乏

答案：A

60. 糖尿病患者应慎用的强效利尿剂是

A: 氢氯噻嗪

B: 阿米洛利

C: 呋塞米

D: 甘露醇

答案：C

61. 有机酸排出减少

A: 肾小管重吸收增加

B: 肾小管分泌减少

C: 肾血流量减少

D: 肾小球滤过减少

答案：B

62. 大量长期应用可导致老年人肠道菌群失调或真菌感染并发症的药物是

A: 抗过敏药

B: 广谱抗生素

C: 利尿药

D: 降糖药

答案：B

63. (2017 年真题) 治疗肠道蛔虫病可选用 ()

A: 双八面体蒙脱石散

B: 聚乙醇 4000

C: 莫沙必利

D: 阿苯达唑

答案：D

64. 药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

A: 没有临床症状，无需治疗

B: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

C: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

D: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗

答案：D

65. 具有沉淀作用，不宜在胃内滞留，可用浓茶代替的洗胃液是

A: 3%鞣酸溶液

B: 活性炭混悬液

C: 淀粉溶液

D: 1: 5000 高锰酸钾

答案：A

66. 与胆酸螯合剂合用，应提前至少 2h 服用的是

A: 螺内酯

B: 依曲康唑

C: 依折麦布

D: 他汀类与烟酸联用

答案：C

67. 幽门梗阻（消化性溃疡并发症）

A: 规律性上腹痛

B: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血

C: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物

D: 突发上腹剧痛，继而至全腹

答案：C

68. 和含铁或钙离子的药物合用后，在胃肠道可以发生络合反应而导致生物利用度降低的药物是

A: 丙磺舒

B: 左氧氟沙星

C: 利福平

D: 多潘立酮

答案：B

69. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，诊断为类风湿性关节炎，既往有十二指肠溃疡病史。医生给予甲氨蝶呤+柳氮磺吡啶治疗。甲氨蝶呤用法用量正确的是 ()。

A: 75mgqd

B: 7.5mgqod

C: 7.5mgqw

D: 7.5mg tid

答案：C

70. 下述"药物治疗慢性阻塞性肺疾病的目的"中，不正确的是

A: 预防和控制症状

B: 减少急性加重的频次

C: 排痰化痰

D: 减少急性加重的程度

答案：C

71. 关于尿蛋白和尿葡萄糖的叙述正确的是

A: 当人体肾脏的肾小球通透能力下降时会出现蛋白尿

B: 正常情况下，人体尿液中的尿蛋白含最和尿葡萄糖含量都极微

C: 尿液中出现葡萄糖只取决于血糖水平的高低

D: 出现蛋白尿时即表明机体出现病理性变化

答案：B

72. 患者，女 67 岁出现认知功能障碍 5 年，诊断为阿尔茨海默病，予以美金刚治疗。下列药物中，可增加美金刚血药浓度的是（）

- A: 氯化铵
- B: 碳酸氢钠
- C: CYP2D6 抑制剂
- D: CYP3A4 制剂

答案：B

73. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 氯化钾
- B: 红霉素
- C: 卡马西平
- D: 奥美拉唑

答案：B

74. 可引起视物模糊、辨色困难的药物是

- A: 阿米洛利
- B: 右美沙芬
- C: 氯苯那敏
- D: 东莨菪碱

答案：D

75. 药品不良反应的诱因主要是药物因素与患者因素。预防不良反应须采取多项措施

- A: 注意特殊人群用药

B: 注意 ADR 症状，尤其是迟发反应

C: 注意定期监测器官功能

D: 了解患者及其家族的过敏史

答案：C

76. 患者男，78 岁实施右侧髋关节置换术，术后第 10 日，患侧下肢出现肿胀、疼痛，诊断为深静脉血栓。该患者应选用的药物是（）

A: 氯吡格雷

B: 血凝酶

C: 依诺肝素

D: 阿司匹林

答案：C

77. 患者，女，22 岁，因淋雨导致发热、咳痰伴胸痛 1 天就诊。查体：体温 38.6℃，脉搏 90 次 / 分，呼吸 24 次 / 分，血压正常；双肺布满湿啰音。实验室检查：WBC 11×10^9 / L，胸片显示斑片状浸润性阴影。既往无过敏史。选用有效抗生素治疗后 2 天，体温恢复正常，咳痰减少。

A: 慢性阻塞性肺病

B: 社区获得性肺炎

C: 支气管炎

D: 医院获得性肺炎

答案：B

78. 患者，男 58 岁，高血压病史 5 年，吸烟史 40 年，日均 40 支，6 小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立，家属发现其说话迟钝含混，右侧嘴唇变浅，意识清楚，到某院急诊 BP190/120mmHg，血常规基本正常，行头部 MRI 检查后，诊断为急性脑梗死。

- A: 阿司匹林肠溶片 100mgqdp0
- B: 阿司匹林肠溶片 300mgqdp0
- C: 华法林片 3mgqdp0
- D: 氯吡格雷片 75mgqdp0

答案：A

79. (2019 年真题) 患者，男，68 岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天入院。查体：体温 39.1℃，血压 138/80mmHg，心率 102 次/分，呼吸 32 次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A: 哌拉西林他唑巴坦
- B: 莫西沙星
- C: 阿奇霉素
- D: 头孢哌酮舒巴坦

答案：B

80. 用量过大可引起低血糖反应的是

- A: 胰岛素
- B: 糖皮质激素
- C: 炔雌醇
- D: 甲状腺素

答案：A

81. 药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是()

- A: 双歧三联活菌胶囊
- B: 西地碘片
- C: 硫普罗宁片

D: 乳酶生片

答案：A

82. 第一类精神药品处方印刷用纸是

A: 淡红色

B: 淡黄色

C: 淡绿色

D: 淡橙色

答案：A

83. 伴有 Q—T 间期延长的过敏性鼻炎患者不宜使用的治疗药物是

A: 口服抗组胺药

B: 鼻用抗组胺药

C: 口服糖皮质激素

D: 白三烯受体阻断剂

答案：A

84. (2016 年真题) 含有马兜铃酸的中药，可引起的典型药源性疾病是 ()。

A: 消化性溃疡

B: 粒细胞减少症

C: 慢性肾衰竭

D: 溶血性贫血

答案：C

85. 混合型高脂血症，首选的治疗药物是

A: 贝特类

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: ω -3 脂肪酸制剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/368124037043007022>