

A 型题

1.煮沸法杀灭带芽孢杆菌需时间为

- A. 15 分钟.
- B. 30 分钟
- C. 45 分钟
- D. 60 分钟
- E. 120 分钟

2.手臂消毒法，可以起到的作用

- A.消除和杀灭皮肤表面和深处的细菌
- B.仅能消除和杀灭皮肤表面的细菌
- C.减少皮肤表面的细菌
- D.降低皮肤表面和深处细菌的毒性
- E.防止皮脂腺、毛囊里的细菌污染伤口

3.面部疖肿手术时，皮肤消毒比较正确的方法

- A.先用 3%碘酊，后用 70%酒精，由手术中心向周围涂擦皮肤
- B.先用 3%碘酊，后用 70%酒精，由手术周围向中心
- C. 70%酒精，周围向中心
- D. 70%酒精，中心向周围
- E. 1：1000 新洁尔灭，中心向周围

4.麻醉的含义是指

- A.使病人消除疼痛
- B.使病人感觉运动消失
- C.消除疼痛，保障病人安全，创造手术良好条件
- D.使病人意识消失，肌肉有一定程度松弛
- E.使病人中枢神经系统产生抑制，反射消失

5.关于麻醉前的准备，下列哪项是错误的？

- A.高热病儿，术前要先降温后再手术
- B.呼吸道炎症者，要用抗生素控制后再手术
- C.高血压病人，需给降压药使血压稳定后再手术
- D.急症手术应立即手术，以免耽误治疗时机
- E.心衰病人，应使用洋地黄控制后再手术

6.麻醉前应用吗啡的目的，下列哪项是错误的？

- A.提高痛阈，增强麻醉效果
- B.减轻内脏牵引痛
- C.松弛支气管平滑肌，保持呼吸道通畅
- D.减少全麻药的用量
- E.使病人安静合作

7.麻醉前用药时，下列哪项是错误的？

- A.高热、心动过速者，应不用阿托品，可换用东莨菪碱
- B.颅内压升高者应禁用吗啡
- C.支气管哮喘者，应首选吗啡
- D.剧痛并休克者，应给吗啡类药物
- E.甲亢病人应少用或不用阿托品

8.椎管内麻醉时，术前用抗胆碱类药的主要目的

- A.降低迷走神经张力
- B.减少呼吸道分泌物
- C.降低基础代谢
- D.加强麻醉作用
- E.镇静

9.剖腹产孕妇麻醉前用药，下列哪项是错误的

- A.术前一日晚服用安定
- B.苯巴比妥钠 0.1g 麻醉前 30 分钟肌注
- C.亦可于麻醉前 30 分钟肌注安定 10mg
- D.阿托品 0.5mg 麻醉前 30 分钟肌注
- E.吗啡 10mg 术前肌注可减轻腹部手术中牵拉反应

10.局麻药中毒反应的原因中，下列哪一项是错误的

- A.超过一次最大剂量
- B.危重、虚弱、不能耐受通用剂量的病人
- C.对局部麻醉药过敏
- D.麻醉药误入血管
- E.局部麻醉药内未加入肾上腺素，因此吸收加快

11.局麻药毒性反应的早期主要表现为

- A.血压下降
- B.呼吸抑制
- C.面色发绀
- D.四肢抽搐
- E.精神症状

12.成年人普鲁卡因一次最大使用量为

- A. 0.5g
- B. 1.0g
- C. 2.0g
- D. 3.0g
- E. 5.0g

13.以下局部麻醉药中毒性最小的

- A. 0.5%普鲁卡因 100ml
- B. 2%普鲁卡因 50ml
- C.1%普鲁卡因 50ml
- D. 0.5%普鲁卡因 5ml
- E. 2%利多卡因 10ml

14.腰麻绝对禁忌症

- A.呼吸系统疾病
- B.肾脏疾病
- C.慢性肝炎
- D.有普鲁卡因过敏史
- E.休克

15.成人麻醉前禁食的最适宜时间为

- A.术前 4 小时
- B.术前 6 小时
- C.术前 8 小时
- D.术前 12 小时
- E.术前 24 小时

16.腰麻的主要危险

- A.低血压
- B.麻醉平面过高
- C.心动过缓
- D.呼吸抑制
- E.缺氧

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/368141140140006063>