

2024 年河北省怀来县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库大全【培优 B 卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. “1 个半衰期给药 1 次；如需要立即达到稳态，可首剂加倍”是针对
- A: 半衰期大于 24 小时的药品
 - B: 半衰期 8~24 小时的药品
 - C: 半衰期大于 30 小时的药品
 - D: 半衰期小于 30 分钟的药品

答案：B

2. 慢性肾小球肾炎常见
- A: 细胞管型
 - B: 颗粒管型、透明管型
 - C: 蜡样管型
 - D: 白细胞管型

答案：B

3. 关木通事件，关木通会导致严重的肾毒性，是因为
- A: 其含有二甘醇
 - B: 其含有甲氨蝶呤
 - C: 其含有马兜铃酸
 - D: 其含有刺五加

答案：C

4. 静滴、静注等给药途径的不良反应发生率较高，说明药源性疾病的药物因素是

- A: 药物的使用
- B: 药物制剂因素
- C: 不良生活方式
- D: 生理因素

答案：A

5. 提供的药物信息和建议是否均来自受过专门药学培训的合格人员，是衡量互联网信息的

- A: 归因性
- B: 新颖性
- C: 权威性
- D: 合理性

答案：C

6. 口服或静滴 β 受体阻断剂用于解救

- A: 麦角胺中毒
- B: 异烟肼中毒
- C: 瘦肉精中毒
- D: 亚硝酸盐中毒

答案：C

7. “调查显示，应用过庆大霉素治疗的霍乱患者肾衰竭的发病率是未用患者的 5 倍”提示诊断药源性疾病应该进行

- A: 排除药物以外的因素
- B: 询问用药过敏史和家族史
- C: 流行病学的调查

D: 致病药物的确定

答案：C

8. 咳嗽变异性哮喘可选用的药物是

A: 异丙托溴铵

B: 倍氯米松

C: 沙丁胺醇

D: 沙美特罗+氟替卡松

答案：D

9. 宜于餐中服用的药品是

A: 糖皮质激素

B: 甲氧氯普胺

C: 洛伐他汀

D: 阿卡波糖

答案：D

10. 患者，男，50岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方，氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

A: 美托洛尔缓释片

B: 贝那普利片

C: 氨氯地平片

D: 阿司匹林肠溶片

答案：B

11. 在药师应该具备的诸项专业技能中，作为药师的最基本工作的是

A: 处方调剂

- B: 处方审核
- C: 处方点评
- D: 药品警戒技能

答案：A

12. 脑梗死的分期，急性期

- A: 1~6 个月
- B: 2~3 个月
- C: 1 个月内
- D: 15 天

答案：C

13. 可应用于有反复性偏头痛的抗偏头痛药是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 苯噻啶
- C: 阿司匹林
- D: 地西泮

答案：B

14. 可引起儿童良性颅压增高、囟门隆起的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 抗组胺药
- C: 维生素 A
- D: 氯霉素

答案：C

15. 选择药物的首要标准是药物治疗的

- A: 经济性？

- B: 有效性?
- C: 安全性?
- D: 方便性?

答案: B

16. 下列关于抗失眠药物治疗策略的说法，正确的是

- A: 失眠继发于或伴发于其他疾病时，应同时治疗原发或伴发疾病
- B: 焦虑障碍患者存在失眠时，以抗失眠药物治疗为主
- C: 原发性失眠在非药物治疗无效时首选苯二氮革类抗失眠药
- D: 药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测

答案: A

17. 溶栓作用无选择性，降解纤维蛋白凝块，也降解纤维蛋白原和其他血浆蛋白的药物是

- A: 链激酶
- B: 肝素
- C: 噻氯匹定
- D: 华法林

答案: A

18. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 $\mu\text{mol/L}$ (正常值: 男性 180~440 $\mu\text{mol/L}$)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 腹胀

B: 心律失常

C: ALT 升高

D: 低血糖

答案：A

19. 患者，男，50 岁，血压 170 / 95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是

A: 利尿剂+AR

B: β 受体阻断剂+ARB

C: 利尿剂+D-CCB

D: α 受体阻断剂+ACEI

答案：C

20. 以下可能导致锥体外系反应(药源性神经系统疾病)的药物是

A: 麻黄碱

B: 哌甲酯

C: 氯丙嗪

D: 茶碱

答案：C

21. 药师在知道合理用药时应正确的交代给药途径和给药方法，下列交代的内容错误的是：

A: 栓剂是外用制剂，不可口服

B: 泡腾片是可以溶解于温开水后服用，也可以作为咀嚼片服用

C: 活菌制剂不能超过 40℃ 的水送服

D: 肠溶片要整体吞服，不易咀嚼服用

答案：B

22. 服用地西泮等苯二氮

- A: 烟
- B: 酒
- C: 浓茶
- D: 咖啡

答案：A

23. 收录 5500 余种药物专论、4 万多篇参考文献的是

- A: 《药物事实与比较》
- B: 《中国国家处方集》
- C: 《美国药典药物信息》
- D: 《马丁代尔药物大典》

答案：D

24. 向患者发放合理用药宣传材料是

- A: 质问方式
- B: 指令方式
- C: 被动方式
- D: 主动方式

答案：D

25. 容易缩短凝血酶原时间的药物是

- A: 普通肝素
- B: 利伐沙班
- C: 口服避孕药
- D: 华法林

答案：C

26. 苯丙酸诺龙属于哪一类兴奋剂

- A: 利尿剂
- B: 蛋白同化激素
- C: 精神刺激剂
- D: β 受体阻断剂

答案：B

27. 患者，男，71 岁。患良性前列腺增生症。下列药物中不能用于治疗该病的是

- A: 选择性 α_1 受体阻断剂
- B: 抗胆碱药物
- C: 雄激素
- D: 5α 还原酶抑制剂

答案：C

28. （2018 年真题）用于胆石症的非手术治疗，属于钙通道阻滞剂，不可掰开嚼碎，避免卧位服用的药物是（）

- A: 匹维溴铵片
- B: 山莨菪碱片
- C: 鹅去氧胆酸片
- D: 熊去氧胆酸片

答案：A

29. 长期大剂量应用头孢哌酮治疗慢性感染，需要监测的临床指标是

- A: 血压
- B: 凝血功能
- C: 血糖
- D: 血脂

答案：B

30. 美金刚的主要不良反应是

- A: 血脂升高
- B: 幻觉
- C: 心律不齐
- D: 呼吸抑制

答案：B

31. 患者，女，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见 WBC $15 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 急性肾盂肾炎
- B: 急性膀胱炎
- C: 慢性肾盂肾炎
- D: 急性肾小球肾炎

答案：A

32. （2018 年真题）患者，男，60 岁，因水疱型足癣到药店购药药师应推荐的药品是（）

- A: 利巴韦林软膏
- B: 特比萘芬乳膏
- C: 氢化可的松软膏
- D: 10%樟脑软膏

答案：B

33. 对局部发生水疱和糜烂者可选用

- A: 溃疡膏
- B: 赛庚啶
- C: 10%樟脑软膏
- D: 10%氧化锌软膏

答案：D

34. 患者，男，35 岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

- A: 碳酸氢钠
- B: 小檗碱
- C: 胰酶
- D: 双八面体蒙脱石散

答案：C

35. 长期大量用药时，可出现流感样症状的抗结核药是

- A: 利福平
- B: 乙胺丁醇
- C: 链霉素
- D: 异烟肼

答案：A

36. (2019 年真题) 患者，女，35 岁，复杂部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫控制不佳提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊，患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

A: 50~150 $\mu\text{g/ml}$

B: 10~20 $\mu\text{g/ml}$

C: 10~40 $\mu\text{g/ml}$

D: 4~12 $\mu\text{g/ml}$

答案：A

37. 患者,男,64岁,因右足肿痛就诊。查体:右脚第一趾关节红肿,触痛明显。化验结果:血尿酸 581 $\mu\text{mol/L}$ 。诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病,目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

A: 阿司匹林片 (300mg)

B: 双氯芬酸钠片

C: 贝诺酯片

D: 别嘌醇片

答案：B

38. (2016 年真题) 与阿莫西林配伍,可提高治疗的是 ()。

A: 奥美拉唑

B: 克拉维酸钾

C: 苯丝肼

D: 叶酸

答案：B

39. 沟通医药患的重要纽带的是

A: 治疗药物监测

B: 处方调配

C: 参与临床药物治疗

D: 静脉药物配置

答案: B

40. (单纯疱疹病毒的分型) 主要在幼年感染是 ()

A: HSV- I 型

B: HSV-IV 型

C: HSV-III 型

D: HSV- II 型

答案: A

41. 洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀等他汀类所致的药源性损伤为

A: 肝损害

B: 肺损害

C: 胃肠道损害

D: 肾损害

答案: A

42. 以下哪项不是药物流产的适应证 ()

A: 妊娠 $\leq$ 49 日

B: 本人自愿、年龄 $>$ 40 岁的健康女性

C: B 超确诊为宫内妊娠

D: 多次人工流产术史

答案: B

43. 吩噻嗪类抗精神病药中毒出现

A: 谵妄、躁狂、幻觉

B: 明显的锥体外系症状

C: 心血管毒性

D: 肌肉震颤、抽搐

答案: B

44. 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用治疗痤疮时，正确的用法是

A: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用？

B: 将两种药物的凝胶或乳膏充分混合后同时应用？

C: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶？

D: 睡前应用过氧苯甲酰凝胶，晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏？

答案: C

45. （2019 年真题）患儿，男，2 岁，误服水银后，应选用的洗胃液是

A: 淀粉溶液

B: 1:5000 高锰酸钾溶液

C: 牛奶与水等量混合

D: 鸡蛋清

答案: D

46. 患者，男，28 岁，近期感觉低热、干咳并带有少量痰液，偶有咯血。经检查确诊为肺结核。治疗前身体检查肝、肾功能正常，无任何眼部疾病。患者在服药治疗期间，发现自己视物逐渐变得模糊，对交通信号灯辨别能力下降，目视前方物体时视野范围比平时减少。导致这一问题的药物应该是

A: 异烟肼

B: 对氨基水杨酸

C: 利福平

D: 乙胺丁醇

答案: D

47. 激动 β_1 受体，对急性心衰疗效较好的是

- A: 多巴酚丁胺
- B: 地高辛
- C: 氨力农
- D: 硝普钠

答案：A

48. 患者，男，40 岁，因肺结核使用抗结核药后，四肢出现针刺感，导致这种症状的药物是()

- A: 异烟肼
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

答案：A

49. 下列药物中，不属于兴奋剂的是

- A: 钙通道阻断剂
- B: 精神刺激剂
- C: 利尿剂
- D: β 受体阻断剂

答案：A

50. ADR 报告表应填写具体；如患卵巢囊肿合并肺部感染。因注射头孢曲松引起不良反应，应填写“肺部感染”；所对应的项目是

- A: ADR / ADE 过程描述
- B: 不良反应 / 事件的结果
- C: 用药起止时间
- D: 用药原因

答案：D

51. 可告知患者采取如穿戴宽松的鞋袜和手套，避免反复揉搓手脚，避免长时间阳光直射等措施预防药物不良反应的是

- A: 顺铂
- B: 奥沙利铂
- C: 卡铂
- D: 卡培他滨

答案：D

52. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 受精后 2 周至 3 个月
- B: 受精后 1 周至 3 个月
- C: 受精后 3 周至 3 个月
- D: 受精后 3 周至 2 个月

答案：C

53. 肝功能不全患者宜选用的药物是

- A: 肾毒性小、经肝代谢的药物
- B: 经肝肠循环消除的药物
- C: 肝毒性小、经肾代谢的药物
- D: 经肝肾双途径消除的药物

答案：C

54. 患者，女，45 岁，6 个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁，在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗，症状控制较好，近 3 个月服用西咪替丁，患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱，该患者各地求医，服用各种药物，具体药物品种不详。围绕该病例，医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

- A: 卡马西平
- B: 丙戊酸钠
- C: 苯巴比妥
- D: 地西泮

答案：B

55. 阿托品联用氯解磷定解救有机磷重度中毒的机制是

- A: 竞争性拮抗作用
- B: 延缓或降低抗药性
- C: 作用于不同的靶点
- D: 促进机体的利用

答案：C

56. 糖尿病患者应慎用的强效利尿剂是

- A: 甘露醇
- B: 阿米洛利
- C: 氢氯噻嗪
- D: 呋塞米

答案：D

57. 脂溶性最低，作用慢而长的是

- A: 硫喷妥
- B: 戊巴比妥

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 巴比妥

D: 苯巴比妥

答案：C

58. 体液占体重 75%~80%，水溶性药物血中峰浓度较高，即

- A: 药物吸收
- B: 药物分布
- C: 药物排泄
- D: 药物代谢

答案：B

59. 需 2~10℃ 冷处保存，并避免冻结的药品

- A: 胰酶片
- B: 脂肪乳
- C: 低精蛋白胰岛素注射剂
- D: 利福平片

答案：C

60. 易受湿度影响而变质的药品为

- A: 肝素
- B: 冰硼散
- C: 安乃近
- D: 氰化钾

答案：B

61. 患者，男，59 岁，诊断为 2 型糖尿病，因口服降糖药疗效欠佳，给予预混胰岛素 30R 注射液。关于该患者用药教育的说法，错误的是（ ）

- A: 未开启的胰岛素制剂应冷藏保存，冷冻后不可再使用
- B: 胰岛素笔芯启用后不宜冷藏保存

C: 应警惕发生低血糖，提醒患者随身携带木糖醇糖果

D: 使用前应缓慢摇匀，确保给药剂量准确

答案：C

62. (2018 年真题) 患者, 男, 65 岁, 诊断为持续性心房纤颤, 医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症, 目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况, 药师提出的合理化药物治疗建议, 不包括 ()

A: 患者在复律成功后, 尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗

B: 因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用, 建议换成氨氯地平或 CCB 降压药

C: 胺碘酮可以显著抑制 CYP2D6, 减慢美托洛尔的代谢, 应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量

D: 胺碘酮能增加华法林的抗凝活性, 在逐渐降低胺碘酮剂量的时候, 注意随时根据 INR 值调整华法林的剂量

答案：B

63. 糖尿病患者尿常规检查可发现

A: 尿血红蛋白阳性

B: 尿葡萄糖阳性

C: 尿淀粉酶增高

D: 尿胆红素阳性

答案：B

64. 用于用药错误分级的是 ()

A: NCEMERP 标准

B: CLHD 公式

C: CoCkroft-GAut 公式

D: CoChrAnE 分级

答案：A

65. 某患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊。临床处方：阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他汀片

B: 特拉唑嗪片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片

C: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液

D: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片

答案：C

66. 对预防用药错误的策略而言，个人观认为发生用药错误的原因主要是

A: 人的行为失常

B: 人员短缺

C: 环境缺陷

D: 工作流程不规范

答案：A

67. 细菌性尿路感染最常见的致病菌是()

A: 克雷伯杆菌

B: 大肠埃希菌

C: 肠球菌

D: 铜绿假单胞菌

答案：B

68. (痛风的不同分期的治疗原则)，哪个时期的治疗原则是以控制关节炎症(红肿、疼痛)为目的，尽早使用抗炎药

- A: 痛风性肾病治疗期
- B: 急性发作期
- C: 发作间歇期
- D: 首次发作期

答案：B

69. 由用药顺序确定最可疑致病药物一有意识地停用最可疑或引起相互作用的药物一根据停药后症状的变化、确诊，即可

- A: 确定致病药物
- B: 流行病学的调查
- C: 排除药物以外的因素；必要的实验室检查
- D: 追溯用药史；询问用药过敏史和家族史

答案：A

70. 患者，女，48岁，因急性气管-支气管炎发作，出现“咳嗽、咳黄痰、喘息”症状就诊。患者无其他基础疾病，不应出现在患者用药处方中的是

- A: 氨溴索溶液
- B: 阿莫西林胶囊
- C: 美敏伪麻溶液
- D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：B

71. 可治疗男性性功能障碍的药物是

- A: 沙美特罗

B: 西地那非

C: 度洛西汀

D: 维生素 E

答案: B

72. 解救中毒的肾衰竭者 ()

A: 不能用强利尿剂

B: 不能催吐

C: 禁止洗胃

D: 不能导泻

答案: A

73. 患者，男，58 岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀 40mgqd。患者用药期间应定期监测的生化指标是

A: BUN

B: RBC

C: ALT

D: Hb

答案: C

74. 按照药品不良反应程度分级标准评判,症状明显,重要器官或系统功能有中度损害,应评判为

A: 轻度

B: 中度

C: 弱轻度

D: 重度

答案: B

75. (2015 年真题) 用药后应保持上身直立的药物是 ()。

- A: 硫酸亚铁
- B: 去氮加压素
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 阿莫西林

答案: C

76. 关于 TIA 的药物治疗说法不正确的是

- A: 抗凝治疗为非心源性 TIA 的常规治疗
- B: 对反复发生 TIA 的患者应首先考虑选用抗血小板药物
- C: 对伴发房颤、风湿性二尖瓣病变的患者建议选用华法林抗凝治疗
- D: 小剂量肠溶阿司匹林能一定程度上降低卒中再发

答案: A

77. 患者,男,71 岁,因高血压、心力衰竭给予氢氯噻嗪、地高辛等治疗,产生的药物相互作用属于 ()

- A: 降低抗药性,疗效增加
- B: 增加靶器官药物浓度,药品不良反应减少
- C: 拮抗作用,药品不良反应增加
- D: 敏感化作用,药品不良反应增加

答案: D

78. 可用于治疗高氨血症的药物是

- A: 番泻叶
- B: 开塞露
- C: 硫酸镁
- D: 乳果糖

答案: D

79. 黏膜保护剂

- A: 法莫替丁
- B: 多潘立酮
- C: 铝碳酸镁
- D: 埃索美拉唑

答案: C

80. 可提供摘要、引文、索引及目录的信息属于

- A: 一级信息
- B: 二级信息
- C: 三级信息
- D: 四级信息

答案: B

81. 贮存温度在 2℃ 以上时，温度越低，对多数药品保管越有利。降钙素鼻喷雾剂说明书标明“冷处”贮存，其贮存条件是指

- A: 温度在 10℃～30℃ 之间
- B: 温度不超过 20℃
- C: 温度在 2℃～10℃ 之间
- D: 避光，温度不超过 -5℃

答案: C

82. 可透过胎盘屏障，可能引起胎儿甲状腺肿大及功能减退，在分娩时造成难产、窒息的药物是

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 双氯芬酸
- C: 苯海拉明

D: 左甲状腺素

答案：A

83. 下列中药、化学药联合应用，不存在重复用药的是：

A: 曲克芦丁片+维生素 C 片

B: 消渴丸+格列本脲片

C: 脉君安片+氢氯噻嗪片

D: 新癬片+吲哚美辛胶囊

答案：A

84. 对购药患者讲授安全用药常识是

A: 教育方式

B: 协商方式

C: 指令方式

D: 主动方式

答案：D

85. 选择药物的首要标准是药物治疗的

A: 经济性

B: 有效性

C: 适宜性

D: 安全性

答案：B

86. 用于胆囊炎患者控制感染症状的药物是

A: 脂肪乳

B: 头孢曲松与甲硝唑联用

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 复方阿嗟米特

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/375012003122012033>