

（四）判断题

- 1 合理用药要考虑的主要因素是保证用药的有效性，其他因素次要的。
() --- 答案：A
A. 错误 B. 正确
- 2 “用药”的含义是指病人服用药品。 () ---
答案：A
A. 错误 B. 正确
- 3 精神药品和麻醉药品同属特殊药品应同一处保存。() --- 答
案：A
A. 错误 B. 正确
- 4 儿童和老人用药剂量不同于成人用药剂量。 () --- 答
案：B
A. 错误 B. 正确
- 5 随着年龄的增长用药剂量增加。 () --- 答
案：A
A. 错误 B. 正确
- 6 选择最适宜的给药方法是口服给药。 () --- 答案：
A
A. 错误 B. 正确
- 7 在给药剂量相同时，老年人比青年人更易出现毒副作用。()
--- 答案：B
A. 错误 B. 正确
- 8 神经纤维传导速度在 40~50 岁以后随增龄而减慢。() --- 答
案：B
A. 错误 B. 正确
- 9 10%葡萄糖液输入过快可引起新生儿高血糖症。 --- 答案：B
A. 错误 B. 正确
- 10 乳母吸烟过多，不会造成婴儿烟碱中毒，饮酒过量会造成婴儿嗜睡。
--- 答案：A
A. 错误 B. 正确
- 11 青霉素类药物的主要副作用事可引起过敏反应，在注射给药之前需要

做皮试。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

12 家长应该知道药品应存放在儿童不能拿到的地方，所以家长在购药时不必再告知家长。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

13 皮炎患者使用外用药，不可能出现副作用。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

14 治疗鼻塞/鼻堵的药物不能连续使用超过 5 天。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

15 一般情况下连续使用抗生素眼药水超过 5 天，效果仍不明显，应请眼科医生诊治。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

16 药物经生物转化后，均失去了药理活性。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

17 部分激动剂与激动剂合用时，可加强后者的作用。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

18 小剂量的阿司匹林有抗血小板聚集的作用。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

19 血管紧张素 I 转换酶抑制剂类抗高血压药物往往产生干咳等不良反应。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

20 利多卡因是一局麻药，临床上也可用于室性心率失常的治疗。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

21 硝酸甘油用于缓解心绞痛，口服安全有效。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

22 葡萄糖酸锌不能用于因缺锌引起的厌食症。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

23 药物加工制成适合患者的给药形式叫制剂。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

24 药物加工制成适合患者的给形式叫剂型。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

25 溶液型剂型系指药物分散在分散介质中所形成的均匀的液体分散体系。
--- 答案：B

A. 错误 B. 正确

26 溶液剂系低分子溶液。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

27 溶液剂系高分子溶液。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

28 乳剂系指液体分散相和液体分散介质所组成的不均匀的液体分散系统。
--- 答案：B

A. 错误 B. 正确

29 乳剂系指固体分散相和液体分散介质所组成的不均匀的液体分散系统。
--- 答案：A

A. 错误 B. 正确

30 软膏剂是固体剂型。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

31 气体剂型包括气雾剂。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

32 混悬剂系指固体药物以微粒分散在液体分散介质中所组成的不均匀的液体分散系统。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

33 高分子溶液剂又称溶胶剂 。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

34 盐酸普鲁卡因可发生水解。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

35 维生素 C 分子中含有烯醇基，不易氧化。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

36 一般来说，温度升高，反应速度加快。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

37 口腔贴片系指黏贴于口腔，经舌下黏膜吸收后起局部作用或全身作用的速释或缓释片剂。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

38 吗啡属于精神药品，能使人体产生依赖性。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

39 某企业如果同品种药品广告批准文号被撤销一次以上的，一年内不受理广告申请的时限按最后一次撤销的时间计算。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

40 药品质量会受到温度、湿度、光线、空气、金属离子和包装材料等的影响。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

41 为了便于国际交流，一般采用 WHO 发表的国际专利名（即 INN）作为药品的英文名。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

42 处方上某药品每次使用剂量为 0.25，是指每次的用量为 0.25 克。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

43 处方前记中的年龄项，对于儿童一定要注明实际年龄，对于成年人，可简写为“成”。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

44 为考虑病情变化，确保患者用药安全，处方只限 3 日内有效，过期须经医师更改日期并签字后方能生效。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

45 病人的依从性并不限于药物治疗，还包括对饮食、吸烟、饮酒、运动及家庭生活等多方面的指导是否能遵守。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

46 小儿的药物剂量只能根据体重来进行计算。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

47 老年人对葡萄糖的耐量不敏感，因此输液时应适当增加葡萄糖的浓度。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

48 老年人咳嗽、排痰功能会减弱，氧供不足，会对药物的转运、分布产生影响。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

- 49 抗甲状腺药物一般认为在乳汁中浓度较低，哺乳期可使用。 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 50 发热俗称发烧。 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 51 蛀牙发生与否还受遗传因素、营养状况、饮食与卫生习惯、唾液量多少的影响。 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 52 建议患者保持室内空气流通、湿润，有助于预防鼻出血。 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 53 对患有皮炎患者建议每日洗澡，保持皮肤清洁。 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 54 口服维甲酸无致畸作用，孕妇可以使用。 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 55 奥司他韦适用于甲型流感，金刚烷胺是用于乙型流感。 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 56 对幼童给药，如果不配合，可以捏住鼻子灌药。 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 57 如果是 16 岁以下的青少年购买避孕用品或药物，应劝告他们先向妇科医生或计划生育专业人员寻求专业辅导。 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 58 服用抗凝血药的患者服用阿司匹林后更易导致出血。 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 59 II 型糖尿病的患者需要注射胰岛素来治疗。 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 60 苯海拉明常用于晕动病引起的呕吐，还具有抗过敏作用。 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 61 对青霉素过敏者也可能对头孢菌素产生过敏反应，因此应慎用。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

62 呼吸道感染者只要不直接接触就可以不影响别人。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

63 咳嗽持续一个月以上，痰中带血，湿咳伴有发热等症状应该引起警惕，劝其尽快就医。 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

64 对泌尿系统感染者建议不要饮用大量水，以免增加肾脏负担。 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

65 青霉素是最早用于治疗全身性感染的人工合成的抗菌药 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

66 二重感染一般是在长时间使用广谱抗菌药时才发生 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

67 头孢菌素比青霉素类具有更强的抗菌作用，已广泛取代了青霉素类的临床用途 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

68 四环素类药物最易产生的不良反应是肾损害和过敏反应 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

69 氯喹具有抗疟作用快、强等特点，是目前控制临床症状的首选药物 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

70 化疗药物的化疗指数越小，表示该药物的毒性也就越小 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

71 某些细菌通过产生大量的对氨基苯甲酸，而对磺胺类药物产生抗药性 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

72 甲状腺激素主要用于甲状腺功能低下的替代补充疗法 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

73 肾上腺皮质所分泌的激素有糖皮质激素、盐皮质激素和性激素 ---

答案：B

A. 错误 B. 正确

74 糖皮质激素可直接杀灭细菌 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

75 有出血倾向的患者应慎用肝素 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

76 硫酸亚铁对胃肠道刺激小，饭前饭后服用均可 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

77 铁剂是治疗巨幼红细胞性贫血最好的药物 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

78 口服胰酶时宜与稀盐酸合用 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

79 奥美拉唑通过抑制胃壁细胞的质子泵抑制胃酸的分泌 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

80 可待因具有一定的祛痰作用，因此不用于无痰干咳 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

81 噻嗪类利尿药不但具有利尿作用，还有降压及抗利尿作用 --- 答案：
B

A. 错误 B. 正确

82 呋喃苯胺酸和螺内酯均可竞争性拮抗醛固酮发挥利尿作用 --- 答案：
A

A. 错误 B. 正确

83 甘露醇的脱水作用机理为增加肾小球滤过率 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

84 消胆胺的降脂机理为抑制 HMG-CoA 还原酶 --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

85 烟酸是一广谱降血脂药，对多种高血脂症均有效 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

86 硝酸甘油既能中止心绞痛发作，也能预防心绞痛发作 --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

- 87 硝酸甘油主要通过降低心肌耗氧量缓解心绞痛症状，对冠脉血流无明显影响 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 88 利多卡因可引起金鸡纳反应 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 89 苯妥英钠为抗癫痫药，临床上也可用于室性心率失常的治疗。 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 90 几乎所有的心律失常均可见于强心苷中毒 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 91 强心苷最常见的是心脏毒性反应，而最严重的是胃肠道反应 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 92 卡托普利是 Ang II 受体拮抗剂 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 93 与卡托普利相比，氯沙坦不会引起顽固性干咳 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 94 所有的解热镇痛药均有解热、镇痛、抗炎抗风湿作用 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 95 对乙酰氨基酚是非那西丁的活性代谢产物，具有较好的解热镇痛作用 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 96 苯巴比妥是较强的肝药酶抑制剂，不仅减慢自身代谢，也会减慢其他多种药物的代谢 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 97 与巴比妥类相比，安定的依赖性发生率较高 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 98 有些 β 受体阻滞药除能阻断受体外还对 β 受体具有部分激动作用，称内在拟交感活性 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 99 青霉素所致的过敏性休克，可首选肾上腺素来缓解 --- 答案：B

- A. 错误 B. 正确
- 100 受体阻断剂是指无法和受体结合的药物 --- 答案: A
- A. 错误 B. 正确
- 101 过敏反应是由于药物用量过大引起的 --- 答案: A
- A. 错误 B. 正确
- 102 由于药物的半衰期不同, 所以每日给药三次的方法并不适用于所有药物 --- 答案: B
- A. 错误 B. 正确
- 103 具有肝肠循环的药物, 其半衰期也较长 --- 答案: B
- A. 错误 B. 正确
- 104 咀嚼片系指口腔中咀嚼或吮服使片剂溶化后吞服, 在胃肠道中发挥作用或经胃肠道吸收发挥全身作用的片剂 --- 答案: B
- A. 错误 B. 正确
- 105 含片系指在水中能迅速崩解均匀分散的片剂 --- 答案: A
- A. 错误 B. 正确
- 106 缓释片片剂具有血药浓度平稳、服用次数少且作用时间长等特点 --- 答案: B
- A. 错误 B. 正确
- 107 分散片可加水分散后口服, 但不能含于口中吮服或吞服 --- 答案: A
- A. 错误 B. 正确
- 108 与片剂比较, 胶囊剂的生物利用度较高 --- 答案: B
- A. 错误 B. 正确
- 109 风化性药物可制成硬胶囊剂 --- 答案: A
- A. 错误 B. 正确
- 110 吸湿性药物不宜制成硬胶囊剂 --- 答案: B
- A. 错误 B. 正确
- 111 CRH 愈大则愈不易吸湿 --- 答案: B
- A. 错误 B. 正确
- 112 生产散剂时, 相对湿度应控制在药物的 CRH 以下 --- 答案: B
- A. 错误 B. 正确

- 113 颗粒剂系指药物与适宜的辅料均匀混合，通过制剂技术压制而成的圆片状或异形片状的固体制剂 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 114 脂肪油包括椰子油及茶油等植物油 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 115 肉豆蔻酸异丙酯为无色、透明、几乎无嗅的油状液体 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 116 脂肪油不能溶解激素、挥发油 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 117 肉豆蔻酸异丙酯化学性质不稳定，易酸败 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 118 乙醇不能与水、甘油、丙二醇以任意比例混溶 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 119 聚乙二醇对一些易水解药物有一定稳定作用 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 120 糖精钠不能用于糖尿病患者 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 121 口服药品 1g 或 1ml 不得检出大肠杆菌 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 122 栓剂系指药物与适宜基质制成供食道给药的制剂 --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 123 栓剂的贮藏除另有规定外，一般应于干燥阴冷处（30℃以下）贮存 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 124 乳剂型基质有 O / W 型和 W / O 型两类 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 125 眼膏剂系指药物与适宜的基质制成的供眼用的膏状制剂 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 126 W / O 型乳剂基质色白如雪故有“雪花膏”之称 --- 答案：A

- A. 错误 B. 正确
- 127 O / W 型乳剂基质能与大量水混和，含水量较高，无油腻性，易洗除
--- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 128 W / O 型乳剂基质有“冷霜”之称 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 129 卡波姆可作水性凝胶基质 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 130 喷雾剂又称气压剂 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 131 缓释制剂用药后能在机体内较长时间维持一定的血药浓度，因而减少给药次数，方便用药 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 132 缓释和控释制剂减缓血药浓度“峰—谷”现象 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 133 经皮吸收制剂又称经皮给药系统 --- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 134 病人服从医护人员对其用药的指导，则该病人具有依从性。()
--- 答案：A
- A. 错误 B. 正确
- 135 老年人因血浆蛋白减少，可能导致血中游离药物增加。() --
- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 136 老年肥胖者对脂溶性大的药物容易产生积蓄作用。() --- 答
案：B
- A. 错误 B. 正确
- 137 老年患者因代谢、排泄减慢，容易产生慢性毒性反应。() -
-- 答案：B
- A. 错误 B. 正确
- 138 服用口服降糖药或使用胰岛素时，老年人不易出现低血糖反应。
() --- 答案：A
- A. 错误 B. 正确

139 老年人在使用心血管药物以及一些可能出现 I 型过敏反应的药物时要特别慎重。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

140 老年人患有多种疾病时, 应尽可能给予充分的药物治疗, 不能顾此失彼。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

141 因婴幼儿抵抗力低, 在感冒发热时应尽快使用有效的抗生素防治并发感染。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

142 在给婴幼儿使用镇静剂时, 年龄越小耐受力越大, 故可相对偏大剂量。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

143 阿米卡星是氨基糖苷类中毒性最小的药物, 可放心给患儿使用。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

144 喹诺酮类药物可影响软骨组织发育, 故 18 岁以下患者及妊娠哺乳妇女不推荐使用。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

145 双氯芬酸具多种抑制 PG 合成释放机制, 故更适合儿童使用。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

146 儿童生长发育快, 都需大量补充维生素和微量元素。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

147 10%葡萄糖可作为新生儿的常用补液。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

148 孕妇使用药物应考虑对胎儿的影响, 而孕妇本身与成人用药注意事项相同。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

149 孕妇用药不当造成畸胎主要出现在妊娠早期。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

150 孕妇使用泻药、利尿药等容易引起早产或流产。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

151 孕妇使用中枢神经系统药物不当，可能造成胎儿神经系统损伤。
() --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

152 阿司匹林是比较安全的解热镇痛药物，孕妇应推荐使用。()
--- 答案：A

A. 错误 B. 正确

153 酸性药物较易在乳汁中排泄。() --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

154 青霉素 G 在乳汁中浓度较高，哺乳妇禁用。 () --- 答案：
A

A. 错误 B. 正确

155 只要乳汁中药物浓度低于血浆浓度，就不会对乳儿产生影响。
() --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

156 药品说明书存在的主要问题不包括药物动力学资料欠缺或参数不统一。() --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

157 药品说明书“注意事项”应包括的内容有：影响药物疗效的食物、烟、酒等因素；影响药物疗效的病史等因素；需要慎用的情况；用药过程中需观察的情况；用药对于临床检验的影响。() --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

158 根据命名原则，药品名称包括中文名、汉语拼音名、拉丁名和英文名。() --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

159 药品说明书的撰写应遵循的原则是：资料要真实、准确、科学；文字表达要简明易懂；计量单位要统一；记载项目要全面；同一药品说明书内容要统一。() --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

160 目前我国药品命名的基本方式包括：以音译、意译或音意合译命名；以传统习俗命名；化学命名；采用通俗名；以来源或功能命名。() ---
- 答案：A

A. 错误 B. 正确

161 无首过效应的剂型包括：注射剂、栓剂、散剂、气雾剂、胶囊剂。
() --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

162 发药时药师的任务包括：全面审核处方内容；审核处方与调配药品的药品、规格、用法、用量、数量等是否一致；检查药品外观质量是否合格；核对患者姓名、性别、年龄；向患者交代具体的用法用量，增强患者用药的依从性。() --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

163 处方中药品需要做皮试的注射有：青霉素 G 钠；硫酸链霉素；精制破伤风抗毒素；盐酸普鲁卡因；细胞色素 C。() --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

164 门诊药房发药应实行小窗口发药和单剂量发药。() --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

165 药房摆放药品时应考虑以下几点：按剂型分别摆放；按内服、外用分别摆放；按药理性质、使用频率摆放；处方药与非处方药分别摆放；精神药品根据情况单柜或单抽屉存放，麻醉药品按“五专”单独加锁存放。() --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

166 医疗用毒性药品的使用管理，医疗单位医师开写毒性西药处方，可以开制剂，也可以开原料药。() --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

167 关于处方用药剂量，药物剂型单位应为片剂，胶囊剂等应以盒、瓶为单位。() --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

168 处方调配时的注意事项包括：处方内容书写是否完整、规范；药品剂量单位、规格是否准确；患者对药品有无过敏反应；处方中有无重复用药；药品名称是商品名还是通用名。() --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

169 医疗单位对一类精神药品的管理必须要有专用账册。() --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

170 处方中药品名称可以开汉语拼音名。() --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

- 171 因药品的特殊性，医院收费处人员必须具备相应的药学上岗资格认证。() --- 答案：A
A. 错误 B. 正确
- 172 处方上药品数量可用阿拉伯数字表示，也可用大写的中文数字表示。() --- 答案：A
A. 错误 B. 正确
- 173 处方包括处方前记和处方正文两部分。() --- 答案：A
A. 错误 B. 正确
- 174 剂型可以影响药物的疗效。() --- 答案：B
A. 错误 B. 正确
- 175 药典是由政府组织编写并颁布实施的。() --- 答案：A
A. 错误 B. 正确
- 176 药典凡例中的相关规定不具有法律约束力。() --- 答案：A
A. 错误 B. 正确
- 177 片剂较易出现溶出度方面的问题。() --- 答案：B
A. 错误 B. 正确
- 178 薄膜衣片可防止药物在胃内分解失效。() --- 答案：A
A. 错误 B. 正确
- 179 压片时压力过小容易导致崩解迟缓。() --- 答案：A
A. 错误 B. 正确
- 180 肠溶片可避免药物的肝脏首过效应。() --- 答案：A
A. 错误 B. 正确
- 181 中草药片剂染菌现象较化学药片剂严重。() --- 答案：B
A. 错误 B. 正确
- 182 塑料瓶的隔离作用强于玻璃瓶。() --- 答案：A
A. 错误 B. 正确
- 183 易风化药物制成胶囊剂会使胶囊壁变软。() --- 答案：B
A. 错误 B. 正确
- 184 包装材料透湿系数越小，防湿性越好。() --- 答案：B
A. 错误 B. 正确

- 185 所有液态药物均可制成胶丸。() --- 答案: A
A. 错误 B. 正确
- 186 小剂量的刺激性药物不宜制成胶囊剂。() --- 答案: B
A. 错误 B. 正确
- 187 散剂必须检查溶化性。() --- 答案: A
A. 错误 B. 正确
- 188 眼球可适应相当于 0.6%-1.5%葡萄糖溶液的渗透压。() --- 答案: A
A. 错误 B. 正确
- 189 供手术用的滴眼剂必须是无菌的。() --- 答案: B
A. 错误 B. 正确
- 190 适当增加滴眼剂溶液的粘度有利于药物的吸收。() --- 答案: B
A. 错误 B. 正确
- 191 药物的 CRH 越小越易吸湿。() --- 答案: B
A. 错误 B. 正确
- 192 多剂量包装的颗粒剂需检查装量差异。() --- 答案: A
A. 错误 B. 正确
- 193 片剂的生物利用度比胶囊剂高。() --- 答案: A
A. 错误 B. 正确
- 194 混悬剂和乳剂是非均相液体制剂, 具有物理不稳定性。() --- 答案: B
A. 错误 B. 正确
- 195 防腐剂就是为掩盖和矫正药物的不良臭味而加到制剂中的物质。() --- 答案: A
A. 错误 B. 正确
- 196 液体制剂的特点是药物分散度大、吸收快, 药效发挥迅速。() --- 答案: B
A. 错误 B. 正确
- 197 栓剂是指药物与适宜基质制成的有一定形状的供人体腔道给药的固体制剂。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

198 局部作用的栓剂只在腔道局部起作用，一般要求迅速释放药物。
() --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

199 水溶性基质的栓剂有引湿性，吸潮后表面附有水珠，俗称“出汗”。
() --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

200 软膏剂的质量要求均匀、细腻、无刺激性，一般配制应在无菌环境下进行。() --- 答案：A

A. 错误 B. 正确

201 眼膏剂常用基质为白凡士林、液状石蜡和羊毛脂的混合物。()
--- 答案：A

A. 错误 B. 正确

202 水性凝胶基质润滑作用差，易失水和霉变，常须添加保湿剂和防腐剂。() --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

203 成膜材料的性能对膜剂的质量有影响，而对药效无影响。() -
-- 答案：A

A. 错误 B. 正确

204 在膜剂的制备过程中，常添加增塑剂以增加膜剂的韧性。() -
-- 答案：B

A. 错误 B. 正确

205 吸入气雾剂主要通过胃肠道吸收，因此吸收速度较慢。() ---
答案：A

A. 错误 B. 正确

206 气雾剂由抛射剂、药物与附加剂、耐压容器和阀门系统四部分组成。
() --- 答案：B

A. 错误 B. 正确

207 所有气雾剂均具有由定量室构成的定量阀门系统。() --- 答
案：A

A. 错误 B. 正确

208 剂量很大及半衰期很长的药物不适宜制成控释制剂。() ---
答案：B

A. 错误 B. 正确

209 植入制剂不需进行无菌检查。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

210 经皮吸收制剂避免了口服给药可能发生的首过效应, 提高了治疗效果。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

211 经皮吸收制剂的药物可迅速穿透皮肤发挥药效。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

212 本身对皮肤有刺激性和过敏性的药物不宜制成经皮吸收制剂。()
--- 答案: B

A. 错误 B. 正确

213 任何药物用量过多都会产生毒性。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

214 长期服用广谱抗生素会引发二重感染, 这是一种慢性毒性反应。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

215 给药方式的吸收速度由慢到快依次为口服给药<肌肉注射<静脉注射。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

216 不同厂家生产的同一药物, 即使剂型相同, 生物利用度也可能不同。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

217 安慰剂是无药理活性的物质, 因此病人服用肯定无效。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

218 弱酸性药物如苯巴比妥、双香豆素在酸性尿中的排泄量减少。()
--- 答案: B

A. 错误 B. 正确

219 阿斯匹林对于严重胃溃疡的病人要慎用。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

220 受体激动药是指与受体结合后能使机体生理产生生理兴奋性的药物。

() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

221 若为皮肤吸收有机磷酸酯类农药例如敌百虫, 先用肥皂水清洗皮肤。

() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

222 去甲肾上腺素、肾上腺素和异丙肾上腺素均具有扩张骨骼肌血管的作用。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

223 普萘洛尔抗心绞痛的机理是减慢心率, 心收缩力降低, 耗氧量减少。

() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

224 安定和巴比妥类药物停药都具有戒断症状, 属于国际管制的精神类药物。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

225 解热镇痛药的解热、镇痛、抗炎作用机制都与抑制 PG 合成有关。

() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

226 甘露醇是利尿药, 因此容易产生电解质紊乱的不良反应。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

227 口服铁剂必须转化为 Fe^{3+} 才能被吸收。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

228 肝素可用于 DIC 高凝区, 但不可用于低凝区。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

229 碱性碳酸铋和药用炭治疗腹泻是对症治疗。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

230 精神病、消化性溃疡、病毒感染、骨质疏松、严重高血压、糖尿病都是糖皮质激素的禁忌症。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

231 甲状腺危象是由于甲状腺激素分泌严重不足, 表现为甲减症状加重。

() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

232 甲状腺危象应使用大剂量碘剂或硫脲类药物辅助治疗。() --
- 答案: B

A. 错误 B. 正确

233 肠腔内的 pH4.8-8.2, 因此弱酸及弱碱性药物均易溶解吸收。()
--- 答案: B

A. 错误 B. 正确

234 运动神经属于副交感神经。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

235 TMP 与 SMZ 的药动学和半衰期大致相同, 所以二者常合用。()
--- 答案: B

A. 错误 B. 正确

236 苯妥英钠具有抗癫痫及抗心律失常作用, 临床既可以用于治疗癫痫也可以用于治疗心律失常。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

237 二氢吡啶类抗高血压药硝苯地平属于非选择性钙通道阻滞药。()
--- 答案: A

A. 错误 B. 正确

238 红霉素是治疗军团菌最有效的首选药。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

239 磺胺类药物的作用原理是抑制二氢叶酸合成酶 () --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

240 灰婴综合症是抗真菌药物的不良反应。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

241 甲硝唑对阿米巴滋养体和包囊都有很强的直接杀灭作用, 所以对肠内外阿米巴病都有效。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

242 卡托普利的皮疹、味觉减退等不良反应可能与分子中的巯基有关。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

243 喹诺酮类药物的作用靶点是抑制原核生物的 DNA 螺旋酶和拓扑异构酶 IV。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

244 利舍平通过耗竭肾上腺素能神经末梢递质而发挥降压作用。()
--- 答案: B

A. 错误 B. 正确

245 链霉素的主要不良反应是对听神经的损害。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

246 洛伐他汀属于羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂, 是高甘油三酯血症患者的首选药物。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

247 氯沙坦能抑制血管紧张素 II 的生成, 从而具有良好的抗高血压作用。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

248 哌唑嗪是 α 受体阻断药, 阻断突触前膜的 α_2 受体而产生降压作用。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

249 普萘洛尔不宜用于变异型心绞痛。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

250 普萘洛尔适用于轻度及中度高血压, 对伴有心输出量偏高或血浆肾素水平偏高的高血压病人较好。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

251 强心苷与肾上腺素均可增强心肌收缩力, 所以均可用于慢性心功不全的治疗。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

252 强心苷治疗房颤的机制是抑制房室结传导, 阻止过多的心房冲动传到心室, 减慢心室率。() --- 答案: B

A. 错误 B. 正确

253 氢氯噻嗪通过减少血容量和降低外周阻力而发挥降血压作用。()
--- 答案: B

A. 错误 B. 正确

254 青霉素 G 是半合成抗生素。() --- 答案: A

A. 错误 B. 正确

255 硝酸甘油口服难吸收, 故抗心绞痛时常舌下给药。() --- 答

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/375033104201011334>