

2024 年河北省隆化县《执业药师之西药学专业二》考试大全附参考答案（模拟题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2015 年真题）治疗侵袭性曲霉菌病首选（ ）。

- A: 灰黄霉素
- B: 氟康唑
- C: 伏立康唑
- D: 氟胞嘧啶

答案：C

2. 不易发生“双硫仑样”反应的药物是()

- A: 头孢曲松
- B: 头孢替安
- C: 头孢哌酮
- D: 头孢他啶

答案：D

3. 剂量过大会引起高铁血红蛋白血症的是

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 硝酸甘油
- D: 地尔硫

答案：C

4. 有性激素样副作用的是()

- A: 呋塞米
- B: 氨苯蝶啶
- C: 氢氯噻嗪
- D: 螺内酯

答案：D

5. 对多巴胺描述正确的是()

- A: 对其他拟交感胺类药物高度敏感的患者应该使用多巴胺
- B: 是磷酸二酯酶抑制剂
- C: 对洋地黄和利尿药无效的心功能不全，多巴胺也无效
- D: 可用于充血性心力衰竭等引起的休克综合征

答案：D

6. 需要迅速抗血小板作用时，不宜选择的药物是

- A: 噻氯匹定
- B: 阿替普酶
- C: 普萘洛尔
- D: 硝酸甘油

答案：A

7. (2016 年真题) 属于 β 受体阻断剂的降低眼压药是

- A: 乙酰唑胺
- B: 噻吗洛尔
- C: 甘露醇
- D: 毛果芸香碱

答案：B

8. 肾上腺皮质功能不全采用

- A: 糖皮质激素一般剂量长期疗法
- B: 抗结核病药与糖皮质激素合用
- C: 糖皮质激素小剂量代替疗法
- D: 糖皮质激素大剂量冲击疗法

答案：C

9. 人体内缺乏维生素 E 时会导致()

- A: 不孕症
- B: 佝偻病
- C: 脚气病
- D: 夜盲症

答案：A

10. 下列哪种药物与碳酸钙合用时，易发生高钙血症

- A: 氧化镁
- B: 阿莫西林
- C: 四环素类
- D: 噻嗪类利尿剂

答案：D

11. 可引起心脏 Q-T 间期延长的药物是

- A: 头孢呋辛
- B: 克林霉素
- C: 左氧氟沙星
- D: 磺胺甲恶唑

答案：C

12. 替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗

- A: 慢性淋巴细胞白血病
- B: 纤维瘤
- C: 恶性淋巴瘤
- D: 脑瘤

答案：D

13. 关于利多卡因的叙述正确的是

- A: 可用于房颤的复律治疗和复律后的维持
- B: 为窄谱抗心律失常药，仅用于室性心律失常
- C: 可治疗房性期前收缩
- D: 可治疗阵发性室上性心动过速

答案：B

14. 下列关于眼部细菌感染说法错误的是()

- A: 急性期或严重的衣原体感染可口服阿奇霉素治疗
- B: 局部给予抗菌药物是眼科细菌感染疾病的首选方法
- C: 眼科术后引起细菌性眼内炎，可向眼内注射万古霉素
- D: 淋球菌性结膜炎采用眼局部抗菌药物治疗即可

答案：D

15. 组胺 H

- A: 西咪替丁 > 雷尼替丁 > 法莫替丁
- B: 法莫替丁 > 雷尼替丁 > 西咪替丁
- C: 雷尼替丁 > 法莫替丁 > 西咪替丁
- D: 雷尼替丁 > 西咪替丁 > 法莫替丁

答案：B

16. β_1 受体激动后的影响是

- A: 肌肉震颤
- B: 脂肪分解
- C: 支气管扩张
- D: 增加心率

答案：D

17. 对血小板聚集及凝血机制无影响的药品是()。

- A: 阿司匹林
- B: 罗非昔布
- C: 吲哚美辛
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

18. 可特异性拮抗肝素抗凝作用的是

- A: 氨甲环酸
- B: 鱼精蛋白
- C: 甲萘氢醌
- D: 酚磺乙胺

答案：B

19. 组胺 H

- A: 法莫替丁>雷尼替丁>西咪替丁
- B: 西咪替丁>雷尼替丁>法莫替丁
- C: 雷尼替丁>法莫替丁>西咪替丁
- D: 雷尼替丁>西咪替丁>法莫替丁

答案：A

20. 防止急性血栓的首选药物是

- A: 香豆素类
- B: 维生素 K
- C: 肝素
- D: 维生素 B

答案：C

21. 哮喘急性发作首选的药物是

- A: 布地奈德福莫特罗吸入剂
- B: 孟鲁司特片
- C: 羧甲司坦口服液
- D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：D

22. 属于 I b 类抗心律失常药的是

- A: 胺碘酮
- B: 普罗帕酮
- C: 利多卡因
- D: 奎尼丁

答案：C

23. 治疗可能引起中枢神经系统毒性，包括精神状态改变、肌阵挛和癫痫发作，故不应用于治疗脑膜炎的是

- A: 西司他丁
- B: 亚胺培南
- C: 厄他培南
- D: 美罗培南

答案：B

24. 属于膨胀性泻药的是

A: 聚乙二醇 4000

B: 酚酞

C: 甘油（开塞露）

D: 乳果糖

答案：A

25. 直接影响 DNA 结构和功能的药物是()

A: 多柔比星

B: 顺铂

C: 高三尖杉酯碱

D: 氟尿嘧啶

答案：B

26. 糖皮质激素禁用于严重高血压患者是因为

A: 抑制免疫功能，只抗炎不抗菌

B: 水钠潴留

C: 促进胃酸分泌及胃蛋白酶分解

D: 抑制蛋白质合成

答案：B

27. 多数 ACEI 的起效时间在 1 小时，作用时间可以维持

A: 6 小时

B: 12 小时

C: 24 小时

D: 36 小时

答案：C

28. 属于血小板糖蛋白 GP II b / IIIa 受体阻断剂的是

- A: 替格瑞洛
- B: 双嘧达莫
- C: 阿司匹林
- D: 替罗非班

答案: D

29. 以下不属于胰岛素的不良反应的是()

- A: 低血糖
- B: 胰岛素抵抗
- C: 脂肪萎缩与肥厚
- D: 高钾血症

答案: D

30. 严重肝功能不全、胆道阻塞患者禁用()

- A: 氯霉素
- B: 四环素可的松
- C: 夫西地酸
- D: 利福平

答案: D

31. 下列关于直接凝血酶抑制剂的优势描述，错误的是

- A: 选择性高
- B: 治疗剂量下不会引起血小板减少
- C: 可预测抗凝效果，无需监测国际标准化比值(INR)
- D: 不能灭活纤维蛋白结合的凝血酶

答案: D

32. 口服首过消除明显，常舌下给药的是

- A: 普萘洛尔
- B: 胍乙啶
- C: 阿昔莫司
- D: 硝酸甘油

答案：D

33. 四环素联用抗凝药需要

- A: 口服吸收减少
- B: 肝毒性增加
- C: 增加麦角中毒的风险
- D: 调整抗凝血药的剂量

答案：D

34. 胰岛素对代谢的作用，叙述错误的是()

- A: 促进糖原合成
- B: 减少酮体生成
- C: 抑制糖原分解
- D: 抑制脂肪合成

答案：D

35. 双香豆素与阿司匹林合用可

- A: 与其竞争结合血浆蛋白
- B: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱
- C: 产生协同作用
- D: 竞争性对抗

答案：C

36. 不属于糖皮质激素对代谢的影响的是

- A: 增强钙离子的吸收
- B: 提高蛋白质的分解代谢
- C: 增高肝糖原
- D: 升高血糖

答案：A

37. 治疗 MRSA 感染首选药物是

- A: 克林霉素
- B: 万古霉素
- C: 红霉素
- D: 林可霉素

答案：B

38. 被称为餐时血糖调节剂，无需餐前 0.5h 服用的是

- A: 利拉鲁肽
- B: 瑞格列奈
- C: 艾塞那肽
- D: 格列齐特

答案：B

39. 强效(使 LDL-ch 水平降低 $\geq 50\%$)的他汀类调血脂药是()

- A: 小剂量氟伐他汀
- B: 小剂量阿托伐他汀
- C: 大剂量阿托伐他汀
- D: 依折麦布

答案：C

40. 呋塞米发挥利尿作用的部位在

- A: 髓袢升支粗段
- B: 髓袢升支厚壁段和远曲小管初段
- C: 肾小球
- D: 近曲小管

答案：A

41. 对服用双炔失碳酯后月经周期延长或闭经者，可加服

- A: 炔雌醇
- B: 维生素 B6
- C: 去氧孕烯
- D: 甲羟孕酮和炔雌醇

答案：D

42. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 万古霉素是浓度依赖性抗菌药物
- B: 该患者用法不能维持全天稳定的血药浓度
- C: 该万古霉素浓度偏低
- D: 在使用万古霉素的第 4 个维持剂量给药前测定谷浓度

答案：A

43. 临床首选用于治疗土拉菌病和鼠疫的抗生素为()

- A: 阿米卡星
- B: 链霉素
- C: 奈替米星

D: 异帕米星

答案: B

44. 适用于 IIa、IIb 型及家族性杂合子的高脂蛋白血症，但有特殊臭味和刺激性的是

A: 考普罗布

B: 考来烯胺

C: 洛伐他汀

D: 烟酸

答案: B

45. 可阻断虫体对多种营养和葡萄糖的摄取，导致虫体糖原耗竭，致使寄生虫无法生存和繁殖的广谱驱虫药是

A: 甲苯咪唑

B: 左旋咪唑

C: 阿苯达唑

D: 哌嗪

答案: C

46. 通过选择性抑制 5-HT 再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度，从而增强 5-HT 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

A: 度洛西汀

B: 阿米替林

C: 吗氯贝胺

D: 舍曲林

答案: D

47. 属于助消化药的是()

- A: 胃蛋白酶
- B: 莫沙必利
- C: 奥美拉唑
- D: 胶体果胶铋

答案：A

48. 利福平

- A: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年
- B: 禁用于胆道阻塞患者
- C: 禁用于 8 岁以下儿童
- D: 禁用于早产儿、新生儿

答案：B

49. 不宜应用喹诺酮类药物的人群是

- A: 老年人
- B: 婴幼儿
- C: 肝病患者
- D: 溃疡病患者

答案：B

50. 在体外无抗凝作用，在体内有抗凝作用的是

- A: 噻氯匹定
- B: 尿激酶
- C: 肝素
- D: 华法林

答案：D

51. 奥昔布宁、托特罗定与索利那新的代谢酶是

A: CYP3A5

B: CYP3A4

C: CYP3A7

D: CYP2C9

答案：B

52. 抗真菌作用最强的是

A: 阿奇霉素

B: 链霉素

C: 甲硝唑

D: 两性霉素 B

答案：D

53. 延长动作电位时程的广谱抗心律失常药物是()

A: 胺碘酮

B: 美西律

C: 维拉帕米

D: 奎尼丁

答案：A

54. 室性心律失常可用

A: 地高辛

B: 普萘洛尔

C: 地尔硫草

D: 美西律

答案：D

55. 5 α -还原酶抑制剂的作用特点不包括

- A: 无心血管不良反应
- B: 可以松弛前列腺平滑肌
- C: 降低血清前列腺特异抗原 (PSA) 水平
- D: 减小增大的前列腺体积

答案：B

56. (2020 年真题) 患者，男，66 岁。BMI24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次/分。临床诊断为：(1) 心绞痛急性发作；(2) 心功能不全、心功能 III 级；(3) 高血压病 3 级；(4) 高脂血症。

- A: 氨氯地平
- B: 阿托伐他汀
- C: 呋塞米
- D: 贝那普利

答案：C

57. 只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害的是

- A: 氟他胺
- B: 曲妥珠单抗
- C: 阿那曲唑
- D: 他莫昔芬

答案：B

58. 治疗醛固酮升高引起的顽固性水肿的是

- A: 氨苯蝶啶

- B: 螺内酯
- C: 氢氯噻嗪
- D: 阿米洛利

答案：B

59. 可引起胃内压力增加和便秘的抗酸药是

- A: 碳酸钙
- B: 莫沙必利
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 奥关拉唑

答案：A

60. 可以降低血尿酸水平，但升高尿尿酸水平而导致肾结石的抗痛风药是

- A: 丙磺舒
- B: 别嘌醇
- C: 呋塞米
- D: 秋水仙碱

答案：A

61. 关于地芬诺酯的叙述，不正确的是

- A: 能提高肠张力，减少肠蠕动
- B: 长期应用可产生依赖性
- C: 可吸附肠内细菌及有毒气体
- D: 用于急、慢功能性腹泻

答案：C

62. 选择性舒张脑血管的药物是

- A: 氟桂利嗪
- B: 地尔硫革
- C: 硝苯地平
- D: 维拉帕米

答案：A

63. 可与小剂量糖皮质激素合用，能降低排异反应及感染的发生率，提高存活率的是()

- A: 硫唑嘌呤
- B: 甲泼尼龙
- C: 环孢素
- D: 环磷酰胺

答案：C

64. 选择性地兴奋 β

- A: 沙丁胺醇
- B: 扎鲁司特
- C: 奈多罗米
- D: 酮替芬

答案：A

65. 以下药物中，不属于抗胆碱能扩瞳药的是

- A: 新福林
- B: 后马托品
- C: 东莨菪碱
- D: 阿托品

答案：A

66. 氟胞嘧啶为

- A: 抗血吸虫病药
- B: 抗滴虫病药
- C: 抗病毒药
- D: 抗真菌药

答案：D

67. 因全身应用可产生严重的肾毒性、故目前仅限于局部应用的是

- A: 杆菌肽
- B: 万古霉素
- C: 替考拉宁
- D: 去甲万古霉素

答案：A

68. 与吲达帕胺合用，可导致心律失常的是

- A: 考来烯胺
- B: 胺碘酮
- C: 拟交感药
- D: 多巴胺

答案：B

69. 下列哪种头孢菌素为口服剂型

- A: 头孢替安
- B: 头孢克洛
- C: 头孢哌酮
- D: 头孢吡肟

答案：B

70. (2021 年真题) 属于阳离子型表面活性剂，可用于治疗咽喉炎的药物是 () e

- A: 氨溴索
- B: 度米芬
- C: 西地碘
- D: 羟甲唑啉

答案: B

71. 用于治疗慢性功能性便秘，也可用于治疗高血氨症的药物是

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 开塞露
- C: 酚酞
- D: 乳果糖

答案: D

72. 米诺环素属于

- A: 四环素类
- B: 酰胺醇类
- C: β -内酰胺类
- D: 氨基糖苷类

答案: A

73. 多柔比星与可能致肝功损害的药物配伍使用，可能 ()

- A: 增加心脏毒性
- B: 易产生沉淀
- C: 增加肝毒性
- D: 导致坏死性结肠炎

答案: C

74. 关于胺碘酮描述，正确的是

- A: 只对室上性心动过速有效
- B: 只对室性心动过速有效
- C: 对室上性和室性心动过速都有效
- D: 特异性针对房颤有效

答案：C

75. 用于治疗单纯性甲状腺肿的是

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 糖皮质激素
- C: 放射性碘
- D: 甲状腺素

答案：D

76. 偏头痛，三叉神经痛选用

- A: 丙戊酸钠
- B: 布桂嗪
- C: 多奈哌齐
- D: 佐匹克隆

答案：B

77. 多日化疗所致恶心及呕吐的药物预防方案是

- A: 推荐第 1 天采用 5-HT₃ 受体阻断剂联合地塞米松，第 2 和第 3 天继续使用地塞米松
- B: 推荐化疗前用三药方案，包括单剂量 5-HT₃ 受体阻断剂、地塞米松和 NK-1 受体阻断剂

C: 在化疗期间每日使用 HT3 受体阻断剂，地塞米松应连续使用至化疗结束后 2~3 天，必要时可以考虑加入阿瑞匹坦

D: 建议用单一药物，如地塞米松、5-HT3 受体阻断剂或多巴胺受体阻断剂(如甲氧氯普胺)预防呕吐

答案：C

78. 可引起胰岛素自身免疫综合征的抗甲状腺药是

A: 复方碘口服液

B: 卡比马唑片

C: 甲巯咪唑片

D: 甲状腺片

答案：C

79. 解热镇痛药的作用机制是

A: 激动 M 受体

B: 抑制前列腺素合成

C: 激动中枢阿片受体

D: 抑制尿酸生成

答案：B

80. 易致血糖异常的药物是

A: 青霉素

B: 红霉素

C: 氯霉素

D: 加替沙星

答案：D

81. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

- A: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状
- B: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成
- C: 促进尿酸分解，将尿酸转化为溶解性好的尿酸素
- D: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加

答案：A

82. 氨基糖苷类药的主要作用靶点是

- A: 核糖体的 50S 亚基
- B: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- C: 核糖体的 30S 亚基
- D: 细胞内膜 PBP

答案：C

83. 可直接抑制和杀灭皮肤表面和毛囊内的细菌，消除病原体的药物()

- A: 壬二酸
- B: 维 A 酸
- C: 阿达帕林
- D: 异维 A 酸

答案：A

84. 下列属于钾离子竞争性酸抑制剂的药物是

- A: 法莫替丁
- B: 沃诺拉赞
- C: 奥美拉唑
- D: 米索前列醇

答案：B

85. 下列属于超短效胰岛素的是()

- A: 甘精胰岛素
- B: 低精蛋白锌胰岛素
- C: 门冬胰岛素
- D: 精蛋白锌胰岛素

答案：C

86. 患者，女，12岁，身高140cm，体重32kg，因"脊柱侧弯"入院。入院后完善相关检查，拟行"脊柱侧弯截骨矫形檀骨融合内固定术"。既往有头孢类过敏史。

- A: 左氧氟沙星
- B: 阿奇霉素
- C: 克林霉素
- D: 依替米星

答案：C

87. 可用于习惯性流产的药品是()

- A: 他莫昔芬
- B: 地屈孕酮
- C: 依普黄酮
- D: 戊酸雌二醇

答案：B

88. 长期大量使用可致泌尿系统尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石的维生素是()

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 维生素 B6

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/375143334121012033>