

围产保健

一、填空题 每题 分，共 分

、母婴保健工作以保健为中心，以保障_____为目的。

答案：生殖健康

、_____是《中华人民共和国母婴保健法》颁布_____。

答案：

、王某是大专毕业生，已取得执业医师资格证书和执业证书，执业范围为妇产科，现拟在某医院从事剖宫产手术，则王某还应取得_____证书

答案：《母婴保健技术服务考核合格证书》

、围产期保健是指各级各类医疗保健机构为准备妊娠至产后_____天的产妇及胎婴儿提供全程系统的医疗保健服务。

答案：

、叶酸补充时间：_____，

答案：怀孕前三个月和怀孕后三个月

、一般待孕妇女补充叶酸的剂量为_____。

答案

、孕早期保健主要目的：_____，全面评价孕妇健康状况，筛查 宜妊娠者，提供孕早期保健指导。

答案：确定宫内妊娠

、妊娠图主要检测：_____、腹围、体重、_____、胎位、胎心、头盆关系、水肿、 蛋白七项指标。

答案：宫蒂、血压

、产前筛查主要进行 _____ 、 经管畸形和胎儿严重畸形的筛查。

答案：唐氏综合征或 三体综合征

、妊娠期某种病 或致病因素可能危害孕妇、胎儿、新生儿或导致难产，称为 _____

答案：高危妊娠

、产褥期一般以 _____ 周。

答案：

、孕产妇死亡是指指在妊娠期或 _____ 的妇女，无论妊娠时间和部位。且与任何与妊娠或妊娠有关的或因此而加重 的原因导致的死亡。

答案：妊娠终止后 7 天之内

、出生缺陷监测对象为在监测医院出生的妊娠满 _____ 周至出生后 _____ 天内的围产儿。

答案： 、

、对艾滋病、梅毒感染产妇所生婴儿应该定期随访至 _____ 月。

答案： 6 个月

、早孕最早及最重要的症状是 _____

答案：停经

、对妊娠合并严重内科疾病的高危孕妇，在孕
产检查时，应有 _____ 科会诊意见。

答案：内科

、宫颈痛的孕妇应采取应采取 _____ 方式终止妊娠。

答案：剖宫产

、子痫患者一般 主张扩容，仅当 _____ 、贫血

答案：严重低蛋白血症

二、单项选择题（每题 分，共 分）

、目前我国采用的围生期是（

、妊娠满 周至产后 周

、妊娠满 周至产后 周

、妊娠满 周到产后 周

、妊娠满 周到产后 周

、胚胎形成到产后 周

答案：

、艾滋病产妇进行母乳喂养的时候，应该服用相应的抗
病毒药物，应持续到什么时候停药？（）

、完全停止母乳喂养后的一周

、完全停止母乳喂养后的两周

、完全停止母乳喂养后的一个月

、完全停止母乳喂养后的两个月

答案：

、艾滋病母婴传播中 各时期传播危险性最大？（）

- 、孕早期
- 、孕中期
- 、孕晚期
- 、分娩期
- 、哺乳期

答案：

、持续性枕后位的特点是

腹部检查清楚可及胎背

第二产程延长

肛查感骨盆前部空虚，后部满

矢状缝在骨盆斜径上，大囟门居骨盆后方，小囟门居骨盆前方

其发生系由于骨盆入口狭窄

答案：

、下 哪项 是先兆子宫破裂 的诊断依据

先 部下 受阻，产程延长

血

病 性缩复环

血红蛋白下

下腹剧痛拒按

答案：

、初产妇临产后 小时胎头仍未入盆，此时应测 哪条径
线

对径

骶耻径

髂棘间径

坐骨棘间径

坐骨结节间径

答案：

、以下哪项条件可给予试产机会

轻 头盆 称

明显头盆 称

骨盆横径狭窄

骨盆及出口平面狭窄

出口横径与后矢状径之和 <

答案：

、下述哪种情况可使用缩宫素

宫颈水肿

头盆 称

协调性宫缩乏

协调性宫缩乏

子宫痉挛性狭窄环

答案：

、自耻骨联合下缘到骶岬上缘中点的距离是

- 骨盆入口前后径
- 中骨盆前后径
- 真结合径
- 骶耻内径
- 以上均是

答案：

答案：

、正常妊娠 期的羊水 约

- 以下
- ~
-
-
-

答案：

、下 妊娠期保健哪项是正确的

- 产前检查应从妊娠 期开始
- 早期妊娠检查，只是为 确定是否怀孕
- 产前检查应每月 次
- 无水肿的孕妇， 需要测体重
- 血压较基础血压增高 $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ 时为异常

答案：

、首次产前检查应从何时开始

- 早期妊娠
- 妊娠 4 周
- 妊娠 6 周
- 妊娠 8 周
- 妊娠 10 周

答案：

、关于胎儿电子监测，提示脐带受压的是

- 无反应型
- 加速
- 早期减速
- 变异减速
- 晚期减速

答案：

、高危妊娠时选择终止妊娠的时间应取法

- 宫颈成熟
- 宫底高
- 胎动次数
- 胎盘功能和胎儿成熟
- 胎儿电子监测

答案：

、初产妇，产程顺利，宫口开全，胎头已拔，胎心监

护头早期减速应采取的措施是

即剖宫产

产钳助产

即静滴葡萄糖液

静点缩宫素

等待自然分娩

答案：

、初产妇，产程顺利，宫口开全，胎头已拔，胎心监护

护头早期减速应采取的措施是

即剖宫产

产钳助产

即静滴葡萄糖液

静点缩宫素

等待自然分娩

答案：

、下 哪一项 是胎儿宫内发育迟缓胎儿附属物的病变

- 绒毛发育迟缓
- 绒毛膜血管瘤
- 脐动脉
- 脐带真结
- 绒毛膜血管瘤

答案：

- 、月经规 妇 ，常用推算预产期的方法是
- 末次月经干净之日
- 末次月经开始之日
- 初觉胎动的时间
- 早孕反应开始的时间
- 孕早期妇科检查时子宫大小

答案：

- 、下述是一名孕妇孕 带的各项检查的结果，其中哪
项可能是病 性的
- 心 增快
- 心界向左稍扩大
- 下肢水肿，卧床休息后 消退
- 心尖及肺动脉瓣区可闻及柔和收缩期吹风样杂音
- 劳动后呼吸加快

答案：

- 、第一产程宫颈扩张曲线，正确的是
- 潜伏期是指从感觉宫缩开始到宫颈扩张
- 潜伏期最大时间
- 宫颈扩张活跃期的加速阶段是从宫口扩张 至 ，
均需
- 活跃期最大倾斜阶段，是从 扩至 ，均需

- 活跃期减缓阶段，是宫颈扩张从 5 至 10cm，约需

答案：

- 第一产程是从何时算起
- 有 规则宫缩，伴有阴道血性分泌物 见红
- 有 规则宫缩，伴有阴道 水
- 有规则宫缩，伴有阴道少 出血
- 有规则宫缩，伴有宫颈扩张
- 有规则宫缩，伴有阴道 水

答案：

- 反映产程进展最重要的指标是
- 子宫收缩的强
- 子宫收缩的频
- 子宫收缩的节 性
- 胎头下 的程
- 是否破膜

答案：

正常分娩保护会阴的时间是

初产妇宫口开全

- 初产妇先 着冠时
- 经产妇宫口开 6 ~ 8cm，宫缩规 有 时
- 经产妇宫口开全时

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/375221032032011110>