

口腔主治醫師(口腔內科學)有關專業知識模擬試卷13

(總分:200.00, 做題時間:90分鐘)

一、A1型題(總題數:88, 分數:176.00)

1.為了防止局麻過程中出現血腫,如下防止原則錯誤的是
(分數:2.00)

- A.選擇對的的進針點、進針角度及方向
- B.在局麻藥中加入腎上腺素 ✓
- C.注射針頭不能有倒鉤
- D.深部注射時,進針不能超過規定深度
- E.防止反復多方向穿刺

解析:

2.出卵圓孔的神經是

(分數:2.00)

- A.三叉神經
- B.面神經
- C.上頰神經
- D.下頰神經 ✓
- E.眼神經

解析:

3.舌神經阻滯麻醉的部位是

(分數:2.00)

- A.舌前1/3麻醉
- B.舌尖麻醉
- C.同側舌前2/3麻醉 ✓
- D.舌前1/3麻醉
- E.對側舌前2/3麻醉

解析:

4.普魯卡因皮內過敏試驗陰性的原則是

(分數:2.00)

- A.局部紅暈直徑<3cm
- B.局部紅暈直徑<2.5cm
- C.局部紅暈直徑<2cm
- D.局部紅暈直徑<1.5cm
- E.局部紅暈直徑<1cm ✓

解析:解析:普魯卡因過敏試驗:1%普魯卡因0.1ml稀釋至1ml,皮內注射0.1ml。20分鐘後看反應。局部紅腫,紅暈直徑超過1cm者為陽性。

5.拔除鬆動乳牙最佳的麻醉措施

(分數:2.00)

- A.表面麻醉 ✓
- B.浸潤麻醉
- C.阻滯麻醉

D.针刺麻醉

E.冷冻麻醉

解析:

6.对于拔牙创的处理, 不對的 的措施是

(分数: 2.00)

A.拔除乳牙残根後彻底搔刮牙槽窝 ✓

B.扯破的牙龈组织应予缝合

C.压迫缩小扩大的牙槽窝

D.与骨膜牙龈相连的骨折片应复位保留

E.刮净拔牙创内的肉芽及碎片

解析:解析:临床拔除乳牙残根後牢记不可過度搔刮拔牙窝, 因其下方為恒牙牙胚, 以免伤及恒牙牙胚影响恒牙的正常发育。

7.张口度的對的测量措施是

(分数: 2.00)

A.上下磨牙 面之间的距离

B.上下中切牙切缘之间的距离 ✓

C.上下侧切牙切缘之间的距离

D.上下前磨牙颊尖之间的距离

E.上下尖牙之间的距离

解析:

8.口腔门诊小手术常用

(分数: 2.00)

A.仅消毒, 不铺消毒巾

B.包頭法

C.孔巾铺置法 ✓

D.三角形手术野铺巾法

E.四边形手术铺巾法

解析:

9.心脏病患者拔牙应視為禁忌证的是

(分数: 2.00)

A.一年前发生的前壁心肌梗死

B.血压170/100mmHg

C.未控制的心律不齐 ✓

D.心功能Ⅱ级

E.心功能正常的心脏病

解析:

10.成釉细胞瘤的穿刺液常為

(分数: 2.00)

A.淡黄色

B.不凝的血性液体

C.清亮的黏液

D.褐色的液体 ✓

E.草黄色液体

解析:

11. 颌面部间隙感染的病原菌

(分数: 2.00)

- A. 以金黄色葡萄球菌為主
- B. 以溶血性链球菌為主
- C. 混合性细菌感染為主 ✓
- D. 厌氧菌感染為主
- E. 特异菌感染為主

解析: 解析: 口腔颌面部感染常由金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、大肠杆菌等引起。在口腔颌面部最多見的是需氧菌与厌氧菌的混合感染。

12. 女, 15岁。不慎跌倒致左髌突骨折。CT示骨折线位于关节翼肌窝上方。髌突断端也許的位移方向是

(分数: 2.00)

- A. 向前移位
- B. 向後移位
- C. 向内移位 ✓
- D. 向外移位
- E. 不移位

解析:

13. 不适宜行组织活检术的肿瘤為

(分数: 2.00)

- A. 舌癌
- B. 黏液瘤
- C. 骨肉瘤
- D. 颈動脉体瘤 ✓
- E. 惡性淋巴瘤

解析:

14. 卢德维希(Ludwig's)咽峡炎指

(分数: 2.00)

- A. 化脓性扁桃体炎
- B. 化脓性咽峡炎
- C. 腐败壞死性口底蜂窝织炎 ✓
- D. 腐败壞死性齦口炎
- E. 粒细胞缺乏症

解析:

15. 唇疔较少出現大块组织壞死, 這是由于

(分数: 2.00)

- A. 唇部组织表淺, 易于初期发现病变
- B. 唇部血液循环丰富 ✓
- C. 感染的细菌毒力较低
- D. 唇部运动频繁, 细菌不易滞留汇集
- E. 金黄色葡萄球菌是条件致病菌, 其侵袭力弱

解析:

16. 對因咽部肿胀压迫呼吸道导致窒息的患者, 应当

(分数: 2.00)

- A.立即行气管切開术
- B.立即行环甲膜切開术
- C.插入通气导管 ✓
- D.向外牵出舌
- E.使患者处在頭低側卧位或俯卧位

解析:解析:對於咽部和舌根肿胀压迫呼吸道的伤员,可經口插入通气管道,如紧急状况又無合适导管時可用1~2根粗針頭作环甲膜穿刺,隨即改行气管切開术。如呼吸已停止,可紧急作环甲膜切開术進行复苏,隨即改行常规气管切開术。

17.下述检查對下颌骨骨折诊断最故意义的是
(分数:2.00)

- A.頭颅後前位平片
- B.下颌骨斜側位
- C.颌骨曲面断层片 ✓
- D.华氏位
- E.定位頭颅側位平片

解析:

18.颧骨颧弓骨折引起张口受限和张口疼痛的重要原因是
(分数:2.00)

- A.颧骨颧弓骨折常同步伴有上颌骨骨折
- B.颧骨颧弓骨折常同步伴有下颌骨骨折
- C.移位的骨折片压迫颧肌和咬肌,限制喙突的活動 ✓
- D.颧骨颧弓骨折常伴有颧下颌关节的创伤
- E.颧弓骨折破壞了颧下颌关节窝的构造

解析:

19.不作初期縫合的创口是
(分数:2.00)

- A.無菌创口
- B.污染创口
- C.感染创口 ✓
- D.翻瓣去骨法拔牙後的拔牙创口
- E.有组织缺损的無菌创口

解析:解析:已发生有明显感染的创口不应作初期縫合,可采用局部湿敷,待感染控制後再行处理。

20.有关腮腺多形性腺瘤手术的论述中,錯誤的是
(分数:2.00)

- A.單純肿瘤摘除术 ✓
- B.将肿瘤连同周围腮腺组织一并切除术
- C.肿瘤在浅叶時,将肿瘤与腮腺浅叶一并切除术
- D.肿瘤在深叶時,将肿瘤连同全腮腺切除术
- E.多种术式均要保留面神經

解析:

21.有关不可复性关节盘前移位临床特性的描述,錯誤的是
(分数:2.00)

- A.关节弹响史继而间断性关节绞痛史

- B. 弹响消失而张口受限
- C. 開口時下颌偏向健側 ✓
- D. 被動檢查张口時開口度不能增大
- E. 開口時髁突運動受限

解析:

22. 如下有关成釉细胞瘤的论述哪项是错误的
(分数: 2.00)

- A. 如下颌骨体及下颌角部為常見
- B. 可使牙齒鬆動、移位或脫落
- C. 多呈多房性, 并有一定程度的局部浸潤性
- D. 不會導致下唇及頰部麻木 ✓
- E. 可導致下颌骨病理性骨折

解析:

23. 始基囊肿好发于
(分数: 2.00)

- A. 上颌前牙区
- B. 下颌磨牙及升支部 ✓
- C. 上颌尖牙区
- D. 上颌磨牙区
- E. 上下颌双尖牙区

解析:

24. 如下有关牙龈瘤的论述哪项是错误的
(分数: 2.00)

- A. 女性多見, 与內分泌有关
- B. 可以破壞牙槽骨壁
- C. 病变波及的牙齒需要拔除
- D. 病变波及的骨膜及邻近骨组织需要清除
- E. 切除後不易复发 ✓

解析: 解析: 牙龈瘤為非真性肿瘤, 但其有肿瘤的外形和生物學行為, 切除必须彻底, 否则易复发。

25. 最易发生惡变的色素痣是
(分数: 2.00)

- A. 雀斑样色素痣
- B. 复合痣
- C. 交界痣 ✓
- D. 皮内痣
- E. 毛痣

解析:

26. 成釉细胞瘤X线片上經典的临床体现是
(分数: 2.00)

- A. 呈單房型, 圓形或卵圓形
- B. 骨质膨脹, 骨密質消失
- C. 呈多房型, 房差悬殊, 可含牙, 牙根呈锯齿状吸取 ✓
- D. 常見散在性鈣化小团
- E. 邻牙被推移位或脫落

解析:

27.在有感染的肉芽创面上植皮,宜选用

(分数:2.00)

- A.表层皮片 ✓
- B.厚中厚皮片
- C.薄中厚皮片
- D.全厚皮片
- E.保留真皮下血管网全厚皮片

解析:

28.治疗三叉神经痛的首选药物为

(分数:2.00)

- A.神经营养药
- B.苯妥英钠
- C.激素类
- D.卡马西平 ✓
- E.山莨菪碱

解析:

29.三叉神经功能检查 不包括 的项目是

(分数:2.00)

- A.泪液检查 ✓
- B.温、痛觉检查
- C.角膜反射
- D.腭反射
- E.运动功能检查

解析:

30.三叉神经痛的疼痛部位位于颞下颌关节区,应属于三叉神经的哪一支疼痛

(分数:2.00)

- A.第I支
- B.第II支
- C.第III支 ✓
- D.第I、II支
- E.第II、III支

解析:

31.如下有关桥体的描述, 不对 的是

(分数:2.00)

- A.桥体的两端均与固位体连接 ✓
- B.制作桥体的材料应符合美观的规定
- C.桥体应有一定的强度
- D.在前牙区,桥体的色泽应与邻牙相似
- E.桥体应可以承受 力

解析:

32.如下哪一项 不属于 固定局部义齿的构成成分

(分数:2.00)

- A. 固定连接体
- B. 活動连接体
- C. 大连接体 ✓
- D. 栓体-栓道式连接体
- E. 焊接式连接体

解析: 解析: 固定局部义齿的连接体可分为固定连接体和活動连接体两大类, 栓体-栓道式连接体属于活動连接体范围, 焊接式连接体属于固定连接体范围, 而大连接体属于可摘局部义齿的成分, 故為本題答案。

33. 女性, 40岁。左上中切牙有瘻管, 經根管治療後, 開始修復治療的時間是 (分数: 2.00)

- A. 4天後
- B. 7天後
- C. 14天後
- D. 無主觀症狀後
- E. 待瘻管自行閉合後 ✓

解析:

34. 有关固定局部义齿的适应证和禁忌证, 如下描述 錯誤 的是 (分数: 2.00)

- A. 缺牙区的牙槽嵴頂黏膜至對颌牙 面有正常的 齦距離者, 可以采用固定橋修復
- B. 缺牙区的邻牙傾斜, 對颌牙伸長者, 不适宜采用固定橋修復
- C. 缺牙区牙槽嵴頂黏膜至對颌牙 面距離過小者, 不适宜采用固定橋修復
- D. 一般在拔牙後1個月, 拔牙創口基本癒合後, 開始固定局部义齿的制作 ✓
- E. 牙槽嵴吸取過多的後牙区, 可采用衛生橋設計

解析: 解析: 固定局部义齿的制作一般需要在拔牙後3個月進行。

35. 患者上前牙因外伤折断就醫。查: 右上颌中切牙橫向折断, 断面位于牙槽嵴根面上方, 唇側齦下2mm, 根穩固, X线片显示根管治療完善。余之正常。在修復前還需要做的合适處理是 (分数: 2.00)

- A. 洁治
- B. 刮治
- C. 齦切除 ✓
- D. 照咬合片
- E. 牙槽骨修整

解析:

36. 女, 65岁。全口牙缺失40天, 影响功能。查: 上下颌牙槽嵴中等, 双侧上颌結节明显突向颊側, 倒凹大。在修復前, 對上颌結节對的的處理措施是 (分数: 2.00)

- A. 基托組織面缓冲
- B. 使义齿旋轉就位
- C. 縮小此處基托伸展范围
- D. 患者自行按摩使骨质吸取
- E. 手術清除倒凹較大一側的骨突 ✓

解析:

37.灌石膏模型前,在孤立牙处插入小竹签的目的是

(分数:2.00)

- A.便于灌模
- B.以便脱模
- C.加强石膏牙的强度 ✓
- D.防止孤立牙产生气泡
- E.有助于上下颌模型精确对合

解析:

38.制作可摘局部义齿前的准备工作中,必须拔除的牙不包括

(分数:2.00)

- A.牙体严重破坏的牙
- B.重度松动牙
- C.重度倾斜移位的牙
- D.过度伸长牙 ✓
- E.其他对修复不利的牙

解析:解析:对于过度伸长牙可以去髓后调磨并全冠恢复,并非一定需要拔除。

39.在牙体预备中防止性展的重要目的是

(分数:2.00)

- A.消除倒凹
- B.清除无基釉
- C.防止继发龋 ✓
- D.获得共同就位道
- E.增强固位型与抗力型

解析:

40.牙冠修复体的邻面与邻牙紧密接触的目的 不是 为了

(分数:2.00)

- A.防止食物嵌塞
- B.保持牙位、牙弓形态的稳定
- C.与邻牙互相支持、分散 力
- D.保持每个牙各区的生理运动
- E.防止对 牙伸长 ✓

解析:

41.钉洞固位型一般不设在

(分数:2.00)

- A.死髓牙的 面
- B.后牙牙尖处 ✓
- C.后牙牙尖之间的沟窝处
- D.前牙舌面的切嵴与近远中边缘嵴的交界处
- E.前牙舌面窝近舌隆突处

解析:

42.基牙形态正常, 固位力最大的固位体是

(分数:2.00)

- A.嵌体
- B.全冠 ✓
- C.根内固位体
- D.部分冠
- E.桩核冠

解析:

43.金属-烤瓷结合中, 最重要的结合力是

(分数:2.00)

- A.机械结合
- B.范德华力 ✓
- C.倒凹固位
- D.化学结合
- E.压力结合

解析:

44.全口义齿患者的病史采集, 都需采集哪些内容

(分数:2.00)

- A.患者对义齿修复的过程、价格、效果的理解程度
- B.缺牙原因、缺牙时间的长短, 与否修复过
- C.年龄和全身健康状况
- D.性格和精神心理状况
- E.A+B+C+D ✓

解析:

45.恒牙期临床上最常用的矫治器是哪一种

(分数:2.00)

- A.舌侧矫治器
- B.功能矫治器
- C.活动矫治器
- D.固定矫治器 ✓
- E.以上所有类型矫治器

解析:

46. 畸形矫治的原则是

(分数:2.00)

- A.一般正常
- B.平衡
- C.个别正常 ✓
- D.理想

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/376102143005011003>