北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试试题》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：下列叙述中错误的是（　）。A.锁骨骨折最常发生在儿童

B.儿童骨骼韧性强，骨膜厚而坚韧，不易发生粉碎性骨折

C.儿童时期关节囊强度明显高于干骺端骨骺的强度，因而很少发生肘关节脱位

D.儿童肢体外伤时进行对侧相应部位X线片检查是可取的，因可能有先天畸形和不规则骨骺板的存在会引起混淆

E.斜颈的原因是颈椎先天性畸形

2、单项选择题：发育性髋关节脱位的治疗，下列正确的是（　）。A.早期宜行针灸、理疗等保守治疗，待发生畸形时再手术治疗

B.婴儿期治疗效果欠佳，年龄越小，效果越差

C.2岁以内行闭合复位，石膏固定，若整复失败可手术整复

D.6岁以上一般采用姑息手术以减少腰前凸，减轻髋痛和腰痛

E.切开复位前一般需关节造影X线定位

3、单项选择题：与特发性脊柱侧凸的发生有关的病因是（　）。A.椎体发育畸形，阻滞椎或半椎体

B.尚不清，可能与营养缺乏、生长失调、肌力不平衡有关

C.间盘退变及膨出

D.脊柱骨折及脱位畸形愈合

E.神经纤维瘤病

4、单项选择题：男新兵，18岁，军训后出现足部疼痛，在第二跖骨处出现肿胀并压痛，拍摄X线时见第二跖骨远端有梭形骨膜增生，其最可能的诊断是（　）。A.骨样骨病

B.骨软骨病

C.软骨病

D.病理性骨折

E.疲劳性骨折

5、单项选择题：骨肉瘤可采取的治疗方法为（　）。A.放射治疗

B.化学治疗

C.手术治疗

D.放射治疗+手术治疗

E.化学治疗+手术治疗

6、单项选择题：在骨肉瘤下列的治疗中，哪项较好（　）。A.肿瘤刮除加化学疗法

B.局部整块切除

C.化学疗法

D.放射治疗

E.化学疗法加肿瘤骨灭活再植后再化疗

7、单项选择题：手指主动活动障碍，被动活动正常，最常见的原因是（　）。A.指间关节及掌指关节损伤

B.屈指肌腱断裂粘连

C.前臂肌肉缺血挛缩

D.上肢主要神经断裂

E.皮肤损伤瘢痕粘连

8、单项选择题：肉瘤 X 线特征（　）。A.X 线片示：骨端膨胀性溶骨性破坏

B.X 线片示：短骨膨胀，有蜂窝状骨吸收区夹杂钙化斑块

C.X 线片示：长骨干骺端骨破坏和日光射线现象，有 Codman 三角

D.X 线片示：骨膜板层状或葱皮状反应性骨形成和骨破坏

E.X 线片示：自长骨干骺端突出的骨性病损

9、单项选择题：小夹板固定治疗骨折的优点，除了（　）。A.有效地防止骨折端再发生移位

B.便于及时进行锻炼，防止关节僵硬

C.不妨碍肌肉纵向收缩，有利于骨折愈合

D.取材方便，操作简单，并发症少

E.需要经常调整

10、单项选择题：有关先天性髋脱位的治疗原则，下列哪项是正确的（　）。A.治疗越早，效果越好

B.1 岁以内穿连衣袜套，使两髋保持在外展位，保证股骨头复位

C.1-3 岁者，以非手术疗法为主，如闭合复位确已失败，应及早行切开复位手术治疗

D.4 岁以上者，手术治疗是主要方法

E.以上都是正确的

11、单项选择题：男性，6 岁，主诉右髋关节疼痛 1 天，T36.8℃，追问病史 1 天前有剧烈活动史，查髋关节 X 线 I　　B.触诊足背和胫后动脉

C.检查膝腱或跟腱反射

D.检查肢体感觉有无缺失

E.立即做 X 线检查

14、单项选择题：骨盆环由下列哪些结构构成（　）。A.髂骨与骶尾骨

B.耻骨与骶尾骨

C.髋骨与骶尾骨

D.髋骨与尾骨

E.耻骨、坐骨与骶骨

15、单项选择题：骨与关节结核病因及病理哪项是不正确的（　）。A.抵抗力、免疫力差者易发生

B.95%以上继发于肺结核

C.是一种血行引起的慢性感染性疾病

D.股骨干血运差，易发生皮质骨结核

E.松质骨结核可分中央型和边缘型

16、单项选择题：应用滑膜切除术治疗类风湿性关节炎的手术适应证是（　）。A.关节病变尚在早期者，虽经 1 年以上药物治疗，关节肿胀和疼痛仍比较严重

B.关节肿胀主要因滑膜肥厚而持续不消

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/377052050016006102