

2024 贵州省雷山县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题完整题库【有一套】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

- A: 无正当理由超适应证用药
- B: 无适应证用药
- C: 有禁忌证用药
- D: 无正当理由过度治疗用药

答案：A

2. 对胃肠刺激较小，体内分解为两种解热镇痛药、作用时间长的是

- A: 吲哚美辛
- B: 阿司匹林
- C: 贝诺酯
- D: 布洛芬

答案：C

3. （2019 年真题）下列药物中，适宜在餐前服用的是

- A: 头孢辛酯片
- B: 莫沙必利片
- C: 双氯芬酸钠片
- D: 伊马替尼片

答案：B

4. (2018 年真题) 患者, 女, 34 岁, 因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊, 化验结果显示 TSH 增高 FT3、FT4 减低, 临床诊断为甲状腺功能减退使用左甲状腺素钠 100 μ gqd 治疗。药师对该患者的用药指导, 正确的是 ()

- A: 早餐后半小时, 顿服
- B: 早餐前半小时, 顿服
- C: 晚餐后顿服
- D: 睡前顿服

答案：B

5. 预激综合征伴房颤患者, 控制心室率时须慎用的药物为

- A: 胺碘酮
- B: 利伐沙班
- C: 去乙酰毛花苷
- D: 硝苯地平

答案：C

6. 与硫酸亚铁合用, 可减少铁吸收的是 ()

- A: 叶酸
- B: 苧丝肼
- C: 克拉维酸钾
- D: 奥美拉唑

答案：D

7. 可致昏迷及惊厥

- A: 苯妥英钠

- B: 维生素 A
- C: 抗组胺药
- D: 氯霉素

答案：C

8. 增加出血危险的配伍用药是

- A: 普萘洛尔联用硝酸酯类
- B: 山莨菪碱联用盐酸哌替啶
- C: 肝素钠联用阿司匹林
- D: 氨基糖苷类抗生素联用依他尼酸

答案：C

9. 宜于餐中服用的药品是

- A: 糖皮质激素
- B: 阿卡波糖
- C: 洛伐他汀
- D: 甲氧氯普胺

答案：B

10. 救治磷化锌中毒的过程中，立即应用的催吐药是

- A: 硫酸钠
- B: 阿扑吗啡
- C: 硫酸镁
- D: 硫酸铜

答案：D

11. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

- A: 尿酮体试验
- B: 粪便隐血试验
- C: 尿素呼气试验
- D: 尿素酶试验

答案：C

12. 痔疮的主要表现是

- A: 坠胀感
- B: 瘙痒
- C: 便后鲜血
- D: 疼痛

答案：C

13. 患儿，女，4 岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 鞣酸蛋白？
- B: 药用炭？
- C: 洛哌丁胺？
- D: 小檗碱？

答案：C

14. 关于肿瘤疼痛控制的治疗原则，叙述不正确的是

- A: 按时给药
- B: 按阶梯给药
- C: 按需给药
- D: 提倡无创给药

答案：C

15. 脂肪乳用于脂质肾病患者，属于

- A: 撒网式给药
- B: 超适应症给药
- C: 有禁忌症用药
- D: 盲目联合用药

答案：C

16. 抗结核联合治疗方案中可出现橘红色尿的药物是()

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

A: 利福平

B: 吡嗪酰胺

C: 左氧氟沙星

D: 乙胺丁醇

答案：A

17. 烫伤后药物选择不宜选用

A: 破伤风

B: 润湿烧伤膏

C: 京万红软膏

D: 甲紫

答案：D

18. 荨麻疹患者常出现

A: 血小板增多

B: 血红蛋白减少

C: 中性粒细胞增多

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：D

19. 吸烟后易出现头晕、嗜睡、疲乏等不良反应的药物是

A: 呋塞米

B: 胰岛素

C: 西咪替丁

D: 氯丙嗪

答案：D

20. 属于祛痰药的是

A: 羧甲司坦

B: 沙丁胺醇

C: 苯丙哌林

D: 羟甲唑啉

答案：A

21. (2018 年真题) 患者, 男, 38 岁, 因腹部受寒胃痉挛疼痛, 应选用的药物是 ()

A: 山莨菪碱

B: 卡马西平

C: 麦角胺咖啡因

D: 布洛芬

答案：A

22. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者, 必须迅速做出准确判断, 及时果断地采取有效的救治措施, 以挽救生命、减轻损害程度。

A: 药用炭吸附中毒物质

B: 毛果芸香碱拮抗颠茄碱类中毒

C: 二巯丙醇“驱汞”治疗

D: 弱碱中和强酸

答案：A

23. 少数人用后可出现视力降低和辨色困难

A: 金刚烷胺

B: 硝酸甘油

C: 西咪替丁

D: 布洛芬

答案：D

24. 胰岛素增敏剂

- A: 伏格列波糖
- B: 瑞格列奈
- C: 格列吡嗪
- D: 罗格列酮

答案：D

25. 乳果糖治疗功能性便秘的主要机制是

- A: 润滑并刺激肠壁，软化大便
- B: 刺激肠壁的感受神经末梢，引起肠反射性蠕动增强而排便
- C: 增强胃肠道中的蠕动反射和推进运动模式
- D: 在肠道分解，分解产物使水和电解质保留，致容积性排便

答案：D

26. 1 类手术切口应用第三代头孢菌素，应评判为

- A: 联合用药不适宜
- B: 过度治疗用药
- C: 无适应证用药
- D: 有禁忌证用药

答案：C

27. 苯妥英、地塞米松、地西泮在妊娠 26~29 周时游离药物达高峰，是由于

- A: 妊娠晚期血流动力学发生改变
- B: 血容量增加使血浆白蛋白浓度降低
- C: 胃肠活动减弱，使吸收减慢
- D: 激素分泌改变，药物代谢也受影响

答案：B

28. 影响药酶代谢、增强药物作用而危及安全用药的是

- A: 多潘立酮+维生素 C
- B: 四环素+硫酸亚铁
- C: 青霉素+丙磺舒
- D: 西咪替丁+格列本脲

答案：D

29. 成人末梢血白细胞的参考范围是

- A: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9 / L$
- B: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9 / L$
- C: $(4.0 \sim 5.5) \times 10^9 / L$
- D: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9 / L$

答案：A

30. 患者，女，66 岁，身高 156cm，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol / L，餐后血糖 11.2mmol / L，糖化血红蛋白 8.7%。

- A: 二甲双胍片
- B: 格列美脲片
- C: 阿卡波糖片
- D: 瑞格列奈片

答案：C

31. 可引起驾驶员视力模糊的药物是

- A: 双嘧达莫
- B: 抗过敏药
- C: 阿米洛利
- D: 东莨菪碱

答案：D

32. 治疗窗窄以及代谢存在较大的个体差异的药物是

- A: 茶碱
- B: 地高辛
- C: 苯妥英钠
- D: 顺铂

答案：A

33. 适用于阿司匹林哮喘伴过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

- A: 异丙托溴铵气雾剂
- B: 沙丁胺醇气雾剂
- C: 茶碱片
- D: 孟鲁司特钠咀嚼片

答案：D

34. 用于对组织无刺激性药物

- A: 肌肉注射
- B: 动脉注药
- C: 腔内注射
- D: 静脉注射

答案：A

35. 运动员在比赛前使用可快速降低体重，但容易导致脱水甚至休克的兴奋剂是

- A: 人促红细胞生成素
- B: 氢氯噻嗪
- C: 苯丙酸诺龙

D: 可待因

答案: B

36. 对于效果不易察觉或起效慢的药物，应特别提示、告知坚持服药

A: 针对患者生理及心理特点选药

B: 使用分时药盒和用药记录

C: 简化治疗方案

D: 使患者了解药物的重要性

答案: D

37. 患胸膜炎伴胸痛的咳嗽患者宜选用的药物是

A: 可待因

B: 羧甲司坦

C: 喷托维林

D: 右美沙芬

答案: A

38. 以下所列药物中，一般不会导致蛋白尿的是

A: 庆大霉素

B: 青霉素

C: 甲氨蝶呤

D: 多黏菌素

答案: B

39. 体液占体重 75%~80%，水溶性药物血中峰浓度较高，即

A: 药物吸收

B: 药物代谢

C: 药物分布

D: 药物排泄

答案：C

40. 依据生物钟规律，适宜清晨服药的是

A: 抗忧郁药

B: 调节血脂药

C: 抗过敏药

D: 平喘药

答案：A

41. 以餐后血糖升高为主，伴有餐前血糖轻度升高可以应用

A: 胰岛素增敏剂

B: 磺酰脲类

C: 胰岛素注射液

D: α -糖苷酶抑制剂

答案：D

42. 清晨 5 时至中午 11 时最低，下午 2 时至次日凌晨 1 时最高，是指

A: 肝脏合成胆固醇的规律

B: 胰岛 B 细胞的分泌规律

C: 糖皮质激素的分泌规律

D: 胃酸的分泌规律

答案：D

43. 有时需要利用所提供的参考文献去验证信息的正确性是指

A: 二级信息源

B: 四级信息源

C: 三级信息源

D: 一级信息源

答案: C

44. 餐后 0.5~1 小时给药的是

A: 阿卡波糖

B: 二甲双胍

C: 胰岛素

D: 瑞格列奈

答案: B

45. (2016 年真题) 患者，男，67 岁，因带状疱疹前来就诊，实验室检查肌酐清除率 100ml/min，医生处方阿昔洛韦片治疗，对于该患者，适宜的用法用量是 ()。

A: 0.4g，每日 5 次

B: 0.4g，每日 4 次

C: 0.4g，每日 2 次

D: 0.4g，每日 3 次

答案: A

46. 最容易受光线影响而变质的药品是

A: 胰岛素制剂

B: 氨基酸注射剂

C: 抗生素胶囊剂

D: 注射用抗生素

答案: B

47. 可用于有机磷农药重度中毒，缓慢静脉注射 1~1.2g, 30 分钟后如不显效，可重复给药，好转后逐渐停药的药物是

- A: 维生素 K1
- B: 碘解磷定
- C: 乙酰胺
- D: 亚硝酸钠

答案：B

48. (2016 年真题) 缓解视疲劳可选用的药物是 ()。

- A: 色甘酸钠滴眼液
- B: 酞丁安滴眼液
- C: 氧氟沙星滴眼液
- D: 羟甲基纤维素钠滴眼液

答案：D

49. 很多药物存在血液系统影响，会造成某些血细胞增多或减少烟酸主要会造成

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 中性粒细胞减少
- C: 嗜酸性粒细胞减少
- D: 嗜碱性粒细胞增多

答案：C

50. 患者,女,62 岁,2 型糖尿病伴下肢浮肿、活动后呼吸困难,不宜选用的药物是 ()

- A: 格列齐特
- B: 阿卡波糖
- C: 吡格列酮
- D: 二甲双胍

答案：C

51. 解救中毒的肾衰竭者（）

- A: 不能催吐
- B: 不能导泻
- C: 禁止洗胃
- D: 不能用强利尿剂

答案：D

52. 适用于有完整子宫、绝经后期仍希望有月经样出血的妇女（）

- A: 雌孕激素连续联合用药
- B: 单纯雌激素补充治疗
- C: 单纯孕激素补充治疗
- D: 雌孕激素序贯用药

答案：D

53. 适用轻中度肾功能不全者的是由肝胆排泄的

- A: 格列本脲
- B: 格列喹酮
- C: 甲苯磺丁脲
- D: 格列吡嗪控释片

答案：B

54. 患者，男，50 岁，身高 167cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查：空腹血糖 7.8mmol / L（正常值：3.9～6.1mmol / L），餐后血糖 14.8mmol / L；血尿酸 580 μmol/L（正常值：男性 180～440 μmol / L），低密度脂蛋白胆固醇 3.7mmol / L（正常值：2.1～3.1mmol / L），肌酐清除率 100ml / min。颈动脉彩超提示：动脉粥样硬化，有混合性脂质斑块。临床诊断为 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 低嘌呤饮食
- B: 控制体重
- C: 适量运动
- D: 应用阿司匹林

答案：D

55. 服用降压避风片、脉君安片、珍菊降压片等降压中成药的患者，必须慎用的化学药品是

- A: 缬沙坦
- B: 螺内酯
- C: 氢氯噻嗪
- D: 硝苯地平

答案：C

56. 发热（发烧）指人体体温升高，超过正常范围，主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况，发热分为低热、中等度热、高热、超高热。中等度热是指体温范围

- A: 39.1℃～41.0℃
- B: 37.4℃～38.0℃
- C: 38.1℃～39.0℃
- D: 37.0℃～38.3℃

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

57. 消化性溃疡抗 H. pylori 的四联疗法正确的是（）

A: 西咪替丁+胶体次碳酸铋+哌仑西平+替硝唑

B: 雷尼替丁+阿莫西林+胶体次碳酸铋+甲硝唑

C: 兰索拉唑+阿莫西林+克拉霉素+胶体次碳酸铋

D: 奥美拉唑+甲硝唑+阿奇霉素+胶体次碳酸铋

答案: C

58. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 $\mu\text{mol/L}$ (正常值: 男性 180~440 $\mu\text{mol/L}$)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

A: 二甲双胍

B: 甘精胰岛素

C: 格列齐特

D: 阿卡波糖

答案: D

59. 对紧张性头痛，长期精神比较紧张者、神经痛，推荐合并应用的非处方药是

A: 麦角胺咖啡因

B: 谷维素

C: 苯妥英钠

D: 阿司匹林

答案: B

60. 为防止血管扩张、促进毒物吸收。应用 1%氯化钠溶液洗胃应该避免的是

A: 溶液事先加热

- B: 减小注入压力
- C: 多次反复进行冲洗
- D: 最多不超过 500ml

答案：A

61. 治疗中度痤疮宜选用的药物是

- A: 维 A 酸乳膏
- B: 氢化可的松软膏
- C: 复方苯甲酸酊
- D: 阿昔洛韦软膏

答案：A

62. 下面有关帕金森病治疗的说法错误的是

- A: 药物治疗在病程晚期多数疗效不佳
- B: 康复与心理治疗是帕金森病治疗中重要的辅助措施
- C: 司来吉兰适用于帕金森病早期阶段，胃溃疡患者慎用；其可以与 5-羟色胺再摄取抑制剂一起提高疗效
- D: 药物治疗的目标是延缓疾病进展，尽可能延长症状控制的年限

答案：C

63. 运动员参赛时禁用的药品是

- A: 人促红素
- B: 多潘立酮
- C: 雷尼替丁
- D: 氨氯地平

答案：A

64. 水溶性基制软膏应存放于()。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 凉暗库
- B: 低温库
- C: 专用仓库
- D: 常温库

答案：D

65. (2021 年真题) 两性霉素 B 用 0.9%氯化钠注射液溶解，可导致 ()

- A: 产生胶状不溶物
- B: 微浑浊或沉淀
- C: 溶液变色
- D: 产生气体

答案：B

66. 患者，女，68 岁，因哮喘急性发作就医。医师处方：雾化吸入沙丁胺醇、异丙托溴铵、布地奈德混悬液，同时静脉注射氨茶碱、氯化可的松琥珀酸钠。患者用药后 3h 出现骨骼肌震颤。实验室检查：血钾 2.7mmol/L (正常参考范围 $3.5\sim 5.5\text{mmol/L}$)。引起患者不良反应的药物应该是

- A: 异丙托溴铵
- B: 氨茶碱
- C: 沙丁胺醇
- D: 布地奈德

答案：C

67. 适用于早期、轻度症状者

- A: 左旋多巴
- B: 司来吉兰

C: 苯海索

D: 恩托卡朋

答案: B

68. 具有催吐作用，在无禁忌证前提下，可用于多种毒物中毒的催吐排毒药物是

A: 阿扑吗啡

B: 昂丹司琼

C: 氯丙嗪

D: 吗啡

答案: A

69. 容易氧化的药物是

A: 阿扑吗啡

B: 胃蛋白酶

C: 青霉素类

D: 牛痘菌苗

答案: A

70. 躯干部出现鞭打状色素沉着的是

A: 白消安

B: 柔红霉素

C: 氟尿嘧啶

D: 博来霉素

答案: D

71. 肝素使用过量造成出血，特效的解救药是

A: 白蛋白

- B: 维生素 C
- C: 鱼精蛋白
- D: 阿司匹林

答案：C

72. 不需要向指定的药品经营单位采购，但需要向具有相关药品经营资质企业购买的是

- A: 高警示药品
- B: 第二类精神药品
- C: 麻醉药品和第一类精神药品
- D: 贵重药品

答案：B

73. 季节性过敏性鼻炎主要的诱因是（）

- A: 花粉
- B: 光线
- C: 热
- D: 冷

答案：A

74. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%，尿分析见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素
- B: 选用肾毒性小、副作用少的抗菌药物
- C: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高
- D: 首选针对革兰氏阳性菌的药物

答案：D

75. 有关一级信息的特点描述，错误的是

- A: 内容比二、三级信息更新
- B: 结论正确
- C: 对读者专业水平要求高
- D: 含有研究的具体细节

答案：B

76. (2016 年真题) 用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是 ()。

- A: 纳洛酮
- B: 青霉胺
- C: 乙酰胺
- D: 氟马西尼

答案：B

77. 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

- A: 每天用药最多不应超过 4 次，用药不超过 3 天
- B: 每天用药最多不应超过 5 次，用药不超过 3 天
- C: 每天用药最多不应超过 3 次，用药不超过 3 天
- D: 每天用药最多不应超过 6 次，用药不超过 3 天

答案：A

78. 患者，女，55 岁，因“反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸、胃灼热、间断积食”来诊，食管测压提示食管下段括约肌压力小于 6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑 20mgbid 强化抑酸治疗。

- A: 避免高脂饮食
- B: 戒烟酒
- C: 餐中多饮水
- D: 控制体重

答案：C

79. 应用多黏菌素、磺胺类、顺铂可能引起

- A: 尿沉渣尿酸盐
- B: 尿沉渣管型
- C: 尿沉渣结晶
- D: 尿沉渣白细胞

答案：B

80. 运动员禁用药物中，利尿剂产生的危害是

- A: 易造成人体严重脱水、肾衰竭
- B: 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖
- C: 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡
- D: 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患

答案：A

81. 可用于香豆素类杀鼠药中毒药物是

- A: 乙酰胺

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

B: 亚硝酸钠

C: 碘解磷定

D: 维生素 K1

答案：D

82. 枸橼酸铋钾所致的主要不良反应是

A: 神经毒性

B: 皮炎

C: 腹痛

D: 性功能减退

答案：A

83. 多黏菌素可能引起

A: 尿葡萄糖

B: 尿蛋白

C: 尿胆红素

D: 尿液隐血

答案：B

84. 患者，男，72 岁，因“冠心病、高血压、2 型糖尿病”长期用药治疗，服用药物包括阿司匹林肠溶片、马来酸依那普利片、辛伐他汀片、富马酸比索洛尔片、盐酸二甲双胍缓释片、格列美脲片、硝酸甘油片。近日患者出现一些药物不良反应症状，前来药店咨询药师。

A: 富马酸比索洛尔

B: 阿司匹林

C: 盐酸二甲双胍

D: 辛伐他汀

答案：B

85. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg。1 天前开始发热，体温 39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，每间隔 2~3 小时排 1 次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9 / L$ ，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 分泌性腹泻
- B: 消化不良性腹泻
- C: 动力性腹泻
- D: 感染性腹泻

答案：D

86. 抗胆碱药或抗过敏药用于伴有青光眼患者，应评判为

- A: 无适应证用药
- B: 有禁忌证用药
- C: 过度治疗用药
- D: 联合用药不适宜

答案：B

87. 患者，男，36 岁，因发热、咳嗽就诊，查血常规：白细胞计数

$6.28 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 65.7%，淋巴细胞百分比 15.1%。诊断为感冒。医生处方：阿奇霉素片 0.5g qd po. 该处方属于()

- A: 有配伍禁忌
- B: 有禁忌证用药
- C: 无适应证用药
- D: 用法、用量不适宜

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/378037124043007022>