

## 2024 年河北省隆化县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题【名师系列】

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2018 年真题）患者，男，58 岁，体重 68kg，高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰，伴发热，入院查体 BP：120/80mmHg，T38.9℃。化验结果：白细胞计数  $14.6 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 86%。胸片示：右下肺纹理增粗，诊断为社区获得性肺炎，青霉素皮试阳性。

- A: 莫西沙星
- B: 阿莫西林
- C: 头孢吡肟
- D: 氨苄西林

答案：A

2. 患者，男，72 岁，既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。1 个月前因出现哮喘症状就诊。医师处方：布地奈德气雾剂 200  $\mu g$  bid 吸入，沙丁胺醇气雾剂 100  $\mu g$  pm 吸入，氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg pm 舌下含服。

- A: 非洛地平
- B: 普萘洛尔
- C: 缬沙坦
- D: 维拉帕米

答案：C

3. 下列临床试验分期中，属于上市后药品临床再评价阶段的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- A: III期临床试验
- B: IV期临床试验
- C: IIa 期临床试验
- D: I 期临床试验

**答案：B**

4. 属于 A 级的药物是

- A: 沙利度胺
- B: 万古霉素
- C: 阿莫西林
- D: 葡萄糖

**答案：D**

5. 下列症状不是高血压的临床表现的是

- A: 头晕
- B: 头痛
- C: 心悸
- D: 口干

**答案：D**

6. 铁剂联用维生素 C，可增加疗效的机制是（）

- A: 作用于不同的靶点
- B: 协同作用
- C: 促进机体的吸收利用
- D: 延缓或降低抗药性

**答案：C**

7. 餐后服用可以增加吸收的药物是（）

- A: 左甲状腺素钠片
- B: 维生素 B2 片
- C: 磷酸铝凝胶
- D: 头孢拉定胶囊

**答案：B**

8. 血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的 8%~9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下，血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

- A: 中性粒细胞
- B: 淋巴细胞
- C: 单核细胞
- D: 嗜碱性粒细胞

**答案：D**

9. 与阿米卡星合用会影响其排泄导致急性肾损害的药物是()

- A: 伏立康唑
- B: 阿司匹林
- C: 维生素 B
- D: 铝碳酸镁

**答案：B**

10. 属于胃食管反流病的食管外症状的是 ( ) (消化性溃疡病的治疗)

- A: 反流
- B: 烧心
- C: 哮喘
- D: 上腹部烧灼感

**答案：C**

11. (2018 年真题) 由带状疱疹所致的严重后遗神经痛, 应选的药物是  
( )

- A: 芬太尼透皮贴剂
- B: 卡马西平片
- C: 羟考酮缓释片
- D: 对乙酰氨基酚片

**答案：B**

12. 主要用于降低三酰甘油的药物是

- A: 考来烯胺
- B: 他汀类
- C: 普罗布考
- D: 贝丁酸类

**答案：D**

13. 患者, 女, 40 岁, 既往有风湿性心脏病病史, 近 2 年来出现劳累性呼吸困难, 1 天前因受凉出现发热、咳嗽, 咳粉红色泡沫样痰, 不能平卧。查体: 半卧位, 口唇紫绀, 两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 西地兰
- B: 阿替洛尔
- C: 硝普钠
- D: 卡托普利

**答案：A**

14. 属于药师参与临床药物治疗、提供药学服务的重要方式和途径的是

- A: 处方调剂

- B: 参与健康教育
- C: 治疗药物监测
- D: 药物信息服务

**答案：C**

15. 为使铁剂更好的被人体吸收，宜同时应用

- A: 叶酸+维生素 B12
- B: 硫酸亚铁
- C: 亚叶酸钙
- D: 维生素 C

**答案：D**

16. 患者，男，50 岁，主诉咳嗽，症状持续 8 天，现在每次咳嗽都伴有黄痰，由于咳嗽感到疲劳和睡眠困难，近期末患其他疾病。患者 14 岁的儿子最近患轻度感冒，无恶心、呕吐、发热及畏寒。既往史：服用赖诺普利控制高血压、服用阿托伐他汀治疗高脂血症、服用小剂量阿司匹林预防脑卒中。查体：体温 37.1℃、心率 70 次/分、血压 130/70mmHg、呼吸 18 次/分，动脉血氧饱和度为 98%，肺部可闻及喘鸣音。

- A: 肺气肿
- B: 社区获得性肺炎
- C: 急性支气管炎
- D: 肺结核

**答案：C**

17. 患者，女，43 岁。近 3 月来午后低热，剧烈咳嗽，痰中带血，进食少，乏力，消瘦，应用抗菌药及止咳化痰药物无效，X 线检查未见异常，血沉未见增快，痰中找到结核菌，临床诊断为肺结核。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- A: 定期随诊，监测血常规和肝肾功能
- B: 肺结核属于传染病，患者咳嗽、打喷嚏和高声讲话时不能直向旁人
- C: 由于增加不良反应，不提倡联合用药
- D: 应全程督导服药，提高用药的依从性

**答案：C**

18. 起效相对较慢，需 2~4 周，持续治疗可增加抗焦虑疗效的药物是

- A: 地西洋
- B: 丁螺环酮
- C: 苯海索
- D: 加兰他敏

**答案：B**

19. 对局部发生水疱和糜烂者可选用

- A: 10%氧化锌软膏
- B: 赛庚啶
- C: 溃疡膏
- D: 10%樟脑软膏

**答案：A**

20. 使用后不能饮酒或含酒精饮料，以免发生“双硫仑样反应”的药物是

- A: 氯己定含漱液
- B: 西地碘含片
- C: 甲硝唑含漱液
- D: 地塞米松粘贴片

**答案：C**

21. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

- A: 病区领药单
- B: 药品出库单
- C: 病区用药医嘱单
- D: 临床诊断书

**答案：C**

22. 老年 CAP 患者。不能选用的治疗药物是

- A: 第三代头孢菌素
- B: 大环内酯类
- C: 碳青霉烯类
- D: 氟喹诺酮类

**答案：D**

23. 氯霉素（在肝脏与葡萄糖醛酸结合后排泄）半衰期成人为 4 小时，新生儿则为 25 小时，即

- A: 药物代谢
- B: 药物中毒
- C: 药物分布
- D: 药物吸收

**答案：A**

24. 吩噻嗪类抗精神病药中毒癫痫发作时给予（）

- A: 阿托品
- B: 去甲肾上腺素

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

C: 有机硫类

D: 苯妥英钠

**答案: D**

25. 患者，男，62 岁，糖尿病病史 7 年，长期使用胰岛素、二甲双胍治疗，近期为控制血压加服治疗药物，该患者不宜应用的药物是

A: 普萘洛尔

B: 卡托普利

C: 洛伐他汀

D: 氢氯噻嗪

**答案: A**

26. 对目标适应证患者的治疗作用的初步评价是指

A: 临床预试验

B: II 期临床试验

C: I 期临床试验

D: III 期临床试验

**答案: B**

27. 患者，男，60 岁，因上臂出现湿疹到药店购药，药师应推荐的药品是()

A: 10%樟脑软膏

B: 利巴韦林软膏

C: 特比萘芬乳膏

D: 氢化可的松软膏

**答案: D**

28. 洋地黄中毒的风险因素没有

A: 心肌缺血缺氧

B: 甲状腺功能减退

C: 高钾血症

D: 低钾血症

**答案: C**

29. 以下解救中毒措施中，正确的药物拮抗是

A: 阿托品拮抗颠茄碱类中毒

B: 口服氯化铵促使苯丙胺排泄

C: 依地酸钙钠可"驱铅"

D: 二巯丙醇拮抗青霉胺

**答案: C**

30. 既无兴奋、镇静作用，又无抗胆碱、抗组胺作用的药物是

A: 丙咪嗪

B: 阿米替林

C: 氟伏沙明

D: 帕罗西汀

**答案: C**

31. 下列药源性疾病中，其诱因主要是“基础疾病因素”的是

A: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

B: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强

C: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病

D: 新生儿体内蓄积氯霉素呈现灰婴综合征

**答案: C**

32. (2018 年真题) 可引起嗜酸性粒细胞增多的药物是 ( )

A: 氯苯那敏

B: 坎地沙坦

C: 碳酸氢钠

D: 头孢氨苄

**答案: D**

33. 易引起冠脉痉挛、心肌缺血的药物是

A: 环磷酰胺

B: 阿霉素

C: 紫杉醇

D: 氟尿嘧啶

**答案: D**

34. 可提示轻度黄疸的是

A:  $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

B:  $>342 \mu\text{mol/L}$

C:  $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

D:  $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

**答案: D**

35. 轻微的反应或疾病、症状不发展、一般无需治疗，应判为

A: 中度

B: 重度

C: 弱轻度

D: 轻度

**答案: D**

36. 患者，男，68 岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天”入院。查体：体温 39.1℃，血压 138 / 80mmHg，心率 102 次 / 分，呼吸 32 次 / 分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数  $11.2 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 x 线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A: 在病原学送检后，可立即实施经验性抗感染治疗

B: 病情稳定后可从静脉给药转为口服序贯治疗

C: 抗菌药物应持续用至胸部 X 线病灶完全吸收

D: 当体温正常 48~72h 且达到肺炎临床稳定标准后，可停用抗菌药物

**答案：C**

37. 糖尿病患者应慎用的强效利尿剂是

A: 呋塞米

B: 阿米洛利

C: 氢氯噻嗪

D: 甘露醇

**答案：A**

38. 一般情况下，每张处方中开具的西药和中成药的总数目最多为

A: 3 种

B: 2 种

C: 4 种

D: 5 种

**答案：D**

39. 服用后可引起多尿驾驶员应慎用的药物是()

A: 吲达帕胺

B: 氯苯那敏

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式  
可自由下载编辑，附完整答案！

---

C: 胰酶

D: 阿司匹林

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

**答案：A**

40. 杨某，女，19 岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性啰音；WBC $>13\times 10$

- A: 青霉素 G
- B: 利福霉素
- C: 链霉素
- D: 左氧氟沙星

**答案：D**

41. 服用降压避风片、脉君安片、珍菊降压片等降压中成药的患者，必须慎用的化学药品是

- A: 缬沙坦
- B: 氢氯噻嗪
- C: 螺内酯
- D: 硝苯地平

**答案：B**

42. 具有抗肿瘤作用的抗风湿药

- A: 布洛芬
- B: 利妥昔单抗
- C: 甲氨蝶呤
- D: 塞来昔布

**答案：C**

43. 餐前 30min 服用的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 阿托伐他汀

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

C: 复方氢氧化铝

D: 伊托必利

**答案: C**

44. 可出现体位性低血压的是

A: 甲氧氯普胺

B: 苯二氮

C: 哌替啶

D: 双嘧达莫

**答案: D**

45. 急性乙醇中毒的分期大致可分为()。

A: 兴奋期和共济失调期

B: 兴奋期、共济失调期和昏睡期

C: 共济失调期和昏睡期

D: 兴奋期和昏睡期

**答案: B**

46. 育龄人群慎用，否则可引起畸胎、肿瘤和溶血性贫血风险的药物是

A: 利巴韦林

B: 阿昔洛韦

C: 脂肪乳

D: 人促红素

**答案: A**

47. 血常规是最常用的医学检查指标，血常规异常可提示人们罹患某些疾患荨麻疹患者常出现的血常规检查异常是

A: 血红蛋白减少

- B: 血小板计数增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 嗜酸性粒细胞增多

**答案：D**

48. 药物治疗结核病的原则及早用药以利于杀灭结核菌株

- A: 联合
- B: 早期
- C: 规律
- D: 适量

**答案：B**

49. 因体内肝酶不足，易发生灰婴综合征

- A: 米诺环素
- B: 阿奇霉素
- C: 氯霉素
- D: 庆大霉素

**答案：C**

50. 患者，女，21岁，未婚，患有甲状腺功能亢进症，应用丙硫氧嘧啶 150mg tid 治疗 4 个月后，出现体重增加，乏力，怕冷，突眼加重，治疗方案应该调整为()

- A: 丙硫氧嘧啶减量并加甲状腺素片
- B: 加大丙硫氧嘧啶用量
- C: 换用另一种抗甲状腺药物
- D: 放射性 I

**答案：A**

51. 对于尿液的描述正确的是

- A: 正常人每日排出尿液 1~2L，其中 50%为水分
- B: 尿量的多少主要取决于肾小球滤过率和肾小管的重吸收
- C: 正常人的尿量变化幅度不大
- D: 正常人的新鲜尿液呈弱碱性

**答案：B**

52. 质子泵抑制剂

- A: 多潘立酮
- B: 埃索美拉唑
- C: 铝碳酸镁
- D: 法莫替丁

**答案：B**

53. 治疗急性细菌性扁桃体炎的首选药物是

- A: 阿莫西林
- B: 克林霉素
- C: 莫西沙星
- D: 阿奇霉素

**答案：A**

54. (2018 年真题) 患者,女,47 岁,出现一侧颜面部骤然发作性闪痛,诊断为三叉神经痛,应选用的药物是 ( )

- A: 卡马西平
- B: 布洛芬
- C: 山莨菪碱
- D: 麦角胺咖啡因

**答案：A**

55. 在药物信息咨询中，二级信息资料最突出的优势是

- A: 能够很方便地对所需要的一级信息资料进行筛选
- B: 提供的信息最新
- C: 对某一个具体问题提供的信息全面、详实
- D: 读者能够自己评价信息，免受他人观点影响

**答案：A**

56. (2016 年真题) 含有马兜铃酸的中药，可引起的典型药源性疾病是 ( )。

- A: 消化性溃疡
- B: 粒细胞减少症
- C: 慢性肾衰竭
- D: 溶血性贫血

**答案：C**

57. 患者，女，58 岁，罹患肺癌，术后化疗 3 次，半年后复发，决定使用安罗替尼 12mgqd 靶向治疗，既往有乙型肝炎病史，患者用药期间应密切监视的特殊不良反应是

- A: 乙型肝炎复发
- B: Q—T 间期延长
- C: 出血
- D: 腹泻

**答案：C**

58. (2019 年真题) 患者，男，28 岁，外出进餐后出现腹泻，一日 6 次，水样便，无发热和腹痛症状。宜选用的药物是

- A: 复方阿嗪米特肠溶片

- B: 蒙脱石散
- C: 干酵母片
- D: 奥美拉唑肠溶胶囊

**答案：B**

59. 患者，女，52 岁，近年来发现手关节肿痛，且呈对称性，并有畸形，晨起时有僵硬现象持续 1 小时，疼痛难忍。经实验室检测示血沉 28mm / 1h，指尖关节的 X 线片显示受累关节有骨侵蚀特征。

- A: 软骨病
- B: 类风湿关节炎
- C: 骨性关节炎
- D: 骨质疏松症

**答案：B**

60. 高血压合并消化性溃疡者不宜用

- A: 吲达帕胺
- B: 硝苯地平
- C: 比索洛尔
- D: 利血平

**答案：D**

61. 静脉药物配置的环境条件要求是

- A: 万级洁净、密闭环境下，局部千级净化的操作台上
- B: 千级洁净、密闭环境下，局部万级净化的操作台上
- C: 万级洁净、密闭环境下，局部百级净化的操作台上
- D: 万级洁净、密闭环境下，局部万级净化的操作台上

**答案：C**

62. 从患者安全、环境污染和医务人员职业暴露多角度降低风险的是

- A: 处方调配
- B: 静脉药物配置
- C: 参与临床药物治疗
- D: 治疗药物监测

**答案：B**

63. 某患者的肝功能检查结果是：ALT 与 AST 均超过正常值，且 AST / ALT 比值大于 1。此结果提示病人可能患有

- A: 急性胰腺炎
- B: 糖尿病
- C: 肝硬化
- D: 缺铁性贫血

**答案：C**

64. 根据时辰药理学，选择最适宜的给药时间，可增强药物疗效、避免不良反应、提高用药依从性减轻疾病症状(一般抑郁症状表现为晨重晚轻)的是

- A: 清晨服利尿药
- B: 清晨服抗抑郁药
- C: 清晨服氨基糖苷类
- D: 清晨服糖皮质激素

**答案：B**

65. 躯干部出现鞭打状色素沉着

- A: 博来霉素
- B: 柔红霉素
- C: 氟尿嘧啶

D: 白消安

**答案: A**

66. 对于 ACEI 类药描述错误的是

A: 唯一抑制心肌及血管重构、心室重塑的药物

B: 抑制血管紧张素转换酶 (ACE) 活性

C: 抑制交感神经活性作用

D: 明显降低全身血管阻力

**答案: C**

67. 严重肝功能减退者服用经肝、肾两种途径清除的药物时

A: 避免使用

B: 须谨慎使用，必要时减量给药

C: 一般无需调整剂量

D: 必须减量应用

**答案: D**

68. 静脉滴注青霉素的适宜溶媒是

A: 5% 葡萄糖注射液

B: 复方氯化钠注射液

C: 0.9% 氯化钠注射液

D: 50% 葡萄糖注射液

**答案: C**

69. 应用多黏菌素、磺胺类、顺铂可能引起的尿常规检查异常是

A: 尿沉渣结晶异常

B: 尿沉渣管型异常

C: 尿沉渣白细胞增多

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

D: 尿沉渣尿酸盐结晶

**答案：B**

70. 可与眼球表面和坏死组织及分泌物中的蛋白质形成极薄的蛋白膜起保护作用，高浓度时则有杀菌和凝固作用的是

A: 硫酸锌滴眼液

B: 磺胺醋酰钠滴眼液

C: 酞丁安滴眼液

D: 可的松滴眼液

**答案：A**

71. 患者，男 64 岁，身高 174cm，体重 92KG，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗

A: 阿司匹林肠溶片

B: 氨氯地平片

C: 特拉唑嗪片

D: 曲美他嗪片

**答案：C**

72. 服药后饮水可能会引起水潴留的药物是

A: 利胆药

B: 抗利尿药

C: 苦味健胃药

D: 抗尿结石药

**答案：B**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

73. 若空腹服药，则胃排空较快，药物在短时间内可进入十二指肠与小肠。餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃黏膜的刺激。因此，许多药品适宜餐后服用。

- A: 清晨服用
- B: 餐中服用
- C: 餐后服用
- D: 餐前服用

**答案：B**

74. (2018 年真题) 患者, 女, 71 岁, 2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白 (HbA1c) 9.2%, 空腹血糖 10.5mmol/L, 餐后血糖 15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo, 格列美脲片 2mgtidpo, 罗格列酮片 2mgbidpo, 甲钴胺片 0.5mgtidpo, 羟苯磺酸钙胶囊 250mgbidpo。

- A: 罗格列酮片 2mgbidpo
- B: 甲钴胺片 0.5mgtidpo
- C: 二甲双胍片 0.5gtidpo
- D: 格列美脲片 2mgtidpo

**答案：D**

75. (2019 年真题) 患者, 男, 68 岁, 既往体健, 因受凉后咳嗽、咳黄脓痰, 伴发热 2 天入院。查体: 体温 39.1℃, 血压 138/80mmHg, 心率 102 次/分, 呼吸 32 次/分, 左肺可闻及湿性啰音。化验结果: 白细胞计数  $11.2 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断: 社区获得性肺炎。

- A: 当体温正常 48~72h, 且达到肺炎临床稳定标准后, 可停用抗菌药物
- B: 病情稳定后可从静脉给药转为口服序贯治疗
- C: 抗菌药物应持续用至胸片 X 线病灶完全吸收

D: 在病原学送检后，可立即实施经验性抗菌治疗

**答案：C**

76. 不易产生耐受性，对 CYP2C19 快代谢的胃食管反流病人群，推荐长期维持治疗的抑酸剂是

A: 伊托必利

B: 法莫替丁

C: 泮托拉唑

D: 奥美拉唑

**答案：C**

77. 嗜酸性粒细胞增多可能提示的疾患是

A: 过敏性疾病如荨麻疹

B: 病毒感染性腹泻

C: 铅、钡中毒

D: 感染性疾病如肺结核

**答案：A**

78. 某女孩，6 岁，2 个月来反复突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视，呼之不应，手中物体掉落，但从不跌倒，持续数秒钟缓解。

A: 苯妥英钠

B: 丙戊酸钠

C: 卡马西平

D: 地西洋

**答案：B**

79. 关于透析患者使用磷结合剂的下列叙述错误的是

- A: 高磷血症会导致心脏、血管的钙化
- B: 透析患者服用钙剂的量大时易出现高钙血症
- C: 透析患者服用磷结合剂的钙剂目的是为了补钙
- D: 透析患者服用钙剂必须在进食的同时服用

**答案：C**

80. 下列药学服务的重要的人群中，特殊人群是指

- A: 应用特殊剂型者
- B: 药物治疗窗窄、需要做监测者
- C: 肝肾功能不全者
- D: 需要重新选择药品或调整用药方案者

**答案：C**

81. 1 级高血压标准是

- A: 收缩压 120~139mmHg 和(或)舒张压 80~89mmHg
- B: 收缩压  $\geq 180$ mmHg 和(或)舒张压  $\geq 110$ mmHg
- C: 收缩压 160~179mmHg 和(或)舒张压 100~109mmHg
- D: 收缩压 140~159mmHg 和(或)舒张压 90~99mmHg

**答案：D**

82. 马兜铃酸可导致药源性肾病的机制是

- A: 不可逆性肾小管坏死
- B: 阻塞肾小管、肾小球
- C: 肾间质纤维化
- D: 前列腺素合成障碍

**答案：C**

83. 下列物质口服中毒后，解救时不宜洗胃的是

- A: 汽油
- B: 重金属
- C: 砒霜
- D: 乐果

**答案：A**

84. 服用柳氮磺吡啶的注意事项不正确的是

- A: 服用期间应避免饮水
- B: 禁用于对磺胺类药物过敏者
- C: 服用期间应多饮水
- D: 必要时服用碱化尿液的药物

**答案：A**

85. 在患者药物治疗的每一个不同阶段（入院、转科或出院时），药师通过与患者沟通或复核，了解其在医疗交接前后的整体用药情况是否一致，与医疗团队一起对不适当的用药方案进行调整，并做详细全面的记录，从而预防医疗过程中的药物不良事件，保证患者用药安全的过程。这一深入开展的药学服务属于

- A: 药学干预
- B: 处方审核
- C: 药物重整
- D: 药物评价

**答案：C**

86. 患者，女，5岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式  
可自由下载编辑，附完整答案！

---

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/378060133044007022>