

内科理论知识试题库

1、溃疡性结肠炎癌变大多发生于发病

- A、20. 年. 后
- B、10. 年. 内
- C、2 年内
- D、5. 年. 内
- E、10 年后

答案：E

2、克罗恩病与其他病鉴别时的检查方法，最重要的是

- A、血清溶菌酶浓度测定
- B、回结肠镜检
- C、胃肠钡餐检查
- D、粪便脂肪含量测定
- E、粪便常规及培养

答案：B

3、以下哪项药物可用于治疗重症酒精性肝炎

- A、糖皮质激素
- B、美沙拉嗪. 返回
- C、TNF- α 拮抗剂
- D、维生素 C
- E、维生素 A

答案：A

4、参与速发型支气管哮喘的主要免疫细胞为

- A、肥大细胞
- B、中性粒细胞
- C、T 淋巴细胞
- D、血小板
- E、巨噬细胞

答案：A

5、肝性脑病患者昏迷期下列表现不正确的是

- A、瞳孔散大
- B、脑电图出现 δ 波
- C、意识完全丧失

D、可引出扑翼样震颤

E、阵发性抽搐

答案：D

6、治疗食管静脉曲张破裂出血，以下哪项措施最适宜

A、PAMBA 静脉点滴

B、三腔二囊管压迫

C、曲张静脉硬化剂注射

D、生长抑素

E、垂体后叶素静脉点滴

答案：D

7、慢性呼吸衰竭急性加重的最常见诱因是

A、使用镇静剂

B、急性呼吸道感染

C、过度疲劳

D、高浓度吸氧. 返回

E、精神紧张

答案：B

8、下列哪一项不是睡眠呼吸暂停综合征夜间常见的临床表现

A、打鼾

B、呼吸暂停

C、遗尿

D、多汗

E、头晕乏力

答案：E

9、风心病二尖瓣狭窄, 瓣口面积在 0 时开始出现症状

A、 $<10\text{cm}^2$

B、 $<4.0\text{cm}^2$

C、 $<1.5\text{cm}^2$

D、 $>1.5\text{cm}^2$

E、 $10\sim15\text{cm}^2$

答案：C

10、溃疡性结肠炎最常见的症状是

A、腹痛及腹部不适

- B、肛门排气减少
- C、恶心、呕吐
- D、食欲缺乏
- E、腹泻及里急后重

答案：E

11、可加重反流症状的药物是

- A、雷尼替丁
- B、硝酸甘油
- C、酚妥拉明
- D、呋塞米
- E、卡托普利

答案：B

12、房间隔缺损的典型体征是

- A、肺动脉瓣区第二心音减弱
- B、肺动脉瓣 3 级以上收缩期杂音
- C、第二心音分裂，吸气增强
- D、肺动脉瓣 2~3/6 级收缩期杂音
- E、肺动脉瓣 2~3/6 级舒张期杂音

答案：D

13、大量胸腔积液 X 线胸片的典型表现是

- A、肋膈角变钝
- B、纵隔向健侧移位
- C、患侧胸部外高内低反抛物线致密阴影
- D、患侧膈肌抬高
- E、气管被推向健侧

答案：C

14、以下哪种疾病最容易发生夜间阵发性呼吸困难

- A、肺源性心脏病
- B、房间隔缺损
- C、慢性缩窄性心包炎
- D、高血压病
- E、肺动脉瓣狭窄

答案：C

15、糖尿病肾病合并. 高血压患者，宜首先使用

- A、利尿剂
- B、 α 受体阻滞剂
- C、钙通道阻滞剂

D、 β 受体阻滞剂

E、ACE 抑制剂

答案：E

16、溃疡性结肠炎病变多位于

A、回肠末端及升结肠

B、降结肠

C、回盲部

D、直肠及乙状结肠

E、全结肠

答案：D

17、一肾病综合征患者使用利尿剂后，出现右下肢水肿加重伴皮温升高，应考虑

A、肾病综合征加重

B、右下肢深静脉栓塞

C、并发右下肢感染

D、痛风发作

E、右下肢皮肤丹毒

答案：B

18、溃疡性结肠炎发生以下情况可考虑手术治疗，除外

A、癌变

B、暴发型溃结

C、肠穿孔

D、中毒性巨结肠内科治疗无效

E、脓肿和瘘管形成

答案：B

19、不符合肝功能不全的临床表现是.

A、肝性脑病

B、皮肤黏膜出血

C、蜘蛛痣

D、食管静脉曲张

E、男性乳房发育

答案：D

20、IgA 肾病光镜病理主要病变特点是

A、肾小球毛细血管内增生

- B、毛细血管外增生
- C、系膜细胞的增殖和系膜基质的增多
- D、新月体形成
- E、肾小球基底膜的增厚

答案：C

21、慢性胃炎的确诊主要依赖于

- A、胃液分析
- B、X线钡餐检查
- C、抗壁细胞抗体和抗内因子抗体检测
- D、幽门螺杆菌检测
- E、胃镜检查 and 胃黏膜活检

答案：E

22、肝细胞损伤型药物性肝病的诊断标准为

- A、ALT/AST $\geq$ 2
- B、AST $>$ 正常上限 2 倍
- C、ALT 停药后 1~2 个月恢复正常
- D、ALT $>$ 正常上限 2 倍，ALT / AST $\geq$ 5, ALT 停药后 1~2 个月恢复正常
- E、AST $>$ 正常上限 3 倍

答案：D

23、以下哪项不属于慢性药物性肝病

- A、慢性肝炎
- B、肝纤维化
- C、胆汁淤积型药物性肝病
- D、脂肪肝
- E、磷脂沉积症

答案：C

24、区别血尿与血红蛋白尿的主要方法是

- A、做尿胆原试验
- B、观察血尿颜色
- C、做尿隐血试验
- D、做尿三杯试验
- E、做尿沉渣镜检

答案：E

25、关于原发性肝癌的临床表现，描述错误的是

- A、如肝癌位于肝横膈面则肝下缘可不肿大
- B、起病隐匿，早期缺乏典型症状
- C、可有肝硬化表现
- D、黄疸多在早期出现
- E、亚临床肝癌可没有任何症状及体征

答案：D

26、以下哪项不是急进性肾小球肾炎正确的处理方法

- A、可采用血浆置换疗法
- B、尽早采用扩张肾血管的药物
- C、适时透析治疗
- D、可采用甲泼尼龙冲击疗法
- E、及时行肾活检确诊

答案：B

27、肝素过量可用于中和的药物是

- A、抗淋巴细胞球蛋白
- B、鱼精蛋白
- C、抗胸腺细胞球蛋白
- D、丙种球蛋白
- E、白蛋白

答案：B

28、肝癌患者进展迅速，持续高热，谷丙转氨酶明显升高，其临床分型多属于

- A、炎症型
- B、胆管细胞型
- C、硬化型
- D、巨块型
- E、结节型

答案：A

29、肺炎球菌肺炎与其他肺炎鉴别，最主要的是

- A、血液免疫学检查
- B、肺部实变征
- C、口角和鼻周出现单纯性疱疹
- D、起病急促，寒战，高热

E、咳嗽，咳铁锈色痰

答案：E

30、结核性腹膜炎与自发性腹膜炎最重要的鉴别点是

A、腹水为渗出性

B、肝功能有异常

C、B超检查肝脏波形有变化

D、腹腔镜所见有特征性改变

E、PPD 试验阳性

答案：D

31、肺炎球菌在肺泡内繁殖，致肺段或肺叶实变的扩散途径为

A、经淋巴管播散

B、细菌荚膜破坏肺泡壁

C、血行播散

D、沿支气管播散

E、经 Cohn 氏孔播散

答案：E

32、万古霉素为下列哪种肺炎的首选药物

A、肺炎链球菌肺炎

B、军团菌肺炎

C、肺炎支原体肺炎

D、葡萄球菌肺炎

E、肺炎克雷白杆菌肺炎

答案：D

33、中毒型细菌性痢疾的特点是

A、有明显的腹泻及脓血便

B、常由毒力强的志贺氏菌引起

C、常好发生于老年人

D、容易转为慢性细菌性痢疾

E、可以出现滤泡性肠炎的变化

答案：E

34、频发室性期前收缩的定义是

A、室性期前收缩 >10 次/h

B、室性期前收缩 >30 次/h

- C、室性期前收缩 >60 次/h
- D、室性期前收缩 >5 次/h
- E、室性期前收缩 >100 次/h

答案：B

35、急性胰腺炎腹痛机制与下列因素有关，除外.

- A、胰腺肿胀，牵拉包膜神经末梢
- B、消化道出血
- C、炎症累及肠道，引起肠胀气、肠麻痹
- D、胆道炎症、结石
- E、胰液渗出刺激腹膜

答案：B

36、心电图确定房性期前收缩的最主要依据是

- A、Q-T 间期的时限
- B、QRS 波群形态
- C、代偿间歇是否完全
- D、P' 波的形态及位置
- E、P-R 间期的时限

答案：D

37、主动脉瓣狭窄致猝死的常见原因是

- A、主动脉瓣口面积 1cm^2 左右出现
- B、心排血量不足致脑供血不足
- C、急性心肌缺血致心肌梗死
- D、急性左心衰竭
- E、急性心肌缺血致心室纤颤

答案：E

38、以下哪项不是胸腔渗出液的特点

- A、黏蛋白试验 (+)
- B、胸腔积液蛋白/血清蛋白 >0.5
- C、胸腔积液蛋白定量 $>30\text{g/L}$
- D、比重 >1.018
- E、细胞数 $>200 \times 10^6/\text{L}$

答案：E

39、溶血最直接的证据是

- A、尿中尿胆原增多
- B、骨髓红系细胞比例增高
- C、红细胞寿命缩短
- D、网织红细胞增多

答案：D

40、可引起血压升高的血管活性物质是

- A、内皮素
- B、一氧化氮
- C、前列环素
- D、缓激肽
- E、心钠素

答案：A

41、多发性骨髓瘤最主要的治疗是

- A、放射治疗
- B、支持治疗
- C、糖皮质激素
- D、雄性激素

答案：D

42、引起右心衰竭的临床表现的主要原因是

- A、毛细血管通透性升高
- B、周围器官血供不足
- C、体循环淤血
- D、左心室舒张末期压升高
- E、肺淤血、肺水肿

答案：C

43、下列哪项不符合慢性肺心病肺、心功能代偿期的临床表现

- A、三尖瓣区可听到Ⅱ级收缩期杂音
- B、活动后心悸、呼吸困难
- C、肺呼吸音减弱，可闻及干、湿性啰音
- D、肺动脉瓣区第二心音减弱
- E、慢性咳嗽、咳痰、气促

答案：D

44、急性前壁心肌梗死最常见的心律失常是

- A、房室交界区性心律失常
- B、心房扑动
- C、阵发性室上性心动过速
- D、窦性停搏
- E、室性期前收缩和室性心动过速

答案：E

45、腹水量超过 0 时，体检可发现移动性浊音

- A、 500ml
- B、 200ml
- C、 300ml
- D、 1000ml
- E、 100ml

答案：D

46、尿毒症患者，下列哪些症状与继发性甲旁亢无关

- A、肾性骨营养不良症
- B、皮肤瘙痒
- C、胃肠道症状
- D、心包炎
- E、神经系统症状

答案：C

47、下列不是二尖瓣关闭不全的听诊特点的是

- A、第三心音
- B、心尖区全收缩期杂音
- C、杂音吸气增强
- D、第一心音减弱
- E、可向左腋下和左肩胛下区传导

答案：C

48、以下哪项心律失常听诊心律不规则

- A、莫氏 H 型房室传导阻滞 2：1 传导
- B、房颤伴 II 度房室传导阻滞
- C、莫氏 I 型房室传导阻滞
- D、室上性心动过速
- E、房扑 4：1 传导

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378070067011006052>