

2024 吉林省绿园区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库附下载答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2018 年真题）配制静脉输液时，应选择氯化钠注射液或乳酸钠林格注射液稀释，不得使用葡萄糖注射液稀释的抗真菌药是（）

- A: 卡泊芬净
- B: 氟康唑
- C: 两性霉素 B
- D: 伏立康唑

答案：A

2. 作用机制是抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶 IV 的药物是

- A: 异烟肼
- B: 红霉素
- C: 氧氟沙星
- D: 阿莫西林

答案：C

3. 作用于二氢叶酸合成酶，干扰叶酸合成的第一步的是

- A: 磺胺甲噁唑（SMZ）
- B: 甲氧苄啶（TMP）
- C: 莫西沙星
- D: 替硝唑

答案：A

4. 适用心绞痛患者的钙通道阻滞剂药物是

- A: 哌唑嗪
- B: 硝酸甘油
- C: 普萘洛尔
- D: 硝苯地平

答案：D

5. 患者，男，45 岁。以"间断巩膜黄染伴腹胀 2 年，加重 1 周"之主诉入院。患者 2 年前无明显诱因出现巩膜黄染，伴有腹胀，在当地医院诊断为酒精性肝硬化。1 周前患者上述症状加重，胃镜检查：胃溃疡(A

- A: 复方甘草酸苷
- B: 水飞蓟宾
- C: 氢化可的松琥珀酸钠
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：A

6. 通过与寄生虫肠细胞微管蛋白特异性结合而干扰其细胞微管形成，可使寄生虫肠道超微结构退化，从而破坏寄生虫对葡萄糖的吸收及消化功能，最终导致寄生虫死亡的药物是

- A: 哌嗪
- B: 甲苯咪唑
- C: 左旋咪唑
- D: 阿苯达唑

答案：B

7. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用镇咳药的同时，应及时联合应用的药品是

- A: 左氧氟沙星

B: 羧甲司坦

C: 多索茶碱

D: 泼尼松龙

答案：B

8. 吸入用布地奈德混悬液抗炎作用是氢化可的松的

A: 25 倍

B: 100 倍

C: 15 倍

D: 40 倍

答案：B

9. 糖尿病酮症酸中毒患者宜选用

A: 二甲双胍

B: 珠蛋白锌胰岛素

C: 格列喹酮

D: 正规胰岛素

答案：D

10. 对女性能促进和维持黄体功能使黄体合成孕激素，对男性能使垂体功能不足者的睾丸产生雄激素，促使睾丸下降和男性第二性征的发育，从妊娠期妇女尿中提取的促性腺激素类药物是

A: 戈那瑞林

B: 绒促性素

C: 溴隐亭

D: 双炔失碳酯

答案：B

11. ACEI 与 () 联合应用时，可能影响后者的促红细胞生成作用。

- A: 噻嗪类利尿剂
- B: 人促红素
- C: β 受体阻断剂
- D: 留钾利尿剂

答案：B

12. 属于嘌呤类抗代谢类药物的是 ()

- A: 巯嘌呤
- B: 吉西他滨
- C: 长春瑞滨
- D: 甲氨蝶呤

答案：A

13. (2021 年真题) 水溶性他汀类药物能够选择性抑制肝脏胆固醇合成，而对肾上腺、性腺、心脏、大脑等部位的胆固醇合成影响极低，既有效降低了血清胆固醇水平，又减少了肝脏以外组织不良反应的发生。水溶性较强的他汀类药物是 ()

- A: 普伐他汀
- B: 氟伐他汀
- C: 洛伐他汀
- D: 辛伐他汀

答案：A

14. 属于促动力药的是 ()

- A: 胶体果胶铋
- B: 胃蛋白酶
- C: 莫沙必利

D: 奥美拉唑

答案: C

15. 布美他尼属于下列哪类利尿药

A: 高效能利尿药

B: 保钾利尿药

C: 碳酸酐酶抑制药

D: 中效能利尿药

答案: A

16. 大剂量糖皮质激素冲击疗法用于()

A: 抑制器官移植急性排斥危象

B: 肾病综合征

C: 变态反应性疾病

D: 湿疹

答案: A

17. 甲状腺功能亢进的内科治疗宜选用

A: 甲状腺素

B: 甲巯咪唑

C: 大剂量碘

D: 小剂量碘

答案: B

18. 控制癫痫持续状态，可静脉注射

A: 氯丙嗪

B: 硫喷妥钠

C: 阿司匹林

D: 地西泮

答案: D

19. 糖皮质激素的抗中毒性休克作用是

- A: 提高中枢神经系统的兴奋性
- B: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理
- C: 提高机体对细菌内毒素的耐受力
- D: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶

答案: C

20. 口服治疗体癣，毛发癣，对深部真菌无效的药物是()

- A: 环丙沙星
- B: 灰黄霉素
- C: 咪康唑
- D: 克霉唑

答案: B

21. 在使用减毒活流感疫苗后一段时间内不应服用奥司他韦，该时间是

- A: 2 周内
- B: 4 周内
- C: 3 周内
- D: 1 周内

答案: A

22. 频繁、剧烈无痰干咳患者宜选用

- A: 可待因
- B: 喷托维林
- C: 地关索酯

D: 右美沙芬

答案: A

23. 下列哪项不是血管紧张素转换酶抑制药的主要临床应用

A: 心肌梗死

B: 心律失常

C: 充血性心力衰竭

D: 高血压

答案: B

24. 是第一个 P2Y₁₂ 拮抗剂，可抑制血小板聚集的是()

A: 华法林

B: 尿激酶

C: 噻氯匹定

D: 肝素

答案: C

25. 属于润滑性泻药的是

A: 多库酯钠

B: 番泻叶

C: 利那洛肽

D: 欧车前

答案: A

26. 糖皮质激素的适应证，不包括

A: 活动性肺结核

B: 风湿性关节炎

C: 系统性红斑狼疮

D: 再生障碍性贫血

答案：A

27. 红霉素的主要不良反应是

A: 耳毒性

B: 肝损伤

C: 过敏反应

D: 胃肠道反应

答案：D

28. 属于持续大剂量应用糖皮质激素引起的不良反应是

A: 骨质疏松症

B: 胰腺炎

C: Cushing 综合征体型

D: 青光眼

答案：C

29. 卡泊三醇禁用于

A: 高钙血症患者

B: 低钙血症患者

C: 高钠血症患者

D: 低钠血症患者

答案：A

30. 不属于浓度依赖性抗菌药物的是

A: 氨基糖苷类

B: 阿奇霉素

C: 达托霉素

D: 氟喹诺酮类

答案: B

31. 抑制脱氧胸苷酸合成酶

A: 羟基脲

B: 甲氨蝶呤

C: 氟尿嘧啶

D: 阿糖胞苷

答案: C

32. 口服避孕药的禁忌证不包括()

A: 激素依赖性肿瘤

B: 重度肝功能不全

C: 不明原因阴道出血

D: 甲状腺功能减退

答案: D

33. 患者，男，17 岁。拔牙 2 天后出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈。12 天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。

查体：T39℃，脉搏 89 次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音。实验室检查：WBC $28 \times 10^9/L$

A: 痰细胞学检查

B: 咳出的痰进行细胞培养

C: 咳出的痰直接涂片

D: 通过环甲膜穿刺吸取痰液，进行痰涂片和需氧、厌氧菌检查

答案: D

34. 对非磺酰脲类胰岛素促泌剂的描述正确的是()

- A: 此类药物需在餐前即刻服用
- B: 此类药物可降低 2 型糖尿病患者的餐前血糖
- C: 格列美脲属于本类药物
- D: 此类药物不能单独服用

答案：A

35. 急性室性心律失常可选用

- A: 美西律
- B: 利多卡因
- C: 阿托品
- D: 硝苯地平

答案：B

36. 下述药物中不可用于治疗疥疮的是()

- A: 苯甲酸苄酯
- B: 硫黄软膏
- C: 过氧苯甲酰
- D: 林旦霜

答案：C

37. 属于 M 期细胞周期特异性的抗肿瘤药是

- A: 氮芥
- B: 阿糖胞苷
- C: 长春碱
- D: 顺铂

答案：C

38. 高血压伴变异型心绞痛宜选用

- A: 普萘洛尔
- B: 尼莫地平
- C: 利血平
- D: 硝苯地平

答案：D

39. 患者，男，55 岁，诊断为良性前列腺增生症，服用非那雄胺片治疗，最有可能发生与用药相关的不良反应是（）。

- A: 脱发
- B: 性欲减退
- C: 心悸
- D: 体位性低血压

答案：B

40. 属于第二代钙代谢调节药，对磷酸钙有很强的亲和性的药物是（）

- A: 帕米膦酸二钠
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 氯屈膦酸二钠
- D: 依替膦酸二钠

答案：A

41. 对脑 CT 无明显的低密度改变、意识清楚的急性缺血性脑卒中患者，在发病 6 小时内采用其静脉溶栓较安全、有效的是（）

- A: 链激酶
- B: 叶酸
- C: 尿激酶
- D: 重组人促红素

答案：C

42. 未确诊的腹痛、炎症性器质性肠病、肠梗阻、肠穿孔患者禁用()

- A: 甘油
- B: 乳果糖
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 硫酸镁

答案: C

43. (2016 年真题) 属于胆固醇吸收抑制剂的是

- A: 阿昔莫司
- B: 阿托伐他汀
- C: 依折麦布
- D: 非诺贝特

答案: C

44. 小剂量时有抑制血栓形成作用的是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 吲哚美辛
- C: 阿司匹林
- D: 塞来昔布

答案: C

45. 可干扰细菌 DNA 回旋酶或拓扑异构酶 IV，影响细菌 DNA 合成的药物是

- A: 环丙沙星
- B: 替加环素
- C: 多黏菌素
- D: 庆大霉素

答案：A

46. β_3 受体激动后的影响是

- A: 脂肪分解
- B: 增加心率
- C: 支气管扩张
- D: 肌肉震颤

答案：A

47. 治疗可能引起结晶尿的药物是()

- A: 呋喃妥因
- B: 磺胺嘧啶
- C: 氯霉素
- D: 左氧氟沙星

答案：B

48. 抑制细菌叶酸合成的抗菌药物是

- A: 利福喷丁
- B: 头孢米诺
- C: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶
- D: 头孢吡肟

答案：C

49. 目前治疗肺孢子菌病首选的药物是

- A: 特比萘芬
- B: 卡泊芬净
- C: 复方磺胺甲噁唑
- D: 氟曲南

答案：C

50. 治疗伤寒、副伤寒的首选药物是

- A: 红霉素
- B: 青霉素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 氯霉素

答案：D

51. 对抗香豆素过量引起的出血可选用()

- A: 鱼精蛋白
- B: 维生素 K
- C: 维生素
- D: 垂体后叶素

答案：B

52. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 高钾血症
- B: 高镁血症
- C: 高尿酸血症
- D: 高钠血症

答案：C

53. 宜选用塞来昔布治疗的疾病是

- A: 痛风

- B: 胃溃疡
- C: 骨关节炎
- D: 肾绞痛

答案：C

54. 可选择性地抑制虫体肌肉中的琥珀酸脱氢酶，使延胡索酸不能还原为琥珀酸，从而影响虫体肌肉的无氧代谢，减少能量产生，同时当虫体与之接触时，能使神经肌肉去极化，肌肉发生持续收缩而致麻痹的药物是

- A: 甲苯咪唑
- B: 左旋咪唑
- C: 哌嗪
- D: 阿苯达唑

答案：B

55. 属于维生素 K 类抗出血药的是

- A: 甲萘氢醌
- B: 艾曲泊帕乙醇胺
- C: 酚磺乙胺
- D: 氨甲环酸

答案：A

56. 利福平与口服避孕药合用()

- A: 代谢加速而导致意外怀孕
- B: 代谢加快而失效
- C: 子宫内膜突破性出血
- D: 抑制排酸作用

答案：A

57. 两性霉素 B 与 () 合用具有协同作用。

- A: 酮康唑
- B: 氟胞嘧啶
- C: 利福平
- D: 伊曲康唑

答案：B

58. 可用于治疗假膜性肠炎的糖肽类药物是

- A: 万古霉素
- B: 克林霉素
- C: 替硝唑
- D: 红霉素

答案：A

59. 治疗绝经后妇女的骨质疏松症可选用 ()

- A: 依降钙素
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 阿法骨化醇

答案：C

60. (2019 年真题) 患者，男，8 岁，静脉滴注美洛西林后立即出现胸闷、气短、呼吸困难，喉头水肿，考虑为青霉素类抗生素的过敏反应，按照其发生机制，该患者发生的过敏反应，在分型上属于 ()

- A: III 型变态反应
- B: I 型变态反应
- C: IV 型变态反应

D: II 型变态反应

答案: B

61. 局部应用杀灭疥虫的药物中，疗效最佳的是()

A: 克罗米通

B: 苯甲酸苄酯

C: 林旦霜

D: 硫黄软膏

答案: C

62. 属于 M 胆碱受体激动剂的降低眼压药是()

A: 毛果芸香碱

B: 甘露醇

C: 曲伏前列素

D: 噻吗洛尔

答案: A

63. (2018 年真题) 属于短效胰岛素或短效胰岛素类似物的是()

A: 甘精胰岛素

B: 低精蛋白锌胰岛素

C: 普通胰岛素

D: 地特胰岛素

答案: C

64. 有关痤疮治疗用药注意事项，描述不正确的是()

A: 对林可霉素磷酸酯凝胶过敏者禁用

B: 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用在同一时间、同一部位有物理性配伍禁忌

C: 维 A 酸的用药部位要避免强烈的日光照射，宜在晚间睡前应用

D: 过氧苯甲酰凝胶合用维 A 酸乳膏可加强疗效

答案：D

65. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 M 胆碱受体阻断剂是

A: 沙美特罗

B: 噻托溴铵

C: 多索茶碱

D: 孟鲁司特

答案：B

66. 容积性泻药()

A: 甘油

B: 地芬诺酯

C: 乳果糖

D: 硫酸镁

答案：D

67. 关于钙制剂临床应用中的注意事项描述，错误的是()

A: 钙制剂与肾上腺皮质激素、异烟肼、四环素或含铝抗酸药不宜同时服用

B: 同时补充维生素 D

C: 补钙应选用含钙量高、生物利用度好、溶出度高的制剂

D: 钙在体内的吸收随着钙的摄入量增加而增加

答案：D

68. 属于 α 受体激动剂，缓解鼻黏膜充血肿胀的药物是

A: 过氧化氢

- B: 酮替芬
- C: 克罗米通
- D: 麻黄碱

答案：D

69. 低分子量肝素发挥抗凝作用主要抑制的凝血因子是

- A: 因子Ⅹa
- B: 因子Ⅸa
- C: 因子Ⅱa
- D: 凝血酶Ⅲ（AT—Ⅲ）

答案：A

70. （2017 年真题）夜盲症可以使用的治疗药物是（）

- A: 维生素 B1
- B: 维生素 B2
- C: 维生素 D
- D: 维生素 A

答案：D

71. 关于苯丙哌林与可待因镇咳作用强度比较，正确的是

- A: 苯丙哌林镇咳作用约为可待因的 2 倍
- B: 可待因镇咳作用约为苯丙哌林的 2 倍
- C: 苯丙哌林镇咳作用约为可待因的 2～4 倍
- D: 可待因镇咳作用约为苯丙哌林的 2～4 倍

答案：C

72. 患者，女，36 岁，近期经常上腹灼烧痛、反酸，疼痛多出现在上午 10 点及下午 4 点，有时夜间痛醒。食后缓解，X 线钡餐诊断为十二指肠溃疡，该患者宜使用的治疗药物是（ ）

- A: 颠茄
- B: 多潘立酮
- C: 奥美拉唑
- D: 甲氧氯普胺

答案：C

73. 易产生耐药性，极少单独用药，临床常与两性霉素 B 合用的抗真菌药物是

- A: 氟康唑
- B: 氟胞嘧啶
- C: 特比萘芬
- D: 卡泊芬净

答案：B

74. 属于 GLP-1 受体激动剂的药物是

- A: 利拉鲁肽
- B: 伏格列波糖
- C: 那格列奈
- D: 阿格列汀

答案：A

75. 糖皮质激素对血液系统的影响不包括

- A: 使血小板数量下降
- B: 减少淋巴细胞
- C: 提高纤维蛋白原浓度

D: 使红细胞含量增加

答案：A

76. 治疗疟疾的药物是()

A: 氯喹

B: 乙胺嗪

C: 甲硝唑

D: 吡喹酮

答案：A

77. 可使双膦酸盐的吸收下降，服用双膦酸盐后 2 小时内避免食用的是

A: 高钙食品

B: 抗血管生成药

C: 沙利度胺

D: 萘普生

答案：A

78. 长效的 5-HT₂受体阻断剂是

A: 劳拉西泮

B: 帕洛诺司琼

C: 氯丙嗪

D: 甲氧氯普胺

答案：B

79. (2018 年真题) 可导致视神经炎和血尿酸升高的药物是 ()

A: 对氨基水杨酸

B: 乙胺丁醇

C: 利福平

D: 吡嗪酰胺

答案：B

80. 仅适用于少数敏感菌，衣原体属，立克次体等不典型病原体所致感染的药物是

A: 阿奇霉素

B: 链霉素

C: 四环素

D: 甲硝唑

答案：C

81. 磺酰脲类药物的不良反应不包括

A: 诱发甲亢

B: 口中金属味

C: 粒细胞减少

D: 肝炎

答案：A

82. 维生素 K

A: 促进四氢叶酸类辅酶的循环利用

B: 促进凝血因子合成

C: 抑制血小板聚集

D: 促进纤溶

答案：B

83. 对于高胆固醇血症造成高危心肌梗死的患者，作为一线治疗药物应选择()

A: 阿昔莫司

- B: 烟酸
- C: 非诺贝特
- D: 洛伐他汀

答案：D

84. 下列不属于中效利尿药的是

- A: 呋噻帕胺
- B: 氢氟噻嗪
- C: 氨苯蝶啶
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

85. 硫脲类药物的基本作用是

- A: 抑制甲状腺过氧化酶
- B: 抑制碘泵
- C: 抑制甲状腺蛋白水解酶
- D: 抑制 $\text{Na}^{+}-\text{K}^{+}$ 泵

答案：A

86. 临床作为控制复发和阻止疟疾传播的首选药的药物是()。

- A: 伯氨喹
- B: 奎宁
- C: 氯喹
- D: 甲硝唑

答案：A

87. (2020 年真题) 属于一线抗结核分枝杆菌的药物是

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 莫西沙星、卡那霉素、卷曲霉素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/378142122050007022>