

2024 福建省金门县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题通关秘籍题库（完整版）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 止吐方案：每日化疗前，联合应用 5-HT₃ 受体阻断剂和口服地塞米松 12mg，化疗后从第 2 日到第 3 日口服地塞米松或应用 5-HT

- A: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- B: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- C: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- D: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：A

2. （2017 年真题）减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定，属于乙内酰脲类抗癫药的是（）

- A: 苯妥英钠
- B: 苯巴比妥
- C: 卡马西平
- D: 加巴喷丁

答案：A

3. 青霉素（）

- A: 对 G
- B: 特别对铜绿假单胞菌有效
- C: 抗菌作用强，对厌氧菌有效
- D: 对 G

答案：D

4. 半合成青霉素类中，属于耐青霉素酶青霉素类的是()

- A: 替莫西林
- B: 氨苄西林
- C: 羧苄西林
- D: 甲氧西林

答案：D

5. 与多柔比星呈现交叉耐药性的是

- A: 肝素
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 放线菌素
- D: 氧烯洛尔

答案：C

6. 可引起高钾血症，应避免与留钾利尿药联合应用的是()

- A: 地高辛
- B: 哌唑嗪
- C: 呋塞米
- D: 卡托普利

答案：D

7. 下列属于非选择性 β 受体阻断药的是()

- A: 比索洛尔
- B: 普萘洛尔
- C: 阿替洛尔
- D: 美托洛尔

答案：B

8. (2017 年真题) 可能导致牙龈增生的药物是 ()

- A: 拉西地平
- B: 依诺肝素
- C: 普萘洛尔
- D: 普伐他汀

答案：A

9. 可作为气道痉挛的应急缓解药物的长效 β 受体激动剂是

- A: 沙美特罗
- B: 福莫特罗
- C: 沙丁胺醇
- D: 丙卡特罗

答案：B

10. 下列不属于抗肿瘤药的是

- A: 三尖杉酯碱
- B: 长春新碱
- C: 长春碱
- D: 氟胞嘧啶

答案：D

11. 属于短效胰岛素或短效胰岛素类似物的是 ()

- A: 甘精胰岛素
- B: 低精蛋白锌胰岛素
- C: 地特胰岛素
- D: 普通胰岛素

答案：D

12. 氢氯噻嗪的利尿作用部位在 ()

- A: 髓袢升支粗段
- B: 集合管
- C: 肾小球
- D: 远曲小管初段

答案：D

13. 一日 2 次，早餐和晚餐前 60 分钟内给药，餐后不能给药，每次给药剂量固定，不需要根据血糖水平作随时调整的药物是

- A: 利拉鲁肽
- B: 格列齐特
- C: 瑞格列奈
- D: 艾塞那肽

答案：D

14. (2016 年真题) 具有杀灭痤疮丙酸杆菌作用，用于治疗痤疮的药品是

- A: 过氧苯甲酰
- B: 维 A 酸
- C: 阿达帕林
- D: 异维 A 酸

答案：A

15. 在体内不易蓄积，适用于老年和肾功能不全患者的胰岛素促泌剂类降糖药是 ()

- A: 瑞格列奈

B: 利拉鲁肽

C: 艾塞那肽

D: 罗格列酮

答案：A

16. 可使前者作用加强或延长的是

A: 维生素 C

B: 他莫昔芬

C: 红霉素

D: 氯丙嗪

答案：D

17. 西沙必利的典型不良反应是

A: 肝肾功能损害

B: 嗜睡、倦怠等锥体外系反应

C: Q-T 间期延长

D: 恶心、呕吐

答案：C

18. 老年人对苯二氮（卓）类药较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟缓等症状，在临床上称为

A: 戒断综合征

B: “宿醉”现象

C: 老年期痴呆

D: 震颤麻痹综合征

答案：B

19. （2018 年真题）关于胶体果胶铋用药教育的说法，错误的是（）

- A: 妊娠期妇女禁用胶体果胶铋
- B: 胶体果胶铋使用后口中可能有氨味
- C: 胶体果胶铋使用后大便可能会变黑
- D: 胶体果胶铋宜与牛奶同时服用

答案：D

20. 肝功能不全的心衰患者可选用

- A: 普萘洛尔
- B: 地高辛
- C: 地尔硫卓
- D: 美西律

答案：B

21. 适用于各种类型疟疾的症状控制，尤其是对抗氯喹恶性及凶险型疟疾有较好疗效的药物是

- A: 蒿甲醚
- B: 双氢青蒿素
- C: 奎宁
- D: 乙胺嘧啶

答案：B

22. 外科皮肤伤口或肢体溃疡的局部治疗宜选用

- A: 聚甲酚磺醛
- B: 阿霉素
- C: 环磷酰胺
- D: 地屈孕酮

答案：A

23. 具有肾保护作用的降压药是

- A: 沙拉新
- B: 氢氯噻嗪
- C: 硝苯地平
- D: 缬沙坦

答案：D

24. 可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药物是

- A: 硫酸镁
- B: 氯化铵
- C: 乳酸钠
- D: 氯化钠

答案：C

25. 治疗流行性细菌性脑膜炎最合适的联合用药是()

- A: 青霉素+磺胺嘧啶
- B: 青霉素+克林霉素
- C: 青霉素+链霉素
- D: 青霉素+四环素

答案：A

26. (2015 年真题) 属于凝血因子 Xa 直接抑制剂的抗凝药是 ()。

- A: 利伐沙班
- B: 依诺肝素
- C: 肝素
- D: 华法林

答案：A

27. 缓解轻、中度急性哮喘症状应首选

- A: 孟鲁司特
- B: 沙丁胺醇
- C: 异丙托溴铵
- D: 沙美特罗

答案：B

28. 属于抗雌激素类的是()

- A: 己烯雌酚
- B: 睾酮
- C: 他莫昔芬
- D: 甲地孕酮

答案：C

29. 抑制胃酸分泌作用最强的药物是

- A: 尼扎替丁
- B: 雷尼替丁
- C: 西咪替丁
- D: 奥美拉唑

答案：D

30. 可导致红绿色盲的是

- A: 红霉素
- B: 异烟肼
- C: 吡嗪酰胺
- D: 乙胺丁醇

答案：D

31. 静脉注射可出现舌头麻木及口内特殊气味的是

- A: 左氧氟沙星
- B: 四环素
- C: 青霉素
- D: 氯霉素

答案：A

32. 血浆半衰期较短的治疗阴茎勃起功能障碍的 5 型磷酸二酯酶抑制剂的是

- A: 他达拉非
- B: 丙酸睾酮
- C: 甲睾酮
- D: 西地那非

答案：D

33. 预防急性肾衰竭可选用

- A: 螺内酯
- B: 乙酰唑胺
- C: 氢氯噻嗪
- D: 呋塞米

答案：D

34. 四环素类抗菌药物抗菌谱广，但无抗菌作用的是

- A: 铜绿假单胞菌
- B: 支原体
- C: 立克次体
- D: 衣原体

答案：A

35. 有癫痫或精神病史的患者应慎用哪种药

- A: 利福平
- B: 异烟肼
- C: 吡嗪酰胺
- D: 乙胺丁醇

答案：B

36. 不易透过血-脑屏障，药理作用单一，主要用于治疗膀胱过度活动症的非选择性 M 受体阻断药是

- A: 索利那新
- B: 黄酮哌酯
- C: 奥昔布宁
- D: 托特罗定

答案：D

37. 对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是()

- A: 布美他尼
- B: 乙酰唑胺
- C: 依他尼酸
- D: 依托塞米

答案：C

38. 只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害的是

- A: 阿那曲唑
- B: 氟他胺
- C: 曲妥珠单抗
- D: 他莫昔芬

答案：C

39. 可使洋地黄化时发生心脏传导阻滞，尤其是同时静脉注射钙盐时，该药物是

- A: 呋塞米
- B: 克拉霉素
- C: 硫酸镁
- D: 胺碘酮

答案：C

40. 因全身应用可产生严重的肾毒性、故目前仅限于局部应用的是

- A: 去甲万古霉素
- B: 替考拉宁
- C: 杆菌肽
- D: 万古霉素

答案：C

41. 秋水仙碱的注意事项错误的是

- A: 尽量避免静脉注射和长期口服给药
- B: 不可用于长期痛风的预防
- C: 可致可逆性维生素 B
- D: 肾功能下降时可造成蓄积

答案：C

42. 适用于哺乳期妇女治疗甲亢的药物是

- A: 甲巯咪唑
- B: 卡比马唑
- C: 碘剂

D: 丙硫氧嘧啶

答案: D

43. 关于莫西沙星作用特点的说法,错误的是()

A: 莫西沙星可经验性用于社区获得性肺炎的治疗

B: 莫西沙星属于浓度依赖型抗菌药物

C: 莫西沙星抗菌谱广,对常见革兰阴性及革兰阳性菌均具有良好抗菌活性

D: 莫西沙星组织分布广泛,但不能透过血脑屏障

答案: D

44. 下列头孢菌素药物中,半衰期最长的药物是

A: 头孢氨苄

B: 头孢克洛

C: 头孢曲松

D: 头孢孟多

答案: C

45. 下列不属于雌激素作用部位的是

A: 子宫

B: 肾脏

C: 阴道

D: 输卵管

答案: B

46. 以下关于比索洛尔说法错误的是

A: 可阻断部分 β_1 受体

B: 首关效应高、半衰期短

C: 口服吸收率高，中度透过血-脑屏障

D: 为水脂双溶性 β 受体阻断剂

答案：B

47. 为酸性强氧化性消毒药，遇有机物释放出新生态氧起氧化作用，能杀灭病毒、细菌、真菌、芽孢等各种病原微生物的消毒防腐药是

A: 依沙吖啶

B: 过氧乙酸

C: 氯己定

D: 聚维酮碘

答案：B

48. 为防止中毒，不宜与铋剂联用的是

A: 枸橼酸铋钾

B: 甲硝唑

C: 米索前列醇

D: 硫糖铝

答案：A

49. 属于促分泌药，通过刺激肠液分泌，促进排便的药物是()

A: 多库酯钠

B: 欧车前

C: 利那洛肽

D: 番泻叶

答案：C

50. (2020 年真题) 患者，男，66 岁。BMI24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次/分。临床诊断为：(1) 心绞痛急性发作；(2) 心功能不全、心功能 III 级；(3) 高血压病 3 级；(4) 高脂血症。

- A: 阿托伐他汀
- B: 呋塞米
- C: 氨氯地平
- D: 美托洛尔

答案：D

51. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 16.9×10⁹/L，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

- A: 高血压危象
- B: 红人综合征
- C: 急性肝衰竭
- D: 血糖异常

答案：C

52. 属于胃黏膜保护药的是

- A: 山莨菪碱
- B: 胶体果胶铋
- C: 熊去氧胆酸
- D: 多潘立酮

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

53. 下列药物中，属于非二氢吡啶类钙通道阻滞剂药物的是（）。

- A: 硝苯地平
- B: 尼莫地平
- C: 氨氯地平
- D: 维拉帕米

答案：D

54. 属于抗菌增效剂的是

- A: 氧氟沙星
- B: 甲氧苄啶
- C: 呋喃唑酮
- D: 磺胺嘧啶

答案：B

55. 甲状腺危象选用（）

- A: 胰岛素
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 二甲双胍
- D: 格列本脲

答案：B

56. （2016 年真题）属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

- A: 托瑞米芬
- B: 他莫昔芬
- C: 氟他胺
- D: 乙烯雌酚

答案：C

57. 肾毒性大的是

- A: 头孢哌酮
- B: 庆大霉素
- C: 头孢噻肟
- D: 阿莫西林

答案：B

58. 甲氧苄啶的抗菌机制是

- A: 破坏细菌细胞壁
- B: 抑制 DNA 螺旋酶
- C: 抑制二氢蝶酸合成酶
- D: 抑制二氢叶酸还原酶

答案：D

59. 患者，男，52 岁，BMI28kg/m²，既往有动脉粥样硬化性心血管病、高尿酸血症、痛风病，患者诉昨晚 8 点起右大脚趾关节处疼痛难忍宜使用的药物是

- A: 秋水仙碱
- B: 非布司他
- C: 碳酸氢钠
- D: 别嘌醇

答案：A

60. 可引起出血性膀胱炎的抗肿瘤药物是

- A: 氟尿嘧啶
- B: 多柔比星
- C: 甲氨蝶呤

D: 环磷酰胺

答案：D

61. 疗效优于乙琥胺，但因有肝毒性，仅在癫痫小发作合并大发作时应用的药物是

A: 苯巴比妥

B: 丙戊酸钠

C: 卡马西平

D: 苯妥英钠

答案：B

62. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。若患者不能耐受万古霉素时，可选择替代的药物是（）

A: 阿米卡星

B: 头孢哌酮

C: 替考拉宁

D: 头孢曲松

答案：C

63. 可用于烧伤及伤后感染的是

A: 磺胺甲噁唑

B: 磺胺嘧啶

C: 磺胺米隆

D: 柳氮磺吡啶

答案：C

64. 小剂量碘主要用于

- A: 黏液性水肿
- B: 抑制甲状腺素的释放
- C: 地方性甲状腺肿
- D: 呆小病

答案：C

65. 可引起眼睛疼痛不适的是

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 氨溴索
- C: 异丙托溴铵
- D: 茶碱

答案：C

66. 关于阿奇霉素使用的叙述，错误的是

- A: 治疗儿童中耳炎、肺炎时，阿奇霉素的疗程为 5 天
- B: 治疗儿童中耳炎、肺炎时，阿奇霉素首次剂量为后续剂量的 3 倍
- C: 阿奇霉素一天一次口服即可
- D: 若需服含铝或镁的抗酸药，阿奇霉素应在服用上述药物前 1 小时或后 2 小时给予

答案：B

67. 急性室性心律失常可选用

- A: 硝苯地平
- B: 利多卡因
- C: 美西律
- D: 阿托品

答案：B

68. 属于 I 类抗心律失常药且能引起金鸡纳反应的是

- A: 利多卡因
- B: 奎尼丁
- C: 胺碘酮
- D: 普萘洛尔

答案：B

69. 阿卡波糖降血糖作用的机制是

- A: 增强胰岛素的作用
- B: 竞争性抑制 α -葡萄糖苷酶，减少碳水化合物的水解
- C: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性
- D: 拮抗胰岛高血糖素的作用

答案：B

70. 异丙托溴铵属于

- A: β 肾上腺素受体激动剂
- B: 白三烯调节剂
- C: 黄嘌呤类药物
- D: M 胆碱受体阻断剂

答案：D

71. (2019 年真题) 对磺胺类药物有严重过敏史的患者应避免使用的药物是 ()

- A: 西地那非
- B: 坦洛新
- C: 十一酸睾酮
- D: 特拉唑嗪

答案：B

72. 属于单胺氧化酶抑制药的是

- A: 司来吉兰
- B: 石杉碱甲
- C: 溴隐亭
- D: 金刚烷胺

答案：A

73. 金刚烷胺与多潘立酮合用

- A: 增加肾毒性
- B: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)
- C: 增加锥体外系不良反应的风险
- D: 可增加抗胆碱不良反应的危险

答案：C

74. 属于头孢一代的是

- A: 头孢唑林
- B: 头孢曲松
- C: 头孢呋辛
- D: 拉氧头孢

答案：A

75. 没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是()。

- A: 氯化铵
- B: 苯丙哌林
- C: 可待因
- D: 右美沙芬

答案：B

76. 糖皮质激素禁用于低血钾患者是因为

- A: 促进胃酸分泌
- B: 抑制免疫功能只抗炎不抗菌
- C: 抑制蛋白质合成
- D: 水钠潴留

答案：D

77. 袢利尿药中，静脉给药维持时间最长的是()

- A: 呋塞米
- B: 托拉塞米
- C: 布美他尼
- D: 依他尼酸

答案：B

78. 通过与敏感需氧革兰阴性菌细胞膜上 PBP3 的高度亲合而发挥杀菌作用，仅对需氧革兰阴性菌包括铜绿假单胞菌具有良好抗菌活性，对革兰阳性菌和厌氧菌作用差的是

- A: 头孢美唑
- B: 头孢他啶
- C: 氨曲南
- D: 头孢噻肟

答案：C

79. 主要增加糖分解和减少糖生成，又能改善对胰岛素敏感性的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 罗格列酮

C: 氢氧化镁

D: 胰岛素

答案：A

80. 烟酸缺乏时发生

A: 成人佝偻病

B: 夜盲症

C: 脚气病

D: 糙皮病

答案：D

81. 易发生持续性干咳不良反应的药品是()。

A: 氢氯噻嗪

B: 福辛普利

C: 硝酸甘油

D: 硝苯地平

答案：B

82. 长期大量应用双嘧达莫治疗缺血性心脏病时,可能导致患者缺血加重,甚至病情恶化可能的原因是（）

A: 冠状动脉窃血

B: 双嘧达莫抵抗

C: 抗血小板药物继发失效

D: 治疗反应变异

答案：A

83. 亲脂性较强，易通过血—脑屏障

A: 环磷酰胺

B: 卡莫司汀

C: 巯嘌呤

D: 氟尿嘧啶

答案：B

84. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER（-），PR（-），Her（+）。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多柔比星的说法中错误的是

A: 曾用过表柔比星的患者可更换多柔比星

B: 典型不良反应是骨髓抑制和心脏毒性

C: 属于蒽环类抗肿瘤药物

D: 对增殖和非增殖细胞均有杀伤作用

答案：A

85. 对凝血各环节均有作用，体内外均有抗凝作用，可防止急性血栓形成而成为对抗血栓的首选的抗凝血药是（）。

A: 依诺肝素

B: 水蛭素

C: 磺达肝葵钠

D: 阿哌沙班

答案：A

86. 用于抗乙肝病毒的药物是

A: 西多福韦

B: 阿昔洛韦

C: 拉米夫定

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 扎那米韦

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/385111242114012033>