北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试试题》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：治疗骨折不可轻易切开复位内固定，最主要的原因是（　）。A.易损伤大血管，引起肢体坏死

B.损伤神经，引起肢体瘫痪

C.术中发生意外

D.影响骨折血运，导致延迟愈合或不愈合

E.手术后发生感染，形成骨髓炎

2、单项选择题：肩袖的构成（　）。A.冈上肌，冈下肌，小圆肌

B.冈上肌，冈下肌，大圆肌

C.冈上肌，冈下肌，肩胛下肌

D.冈上肌，冈下肌，小圆肌，肩胛下肌

E.冈上肌，冈下肌，小圆肌，大圆肌

3、单项选择题：断肢在行再植手术之前应保存在（　）。A.乳酸林格液

B.75%酒精

C.10%福尔马林溶液

D.用无菌或清洁敷料包扎后干燥冷藏

E.置于 37℃，恒温箱中

4、单项选择题：右下肢被机动车轧伤，具备下列哪项可以诊断为骨折（　）。A.局部高度肿胀

B.压痛明显

C.下肢不能自主活动

D.骨摩擦音

E.明显跛行

5、单项选择题：下列哪项不是大脑瘫痪常见的下肢畸形（　）。A.跟形足

B.髋屈曲内收

C.膝屈曲挛缩

D.马蹄足

E.股直肌挛缩

6、单项选择题：关于拇外翻的体征，下列哪项对（　）。A.拇趾向外偏斜

B.拇趾跖趾关节可有半脱位

C.第 1、2 跖骨夹角加大

D.第 1 跖骨头内侧可有骨赘形成和拇囊炎

E.第 1 跖骨头跖面胼胝形成

7、单项选择题：右前臂尺桡骨开放性骨折，清创复位，石膏外固定后 36 小时，患者高热，脉快，白细胞计数明显增高，伤口有大量恶臭渗出液，X 线片显示皮下有气体，触诊有握雪感，应首先考虑（　）。A.血肿吸收

B.组织吸收

C.伤口严重化脓感染

D.气性坏疽

E.骨筋膜综合征

8、单项选择题：在治疗早期膝关节滑膜结核中，除全身治疗外，局部治疗最恰当的措施是（　）。A.制动

B.穿刺抽脓，注入抗结核药

C.穿刺抽脓，注入抗结核药，制动

D.滑膜切除术

E.膝关节加压融合术

9、单项选择题：骨关节炎疼痛最主要的特点是（　）。A.运动痛

B.静止痛

C.不定时痛

D.阴雨天痛

E.寒冷痛

10、单项选择题：诊断骨髓瘤时，下列哪项是错误的（　）。A.尿中本周（Bence-Jones）蛋白阳性，血沉高达 100㎜/h

B.常为多发性，偶见单发，多出现病理骨折

C.X 线片示圆形凿型溶骨性缺损，周围无反应性新骨

D.多见于青少年

E.骨髓穿刺可确定诊断

11、单项选择题：有关肘关节损伤后遗症哪种说法不正确（　）。A.肘内翻畸形的发生率为 9%～57%，内翻大于 20 时即应手术矫形

B.肘关节骨化性肌炎的发生率儿童高于成、年人

C.肘关节损伤后可继发尺神经炎

D.肘外翻达 35 以上者应考虑手术治疗

E.创伤性骨化性肌炎与进行性骨化性肌炎不是一种疾病，发病部位与表现亦不相同

12、单项选择题：患儿 6 岁，据 X 线片诊断锁骨青枝骨折，正确的处理是（　）。A.三角巾悬吊患肢 3 周

B.手法复位，8 字绷带外固定

C.手术复位内固定

D.不予处理

E.卧床 2 周

13、单项选择题：桡骨小头半脱位常见发生年龄及常用处理方法是（　）。A.5～10 岁小儿，手法复位，三角巾悬吊

B.6~8 岁小儿，手法复位，石膏外固定

C.10 岁儿童，切开复位内固定

D.5 岁以下幼儿，手法复位，复位后不固定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/385122201023011201