

【关键字】试题

2017 年第二季度护理部考试题

科室： _ _ _ 姓名： _ _ _ 得分： _ _ _

一、单选题。(每小题 1 分，共 40 分。)

1 . 取用无菌溶液时，应首先核对：()

A . 瓶签 B . 瓶身有无裂缝 C . 瓶盖有无松动 D . 溶液有无沉淀 E . 溶液有无浑浊

2 . 外用溶液开启后，其使用的时间不能超过：()

A . 4 小时 B . 12 小时 C . 24 小时 D . 8 小时 E . 48 小时

3 . 外科手术时，凡接触空腔脏器、肿瘤组织、内膜组织和感染组织等的器械、敷料均视为污染，这些被污染的器械和敷料所放置的区域称为：()

A . 污染区域 B . 无菌区域 C . 半污染区域 D . 相对无菌区域 E . 隔离区域

4.手消毒效果应达到的要求：外科手消毒监测的细菌数应 (B)。

A. $\leq 10\text{cfu/cm}^2$ B. $\leq 5\text{cfu/cm}^2$ C. $\leq 15\text{cfu/cm}^2$ D. $\leq 8\text{cfu/cm}^2$

E. $\leq 8\text{cfu/cm}^2$

5 . 下列哪项戴、脱无菌手套的操作是错误的 : ()

A . 戴手套前先将手洗净揩干 B . 核对手套袋外标明的手套号码 , 灭菌日期

C . 取出滑石粉 , 用后放回袋内 D . 戴好手套后 , 两手置腰部水平以上

E . 脱手套时 , 将手套口翻转脱下

6 . 清除物品上除芽孢以外的所有致病微生物的方法称为 : ()

A . 灭菌 B . 无菌 C . 消毒 D . 清洁 E . 抑菌

7 . 下述哪项符合无菌技术操作原则 : ()

A . 无菌操作前 30 分钟清洁地面 B . 无菌包潮湿待干后使用

C . 取出的无菌物品未用立即放回原处 D . 接触无菌包前不用进行手卫生

E . 操作时手臂保持在腰部水平以上

8 . 在无菌技术操作原则中 , 预防交叉感染的关键措施是 : ()

A . 操作区域要清洁、宽敞 B . 取无菌物品时 , 必须使用无菌持物钳

C . 一份无菌物品只能供一个病人使用 D . 无菌物品与非无菌物品分别放置

E . 无菌物品疑有污染不可再用

9 . 下列哪项违背了无菌技术操作原则 : ()

A . 外科手消毒时应保持指尖朝上避免水倒流 B . 摘除外科手套后不用清洁洗手

C . 倒取无菌溶液时 , 应先冲洗瓶口 D . 戴手套的手不可触及另一手套的内面

E . 无菌持物钳的前端始终保持向下

10. 下列哪项不符合无菌物品的管理原则 : ()

A . 无菌物品与非无菌物品分别放置 B . 无菌包上必须注明灭菌日期

C . 已打开过的无菌包 48 小时后必须重新灭菌 D . 取出的无菌敷料不得放回原容器内

E . 无菌包的有效期为 7 天

11. 外科手消毒设施不包括 : ()

A . 手消毒剂 B . 计时装置 C . 洗手池 D . 水龙头 E . 照明灯

12 . 下列哪项不是外科手消毒原则 : ()

A . 先洗手 , 后消毒 B . 手被污染时应重新进行外科手消毒

C . 指甲长度不应超过指尖，不应佩戴人工指甲

D . 不同手术之间直接使用消毒剂揉搓即可

E . 流动水冲洗时不要在水中来回移动手臂

13 . 取用无菌溶液时下列哪项作法不符合无菌原则 : ()

A . 打开瓶盖，常规消毒瓶塞 B . 双手将橡皮胶塞边缘向上翻起

C . 手握瓶直接倒液入无菌容器中 D . 倒液后即消毒瓶塞盖回

E . 剩余溶液在 24 小时内可用

14 . 下列哪项不是打开无菌包前需要核查的内容 : ()

A. 无菌包的名称 B . 无菌包灭菌日期及包外的化学指示卡 C . 无菌包的大小、重量

D . 无菌包有无潮湿 E . 包装是否完整、有无破损

15 . 清除或杀灭医疗器械、器具和物品上一切微生物的处理称为 : ()

A . 灭菌 B . 无菌 C . 消毒 D . 清洁 E . 抑菌

16 . 无菌包内物品未用完，下列哪项处理是错误的 : ()

- A . 按原痕回包扎好 , 带端不打结 B . 注明开包日期、时间
- C . 包内物品被污染或无菌包被浸湿 , 须重新灭菌 D . 24 小时后失效 E . 4 小时后失效

17 . 下列关于皮肤消毒哪项说法是正确的 : ()

- A . 平行形或叠瓦行消毒 : 用于小手术野的消毒
- B . 向心形消毒 : 以原切口为中心 , 自上而下 , 自外而内进行消毒
- C . 环形或螺旋形消毒 : 用于大手术野的消毒
- D . 消毒时只使用一把消毒钳
- E . 消毒剂的使用量越多越好

18 . 无菌贮槽一经打开其有效使用时间为 : ()

- A . 2 小时 B . 4 小时 C . : 12 小时 D . 24 小时 E . 7 天内

19 . 经高压灭菌的纸塑包装物品 , 其有效期为 : ()

- A . 1 个月 B . 2 个月 C . 3 个月 D . 半年 E . 1 年

20 . 下列哪项不是铺置无菌器械台的目的 : ()

- A . 加强手术器械的管理 B . 建立无菌最大屏障 C . 准确、迅速配合手术
- D . 降低手术部位感染 E . 隔离手术器械

21 . 小剂量、单包装的皮肤消毒液 , 开启后其有效期为 : ()

- A . 三天 B . 每天 C . 一周 D . 两周 E . 两天

22 . 佩戴口罩时要让口罩紧贴面部和完全覆盖 : ()

- A . 口腔和鼻子 B . 口腔和下巴 C . 口鼻和下巴 D . 口腔 E . 鼻子

23 . 药物过敏试验或特殊护理技术操作前应备齐 : ()

- A . 所需用品和必要的急救药品、物品和器材
- B . 常用药品 , 以便抢救时用
- C . 常用物品 , 以便抢救时取用方便
- D . 所有过敏试验或特殊护理技术操作前都应备齐防护用具
- E . 给患者床边备好便器

24 . 手术区域使用 0.5%~1%碘伏消毒皮肤应直接涂擦手术区__遍 : ()

A . 3 遍 B . 1 遍 C . 2 遍 D . 4 遍 E . 5 遍

25 . 干式无菌持物筒开启后其有效时间为 : ()

A . 8h B . 6h C . 4h D . 2h E . 1h

26. 手术隔离技术的目的 ()

A.防止癌细胞沿血道、淋巴道扩散。 B.防止癌细胞在手术创面种植。

C.以上两者均包括。 D.以上两者均不包括。

27. 接触过恶性肿瘤的手术器械 , 正确的处理是 : ()

A.严禁再使用于正常组织 , 以免将器械上的肿瘤细胞带入其他组织。

B.若术中无条件更换手术器械 , 可用生理盐水清洗后继续使用。

C.若术中无条件更换手术器械 , 可用 75%酒精擦拭后继续使用。

D.以上三种方法均可。

28. 恶性肿瘤切下后 , 手术医生手套的处理 : ()

A.立即全部更换新手套。 B.可用生理盐水清洗后继续使用。

C.可用 75%酒精擦拭后继续使用。 D.可用蒸馏水清洗后继续使用。

29. 恶性肿瘤切除术后，器械的处理原则（ ）

A.同一般手术器械术后处理，通常情况下遵循先清洗后消毒的处理程序，清洗包括冲洗、洗涤、漂洗和终末漂洗。被朊毒体、气性坏疽等病原体污染需按规定特殊处理。

B.先用 0.1%含氯消毒液浸泡 5-10min，再按照上述步骤 1 进行处理。

C.先用蒸馏水浸泡 5-10min，再按照上述步骤 1 进行处理。

D.将手术器械浸泡于新鲜配制的强化酸水中 30 min。

30．进行无菌操作时，无菌手套不慎被刺破或污染应：()

A．立即消毒破口 B．立即更换 C．再加戴一副无菌手套

D．小心操作，不让破口碰及无菌物品 E．立即停止操作

31．脱手套时正确的是：()

A．先脱手套后脱手术衣 B．用戴手套的手抓取另一手的手套内面翻转摘除

C．先将手指部分拉下 D．将脱下的手套放在黑色垃圾袋内

E．已脱手套的手不能直接接触另一手套的外面

32 . 放置无菌物品的存放架应 : ()

- A . 距地 $\geq$ 20cm 离天花板 50cm 距墙 $\geq$ 5cm

B . 距地 $\geq$ 15cm 离天花板 50cm 距墙 $\geq$ 5cm
- C . 距地 $\geq$ 25cm 离天花板 30cm 距墙 $\geq$ 15cm

D . 距地 $\geq$ 20cm 离天花板 30cm 距墙 $\geq$ 15cm
- E . 距地 $\geq$ 15cm 离天花板 50cm 距墙 $\geq$ 5cm

33. 皮肤过度接触环氧乙烷后 , 用水冲洗接触处至少 _ _ , 同时脱去脏衣服 ; 眼睛接触液态环氧乙烷或高浓度环氧乙烷气体至少冲洗眼 _ _ , 并均应尽快就诊。()

- A. 15min 15min B. 30min 20min C.10min 15min D. 15min 10min E.20min

15min

34. 关于外科手消毒设施的配备下列哪项不正确 : ()。

- A. 水池应方便医务人员使用 , 应当采用非手触式水龙头开关
- B. 外科洗手可用皂液 , 盛装皂液的容器应为一次性 , 如需重复使用应每周清洁、消毒。
- C. 干手物品或者设施应当避免造成二次污染
- D. 洗手池应设置在手术间附近 , 2~4 个手术间宜配备 1 个洗手池。

E. 科室内擦手无菌巾应一人一巾

35. 用于外科手消毒的消毒剂不包括哪个？()

A. 乙醇 B. 碘伏 C. 氯己定醇复合消毒液 D. 2%~4% 氯己定消毒液

36. 手术区皮肤消毒范围要包括手术切口周围_____。

A . 10cm 的区域 B . 15cm 的区域 C . 20cm 的区域 D . 25cm 的区域 E. 30cm 的区域

37. 器械传递的方法哪项是错误的：()

A. 单手传递止血钳时洗手护士应右手握住止血钳前 1/3 处，弯侧向掌心。

B. 安装、拆卸刀片时应避开人员，尖端向下。

C. 传递镊子时洗手护士应右手握住夹端，闭合开口，让术者握住镊子中上部。

D. 传递拉钩前应用盐水浸湿。

E. 双手传递止血钳时洗手护士应双手交叉，传递对侧器械的手在下，同侧的手在上。

38. 下列哪项不是皮肤、黏膜消毒剂：()

A. 0.5%~1% 碘伏 B. 3% 过氧化氢 C. 0.2%~2% 碘酊 D. 75% 医用酒精 E. 0.1%~0.5% 洗必泰

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/385133243041011103>