
- ❖■评估
- ❖•处理
- ❖₌护理诊断与措施
- ❖•体会
- ❖ 本个案的不足



病例介绍

- ❖患者: 唐某, 男, 岁
- ❖主诉: 肛周脓肿破溃天,外院术后天,发现血糖增高周。
- ❖入院时间及方式:年月日:扶送入院。
- ❖入院诊断:型糖尿病

全身评估

| 项目 | 数值 | 参考值 | 项目 | 数值 | 参考值 |
|---------------|--|----------|---------|----------|-----|
| 体温(℃) | | | 空腹血糖 | † | |
| 脉搏 (次分) | | | () | | |
| 呼吸(次分) | | | 餐后 () | ^ | |
| 血压 () | | | 艮/口 () | ' | |
| 身高() | | | 糖化血红蛋 | ^ | |
| 体重() | | | 白() | ' | |
| (m²) | | | | , | |
| (下腔静脉) | .肝脾增大,考虑布加综合症 .下腔静脉多发低密度灶考虑血栓 形成 .右中肺少许炎症 | | 血白蛋白 | \ | |
| | | | 血红蛋白 | ↓ | |
| 感觉阈值 (伏特) | 正常 | ≤ | () | | |
| | 右左 | | 细菌培养 | 大肠埃希菌 | |
| | 右左 | | | 感染 | |

全身治疗

- ❖控制血糖: 甘精胰岛素十门冬胰岛素
- ❖改善微循环:前列地尔
- ❖抗感染:替硝唑+左氧氟沙星
- ❖予高锰酸钾坐浴(以消肿、活血、止痛),加强 伤口换药

疼痛评分为分



评估总结



- ❖ 血糖控制较差,餐后血糖偏高
- ❖ 下腔静脉血栓
- ❖ . 伤口处易受粪便污染, 合并感染
- ❖ 心理压力: 焦虑及自我形象紊乱

伤口评估(月日 第天)



(注: 黄色塑胶引流条为外院术后放置。)

| 部位 | 臀部四处创面 从上至下 |
|------|----------------------------------|
| 大小 | ① x x ② x x ③ x x ④ x x |
| 基底 | 黄色 红色 |
| 渗液 | 饱和 |
| 气味 | 有臭 |
| 周边皮肤 | 发红 |

伤口处理(月日第天)



- ❖处理:
- ❖ 络合碘棉球外敷消毒
- ❖ . 生理盐水冲洗
- ❖ 高渗盐敷料填塞创面, 以利于吸收渗液,抗炎, 引流
- ❖₌棉垫外置
- ❖ 嘱其每日一换。()

伤口评估(年月日第天)



| 部位 | 臀部四处创面 从上至下 |
|------|----------------------------------|
| 大小 | ① x x ② x x ③ x x ④ x x |
| 基底 | 黄色 红色 |
| 渗液 | 饱和 |
| 气味 | 有臭 |
| 周边皮肤 | 发红 |

伤口处理(年月日 第天)



- ❖处理:
- ❖ 络合碘棉球外敷消毒
- ❖ _ 生理盐水冲洗
- ❖ 藻酸盐敷料填塞创面
- ❖₌棉垫外置
- ❖ 换药频次:每日一换

伤口评估(年月日 第天)



| 部位 | 臀部四处创面 从上至下 |
|------|----------------------------------|
| 大小 | ① x x ② x x ③ x x ④ x x |
| 基底 | 红 黄 |
| 渗液 | 潮湿 |
| 气味 | 有臭 |
| 周边皮肤 | 红肿明显缓解 |

伤口处理(年月日 第天)



- ❖处理:
- ❖■络合碘棉球外敷消毒
- ❖ _生理盐水冲洗
- ❖ -美盐敷料填塞创面,以 利于吸收渗液,抗炎, 引流
- ❖₌棉垫外置。

伤口评估(年月日第天)



| 部位 | 臀部四处创面 从上至下 |
|------|------------------------------|
| 大小 | ① x x ② x x ③ x ④ x |
| 基底 | 大于红 小于黄 |
| 渗液 | 潮湿 |
| 气味 | 无臭 |
| 周边皮肤 | 红色减褪 |

伤口处理 (年月日 第天)



- ❖处理:
- ❖ . 生理盐水清洗
- ❖ ■吸收性藻酸盐敷料覆 盖
- ❖₌棉垫外置

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/385144131112011314