

#### 第四章 神经电生理检查技术

1. 男性，7岁，右臀肌内注射青霉素后，右足下垂1个月。查体：跛行，右胫骨前肌肌力0级。推测肌电图检查可能出现的典型表现为(D)

- A. 插入电位减弱
- B. 运动单位电位延长
- C. 束颤电位
- D. 纤颤电位
- E. 长时限运动单位电位

2. 肌电图仪的主要组成部位不包括(E)

- A. 电极
- B. 放大器
- C. 滤波器
- D. 信号平均器
- E. 扩音器

3. 50Hz 干扰产生伪迹主要原因不包括(A)

- A. 经皮神经电刺激
- B. 灯光调节器开关
- C. 热透疗法
- D. 电灯
- E. 电扇

4. 指总神经的神经支配是(E)

- A. 尺神经

B.正中神经

C.肌皮神经

D.坐骨神经

E.桡神经

5.表面电极大小的选择方法 (C)

A.根据肌肉的大小，不考虑电极间的间隔距离

B.根据电极间的间隔距离，不考虑肌肉大小

C.根据肌肉的大小与电极间的间隔距离

D.不考虑肌肉的大小与电极间的间隔距离

E.以上均不是

6.表面肌电图电极位置于 (A)

A.置于神经分布区域中心与肌腱之间的中点

B.电极置于肌腱之处，电极需沿着肌腱方向

C.放置在骨性突起处

D.放置于凹陷处

E.以上均不正确

7.表面肌电图电极之间的距离为 (C)

A.电极中心之间的距离为 15mm

B.电极中心之间的距离为 12mm

C.电极中心之间的距离为 8mm

D.电极中心之间的距离为 1mm

E.以上均不正确

8.神经传导兴奋的速度为 (B)

- A.速度均是一致的
- B.直径大、有髓的神经纤维速度快
- C.直径大、有髓的神经纤维速度慢
- D.直径小、无髓的神经纤维传导速度快
- E.以上均不正确

9.F波的测定及计算方法的参数不包括 (E)

- A.最短潜伏期
- B.平均潜伏期
- C.波幅
- D.出现率
- E.以上均不正确

10.癫痫临床表现为 (A)

- A.棘波为突发性的一过性脑电图变化，明显突出于背景波形
- B.尖波没有一过性脑电图变化
- C.棘慢波综合两侧不会同步性阵发出现
- D.不会出现尖慢波综合
- E.以上均不正确

## 第五章 心肺功能评定技术

1.3个代谢当量的耗氧量数值为 (B)

- A.7ml/(kg · min)
- B.10.5ml/(kg · min)

C. 14ml/(kg · min)

D. 17ml/(kg · min)

E. 21ml/(kg · min)

2. 以下哪种不是心电运动试验的绝对禁忌证 (E)

A. 室上性心动过速

B. 三度房室传导阻滞

C. 急性心内膜炎

D. 怀疑主动脉瘤

E. 高血压病

3. 小气道是指 (E)

A. 直径 2~4mm 的细支气管

B. 直径 2mm 以上的细支气管

C. 直径 1mm 以下的细支气管

D. 直径为 0.5mm 的细支气管

E. 直径 ≤ 2mm 的细支气管

4. 下列哪种指标是主观和客观指标结合的最大运动强度的试验，以运动诱发呼吸或循环不良症状和体征、心电图异常及心血管运动反应异常进行坐位运动终点。适用于诊断冠心病、评估心功能和体力活动能力、制定运动处方等 (C)

A. 极量运动试验

B. 亚（次）极量运动试验

C. 症状限制运动试验

D. 低水平运动试验

E. 定量运动试验

5. 某患者，男性，70岁，吸烟史47年，诊断为慢性支气管炎，阻塞性肺气肿，讲话或穿衣等轻微动作时即发生气短。该患者主观呼吸功能障碍程度评定为几级（D）

A. 1级

B. 2级

C. 3级

D. 4级

E. 5级

6. 功能残气量测定提示：残气量占肺总量的68%，考虑该患者为（E）

A. 轻度肺气肿

B. 中度肺气肿

C. 轻中度肺气肿

D. 中重度肺气肿

E. 严重肺气肿

7. 测得FEV<sub>1</sub>为35%，根据此数据，考虑该患者为（E）

A. 轻度肺气肿

B. 中度肺气肿

C. 轻中度肺气肿

D. 中重度肺气肿

E. 严重肺气肿

8.测得 MVV 占预计值的 35%，根据此数值，考虑该患者肺通气功能

(A)

A.严重减退

B.显著减退

C.稍有减退

D.可疑减退

E.基本正常

9.关于肺活量的叙述错误的是 (D)

A.为深吸气量和补呼气量之和

B.其个体差异较大

C.肺活量的大小随呼吸肌强弱有关

D.是反应肺通气功能较完善的指标

E.肺活量是指用力深吸气后再用力深呼气所能呼出的最大气体量

## 第六章 言语功能评定技术

1.言语流畅度以每分钟说出多少个词表示。每分钟说出的词在 (D)

个以上称为流畅性口语。

A.20

B.40

C.60

D.100

E.30

2.言语流畅度以每分钟说出多少个词表示。每分钟说出的词在 (C)

个以上称为非流畅性口语。

A.30

B.40

C.60

D.100

E.20

3.自发命名是让患者在 (D) 秒内尽可能多地说出动物的名称。

A.5 分钟

B.4 分钟

C.2 分钟

D.1 分钟

E.3 分钟

4.正常喉发音“啊”能持续 (B) 秒。

A.10

B.15

C.5

D.30

E.20

5.正常言语速度为每秒 (C) 个字。

A.1~2

B.6~8

C.2~4

D.10~12

E.0~2

6.正常言语速度每分钟 (B) 个字。

A.20~30

B.200~300

C.50~100

D.100~150

E.150~200

7.构音检查记录方法中“○”代表 (A)。

A.正常

B.置换

C.省略

D.歪曲

E.复述引出

8.儿童在3岁时大约能说出 (B) 个词。

A.500

B.1000

C.600

D.2000

E.100

9.失语商小于 (C) 就可以判定为失语。

A.96

B.87

C.93.8

D.92

E.0

10.S-S 评定法适用于 (D) 岁的语言发育迟缓功能评定。

A.1

B.3

C.10

D.1~6.5

E.4

11.语言功能检测要求在 (B) 小时之内完成。

A.0.5 B.1~1.5 C.2 D.3 E.4

12.Halstead-Wepman 失语症筛选测验是一种判断 (A) 的快速筛选测验方法。

A.有无失语障碍

B.肢体功能障碍

C.认知功能障碍

D.失语症

E.以上都是

13.咬字不清、说话模糊或发单音有困难，模仿语言发音不如自发语言应为 (C)

A.刻板语言

C.发音障碍

D.找词困难

E.说话困难

14.只能说几个固定的词语或短语，如“妈妈”、“八”，有时会发出无意义的声音为（A）。

A.刻板语言

B.错语

C.发音障碍

D.找词困难

E.说话困难

15 说话不流畅、缓慢，伴有全身用力、叹气及附加表情和手势应为（A）。

A.刻板语言

B.错语

C.发音障碍

D.找词困难

E.说话困难

16.Brcoa 失语的病灶部位在（B）。

A.额中回后部

B.额下回后部

C.颞中回后部

E.颞下回后部

17.命名性失语病灶部位在 (C)。

A.额中回后部

B.额下回后部

C.左聂顶枕结合区

D. 颞上回后部

E.颞中回后部

18.正常听力是能够清晰地分辨 (C) 以下的声音。

A.<6dB

B.<16dB

C.<25dB

D.<50dB

E.<100dB

19.大脑半球哪些部位与语言的关系密切 (E)

A.额下回后部

B.聂上回后部

C.顶叶

D.聂中回后部

E.以上都是

20.语言发展迟缓筛选的内容有 (E)

A.言语活动观察

C.口语表达观察

D.阅读观察

E.以上都是

21.语言评估的一般内容包括 (E)

A.听觉理解

B.阅读理解

C.口语表达

D.书写

E.以上都是

22.失语症评估中命名的检查包括 (E)

A.物体命名

B.自发命名

C.完成句子

D.反应性命名

E.以上都是

23.言语评估一般内容中，听觉理解包括 (E)

A.单词辨认

B.是非回答

C.执行口头指令

D.句子的保持

E.以上都是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/385212113314011043>