

# 2023 年主治医师之内科主治 303 通关题库(附带答案)

## 单选题（共 40 题）

1、非甾体抗炎药是通过抑制以下哪个介质的产生而起到镇痛、解热、消肿的作用

- A. T 淋巴细胞
- B. 免疫复合物
- C. 白介素-1
- D. 前列腺素
- E. 肿瘤坏死因子- $\alpha$

【答案】 D

2、女性，8 岁，因贫血、脾大入院。检验：HGB90g/L，WBC $8.8 \times 10^9/L$

- A. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- B. 自身免疫性溶血性贫血
- C. 珠蛋白生成障碍性贫血
- D. 遗传性球形红细胞增多症
- E. G6PD 缺乏症

【答案】 C

3、患者，男性，35 岁，四肢无力、僵硬 2 年，肢体活动后疼痛明显，睡眠时正常，运动时肌肉痉挛，继续运动后痉挛症状反而减轻，检查发现肌红蛋白尿

- A. 肌膜下大泡，PAS 阳性
- B. 肌纤维出现大小不一空泡，PAS 阴性

- C. 无明显改变
- D. 肌纤维萎缩
- E. 肌纤维坏死伴炎性细胞浸润

【答案】 A

4、下列关于慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病(CIDP)的叙述中正确的是

- A. CIDP 的临床特点是慢性病程但不会复发
- B. CIDP 起病隐袭，激素治疗疗效肯定
- C. CIDP 在各年龄均可发病，其中以儿童多见
- D. CIDP 是由 AIDP 迁延而来的
- E. CIDP 病理表现与 AIDP 一样都是脱髓鞘性改变

【答案】 B

5、男性，20岁，1型糖尿病，两天来出现恶心，面潮红，呼吸深快，渐发生神志模糊、以致昏迷，最可能的诊断是

- A. 乳酸性酸中毒
- B. 尿毒症酸中毒
- C. 呼吸性酸中毒
- D. 糖尿病酮症酸中毒
- E. 糖尿病高渗昏迷

【答案】 D

6、急性房颤是指

- A. 突然发作，每次持续时间在6小时内的

- B. 初次发作的房颤且在 6 小时内的
- C. 突然发作，每次持续时间 24~48 小时
- D. 初次发作的房颤且在 24~48 小时内的
- E. 以上都不对

【答案】 D

7、下列不符合 Sheehan 综合征的表现和实验室检查的是

- A. 常有产后大出血史
- B. 血中 T
- C. 血中皮质醇下降
- D. 视野狭窄
- E. 闭经，腋毛、阴毛脱落

【答案】 D

8、关于 DKA（糖尿病酮症酸中毒）说法错误的是

- A. 胰岛素治疗应监测血糖，血糖以每小时下降 1.9~3.9mmol/L 为宜
- B. 尿量<30ml/h 应该待尿量增加后再补钾
- C. 主要症状有恶心、呕吐、呼吸深大、烂苹果味、腹痛
- D. 尿酮体强阳性
- E. 治疗需要大量补液

【答案】 A

9、男性，53 岁，低热 1 周，伴焦虑、易怒、心悸、多汗。查体：T37.6℃，P100 次/分；甲状腺可触及，右侧有结节、质硬、触痛明显，无震颤及杂音；舌、手细震颤(+)。ESR78mm/h

- A. TSH 兴奋试验
- B. TRAb
- C. 甲状腺穿刺
- D. TGAb、TPOAb
- E. T3 抑制试验

【答案】 C

10、男，50岁，既往体健，查体时发现肝在右肋下2cm，质硬、压痛，脾可触及，锌浊度试验20单位、ALT正常范围，肝穿刺病理有假小叶形成，应诊断为

- A. 肝淤血
- B. 代偿期肝硬化
- C. 慢性持续性肝炎
- D. 肝囊肿
- E. 慢性活动性肝炎

【答案】 B

11、下述哪项不是上消化道大出血的最常见原因

- A. 胆道出血
- B. 食管贲门黏膜撕裂综合征
- C. 消化性溃疡
- D. 胃癌
- E. 食管胃底静脉曲张破裂

【答案】 A

12、ANCA 相关性肾小球肾炎的早期肾脏病理多表现为

- A. 局灶节段性肾小球毛细血管襻坏死
- B. 新月体性肾小球肾炎
- C. 膜增生性肾小球肾炎
- D. 局灶节段性肾小球硬化
- E. 系膜增生性肾小球肾炎

【答案】 A

13、某男性工人，接尘工龄 21 年，主诉轻度运动后即感呼吸困难，体温正常，无明显咳痰，诊断一期石棉肺半年

- A. 肺活量和用力肺活量均正常
- B. 肺活量和用力肺活量降低，而第一秒用力呼气容积 / 用力肺活量变化不明显
- C. 肺活量和时间肺活量均明显异常
- D. 肺活量正常，用力肺活量异常
- E. 用力肺活量下降，第一秒用力呼气容积 / 用力肺活量异常

【答案】 B

14、引起同侧头面部痛温觉障碍、同侧 Horner 综合征的是

- A. 大脑脚底综合征
- B. 脑桥背侧部综合征
- C. 延髓内侧综合征
- D. 延髓外侧综合征
- E. 脑桥基底部综合征

【答案】 D

15、患者男，41岁，反复腰背部疼痛不适6年，加重伴左侧胸锁关节肿痛1个月。疼痛以夜间为著，活动后可减轻。查体：左侧胸锁关节肿胀，局部皮温高，触痛明显。指地试验阳性，双侧“4”字试验阳性。

- A. 反应性关节炎
- B. 强直性脊柱炎
- C. 痛风
- D. 骨关节炎
- E. 风湿性关节炎
- F. 类风湿关节炎

【答案】 B

16、对于肠结核的临床表现下列哪项不正确

- A. 腹部肿块主要见于增生型肠结核
- B. 多见于青少年与壮年
- C. 腹泻是溃疡型肠结核的主要临床表现之一
- D. 多不伴有肺结核
- E. 多数起病缓慢

【答案】 D

17、下述致肺部感染的厌氧菌中，哪种对青霉素不敏感

- A. 消化球菌属
- B. 核粒梭形杆菌
- C. 微需氧链球菌
- D. 脆弱类杆菌

E. 消化链球菌属

【答案】 D

18、颅内压升高时，下列脑神经最容易受损的是

A. 舌咽神经

B. 三叉神经

C. 位听神经

D. 展神经

E. 面神经

【答案】 D

19、胸腔积液多见于左心衰竭和右心衰竭并存时，产生的机制是

A. 营养不良，血浆蛋白浓度降低

B. 心源性肝硬化

C. 胸壁毛细血管壁缺氧，通透性增加

D. 胸膜脏层和壁层静脉回流受阻

E. 钠、水潴留

【答案】 D

20、下列各项检查中，用来鉴别 Cushing 病和肾上腺皮质癌较可信的是

A. 小剂量地塞米松抑制试验

B. 血皮质醇测定

C. 大剂量地塞米松抑制试验

D. 尿游离皮质醇测定

E. 尿 17-羟测定

【答案】 C

21、卡马西平治疗癫痫时应当注意对患者进行下列哪项辅助检查

A. 肾功能

B. 血清钾、钠、氯

C. 血常规

D. 抗核抗体

E. 血清肌酶

【答案】 C

22、女性，30岁，因下肢水肿2周就诊，体检：血压200/100mmHg，尿蛋白(+++)，红细胞10~15个/HP，血Cr150 $\mu$ mol/L，血白蛋白32g/L

A. 有无夜尿增多

B. 妊娠与分娩情况

C. 有无关节“晨僵”现象

D. 有无高血压家族史

E. 近期感染史

【答案】 C

23、肠结核

A. 哨兵祥和结肠切割征

B. 鸟嘴征

C. 跳跃征



- D. 铅管征
- E. 鹅卵石征

【答案】 C

24、患者，女性，56岁，左面部反复发作性剧烈疼痛1年，每次持续数秒，突发突止，讲话、吃饭可诱发，头颅MRI结果未见异常

- A. 无阳性体征
- B. 患侧咀嚼肌无力
- C. 患侧角膜反射消失
- D. 患侧面部感觉减退
- E. 张口时下颌偏向患侧

【答案】 A

25、下列利于铁吸收的是

- A. 茶叶
- B. 金属(镓、镁)
- C. 维生素C
- D. 碳酸钙
- E. H

【答案】 C

26、男性，50岁，间断腹痛、腹泻20余年，加重3个月，大便4~5次/天。纳差，体重下降。化验便潜血(±~+)，有脓细胞、红细胞。血Hb104g/L。

- A. 病史长达20年
- B. 便内有脓细胞

- C. 轻度贫血
- D. 体重下降
- E. 大便潜血(+)

【答案】 A

27、属于肌肉疾病的是

- A. 周期性瘫痪
- B. 脑淀粉样血管病
- C. 吉兰-巴雷综合征
- D. 帕金森病
- E. 脊髓空洞症

【答案】 A

28、女性，60岁，2年前患乳腺癌手术治疗。1个月来出现胸闷、气促就诊，查体发现心影向两侧扩大，心音减弱，脉压减小

- A. 心包穿刺查心包积液性质
- B. 结核菌素试验
- C. 胸部CT检查
- D. 冠状动脉造影
- E. 纤维支气管镜

【答案】 A

29、不属于特殊感觉的是

- A. 复合感觉

- B. 视觉
- C. 听觉
- D. 味觉
- E. 嗅觉

【答案】 A

30、下述物质中不引起支气管哮喘发病的炎性介质是

- A. 前列腺素
- B. 嗜酸性粒细胞趋化因子
- C. 白三烯
- D. 心钠素
- E. 血小板活化因子

【答案】 D

31、肌肉组织摄取氨基酸能力下降引起

- A. 空腹高血糖
- B. 甘油三酯升高
- C. 消瘦乏力，伤口不易愈合
- D. 反应性低血糖
- E. 餐后高血糖

【答案】 C

32、女性，46岁。支气管哮喘急性发作，血气分析示 PaCO

- A. 病情好转

- B. 病情恶化
- C. 无临床意义
- D. 出现心力衰竭
- E. 出现呼吸性碱中毒

【答案】 B

33、对化疗较为敏感的肿瘤是

- A. 绒毛膜上皮癌
- B. 直肠癌
- C. 肝癌
- D. 淋巴肉瘤
- E. 胃癌

【答案】 A

34、下述哪项不是特发性肺纤维化的特点

- A. 肺部可闻及 Velcro 啰音
- B. 肺功能呈阻塞性通气功能障碍
- C. 胸部 X 线片上双肺间质浸润影
- D. 原因不明
- E. 肺实质炎症和进行性肺间质纤维化

【答案】 B

35、对确诊囊尾蚴病帮助最大的是

- A. 无其他原因可查的癫痫发作

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/385331244122011111>