

2024 年甘肃省白银区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题通关秘籍题库附答案【巩固】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 易风化的药物是()。

- A: 硝酸甘油
- B: 胃蛋白酶
- C: 硫酸镁
- D: 青霉素

答案：C

2. 非甾体类抗炎药引起的典型药源性疾病是

- A: 肌病
- B: 血液系统疾病
- C: 胃肠道反应
- D: 神经系统疾病

答案：C

3. pH 碱性的感染尿液常见

- A: 尿酸盐结晶
- B: 酪氨酸和亮氨酸结晶
- C: 磷酸盐结晶
- D: 草酸盐结晶

答案：C

4. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速做出准确判断，及时果断地采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

A: 20~30min

B: 15~30min

C: 10~20min

D: 5~10min

答案：B

5. 适用于早期、轻度症状者

A: 左旋多巴

B: 司来吉兰

C: 恩托卡朋

D: 苯海索

答案：B

6. “特异体质的患者及其家族成员可能发生过同样反应（如药物过敏）”提示诊断药源性疾病必须

A: 致病药物的确定

B: 询问用药过敏史和家族史

C: 排除药物以外的因素

D: 流行病学的调查

答案：B

7. （2019 年真题）长期应用糖皮质激素后的实验室检查结果常会出现

A: 淋巴细胞减少

B: 淋巴细胞增多

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 中性粒细胞减少

答案：A

8. 对血管平滑肌选择性高，对心肌收缩力或心肌传导作用影响很小的
是

A: 哌唑嗪

B: 硝酸甘油

C: 氨氯地平

D: 普萘洛尔

答案：C

9. (2018 年真题) 患者, 男, 36 岁, 因发热、咳嗽就诊, 查血常规: 白细胞计数 $6.28 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 65.7%, 淋巴细胞百分比 15.1%。
诊断为感冒。医生处方: 阿奇霉素片 0.5g qd po. 该处方属于 ()

A: 用法、用量不适宜

B: 有禁忌证用药

C: 有配伍禁忌

D: 无适应证用药

答案：D

10. 用于消渴的中成药中可能添加的化学药成分是

A: 吡嗪美辛

B: 格列本脲

C: 阿卡波糖

D: 苯巴比妥

答案：B

11. 下列药物中，解救硫喷妥钠中毒的特效药是

- A: 硫酸铜
- B: 丙烯吗啡
- C: 碳酸氢钠
- D: 硫酸镁

答案：C

12. 下列叙述正确的是

- A: 单核细胞为有粒细胞
- B: 淋巴细胞为有粒细胞
- C: 有粒细胞根据其颗粒的嗜好可分为中性、嗜酸性、嗜碱性 3 种
- D: 白细胞均是有粒细胞

答案：C

13. (联合用药) 感染性腹泻患者应用小檗碱+鞣酸蛋白属于

- A: 超适应证用药
- B: 超剂量用药
- C: 非适应证用药
- D: 过度治疗用药

答案：D

14. 患者，男，50 岁。患梗阻性黄疸，其粪外观可呈现

- A: 乳凝块便
- B: 鲜血便
- C: 白陶土样便
- D: 细条便

答案：C

15. 患者,男,34 岁,有吸毒史。因过量使用阿片类药物昏迷入急诊抢救,表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制,可选用的解救药物是()

- A: 纳洛酮
- B: 维生素 K
- C: 亚甲蓝
- D: 二巯丙醇

答案: A

16. (2016 年真题) 在指导合理用药时,应交代宜在睡前服用的药物是()。

- A: 硫酸亚铁
- B: 苯妥英钠
- C: 辛伐他汀
- D: 双磷酸盐

答案: C

17. 服用维生素 B

- A: 食盐
- B: 脂肪
- C: 酒
- D: 食醋

答案: C

18. 可引起泌尿生殖系统异常,指趾畸形的是

- A: 甲巯咪唑
- B: 氮芥类
- C: 雌孕激素
- D: 沙立度胺

答案：B

19. 由环境（灰尘、风沙、倒睫、屈光不正）刺激所致的非细菌性结膜炎可选用

- A: 硫酸锌滴眼液
- B: 1%泼尼松龙滴眼液
- C: 杆菌肽眼膏
- D: 碘苷滴眼液

答案：A

20. 常见老年人 ADR 的药物类别,硝苯地平可出现面部潮红、心慌、头痛等反应

- A: 抗胆碱药
- B: 抗生素
- C: 钙通道阻滞剂
- D: β 受体阻断剂

答案：C

21. 以下关于抑郁症的介绍错误的是

- A: 该病具有高发病、高复发、高致残的特点
- B: 抑郁症的病因明确
- C: 抑郁症的好发年龄在 20~50 岁
- D: 及时恰当的治疗能提高抑郁症的临床治愈率

答案：B

22. （2019 年真题）关于处方开具和调剂的说法，正确的是

- A: 应使用淡红色处方开具第二类精神药品
- B: 处方开具后 7 日内有效

C: 查处方时“四查”是指查对药名、剂型、规格和数量

D: 调剂处方时应做到“四查十对”

答案：D

23. 失神发作首选

A: 苯妥英钠

B: 卡马西平

C: 丙戊酸钠

D: 拉莫三嗪

答案：C

24. 患者,男,60岁,坏死性胰腺炎剖腹探查术术后2年,恢复良好。进食油炸食品后出现轻度腹泻。宜选用的药物是()

A: 奥美拉唑肠溶胶囊

B: 干酵母片

C: 复方阿嗪米特肠溶片

D: 蒙脱石散

答案：C

25. 患者,男,46岁,因心绞痛伴房颤,给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌症是()

A: 痛风

B: 冠心病

C: 心力衰竭

D: 双侧肾动脉狭窄

答案：C

26. 贫血患者常出现

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 血小板增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 血红蛋白减少

答案：D

27. 起效较慢，需要 3 个月才可以改善由前列腺增生所导致的尿路梗阻，减少残余尿量的 5 α 还原酶抑制剂是

- A: 特拉唑嗪
- B: 氟伏沙明
- C: 非那雄胺
- D: 阿夫唑嗪

答案：C

28. 绝经激素治疗的基本原则错误的是

- A: 对有子宫的妇女，补充雌激素的同时必须加上孕激素
- B: 选择能达到治疗目的的最低有效剂量
- C: 药物选择个体化，剂量个体化
- D: 治疗窗口为绝经 5 年之内或 50 岁之前

答案：D

29. (2016 年真题) 患者接受顺铂化疗时，药师应重点监测的不良反应是 ()。

- A: 心脏毒性
- B: 肺纤维化
- C: 肾脏毒性
- D: 肝脏毒性

答案：C

30. 关于处方书写中的基本要求错误的

- A: 一般情况下均要注明临床诊断
- B: 年龄必须写实足年龄
- C: 中药饮片调剂、煎煮的特殊要求注明在药品左上方并加括号
- D: 麻醉药品处方应有病历记录

答案: C

31. 病毒神经氨酸酶抑制剂（扎那米韦、奥司他韦）使用的最佳时间是

- A: 在流感症状初始 48 小时内
- B: 在流感症状严重 24 小时内
- C: 在流感症状初始时
- D: 在流感症状严重时

答案: A

32. 妥布霉素可导致药源性肾病的机制是

- A: 前列腺素合成障碍
- B: 肾小球滤过率下降
- C: 结晶沉积
- D: 不可逆性肾小管坏死

答案: B

33. （2018 年真题）患者，女，38 岁，已婚，妊娠 2 个月，近日自觉心慌、多汗，查 FT3、FT4 偏高 TSH0.01mU/L，临床诊断为甲状腺功能亢进症适宜的治疗方案为（）

- A: 终止妊娠，选用丙硫氧嘧啶治疗
- B: 维持妊娠，选用甲巯咪唑治疗
- C: 维持妊娠，行甲状腺切除手术

D: 维持妊娠,选用丙硫氧嘧啶治疗

答案: D

34. 诊断为输尿管结石,给予黄体酮,应评判为

A: 有禁忌证用药

B: 联合用药不适宜

C: 过度治疗用药

D: 无正当理由超适应证用药

答案: D

35. 用于治疗苯二氮类药物中毒的特殊解毒剂是 ()

A: 二巯丁二钠

B: 氟马西尼

C: 乙酰胺

D: 纳洛酮

答案: B

36. 冠心病二级预防的“ABCDE”方案中,“A”是指

A: 控制饮食和糖尿病

B: 阿司匹林和 ACEI

C: 健康教育和运动

D: β 受体阻断剂和血压控制

答案: B

37. 弥漫性青铜色色素沉着

A: 氟尿嘧啶

B: 博来霉素

C: 柔红霉素

D: 白消胺

答案：D

38. 医师无权调配处方

A: 经济性

B: 有效性

C: 技术性

D: 法律性

答案：D

39. 以下中毒后药物拮抗的叙述中，属于物理性拮抗的是

A: 二巯丙醇解救汞中毒

B: 药用炭吸附

C: 弱碱中和强酸

D: 依地酸钙钠解救铅中毒

答案：B

40. 治疗大肠埃希菌所致的尿路感染，不宜选用的抗菌药物是：

A: 阿奇霉素

B: 阿莫西林

C: 左氧氟沙星

D: 头孢呋辛

答案：A

41. 肝功能不全者服用由肝脏清除，但并无明显毒性反应的药物时

A: 必须减量应用

B: 须谨慎使用，必要时减量给药

C: 一般无需调整剂量

D: 避免使用

答案：B

42. 血浆半衰期最长的强心苷类药物是

A: 地高辛

B: 卡维地洛

C: 米力农

D: 洋地黄毒苷

答案：D

43. (2018 年真题) 患者, 男, 65 岁, 因腹胀, 呕吐就诊, 医生处方, 甲氧氯普胺片 20mg tid po 该处方属于 ()

A: 有禁忌证用药

B: 无适应证用药

C: 用法、用量不适宜

D: 有配伍禁忌

答案：C

44. 某口服避孕药复方制剂, 其成分为: 每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下, 请回答问题。

A: 到 21 日 20:00 再同时服用两片药, 然后在常规时间继续服药

B: 不再继续服用此周期药物, 经过一个 7 天的停药期, 再开始继续服用下一周期的药物

C: 尽快同时服用两片药, 然后在常规时间继续服药, 在以后的 7 天内要加用屏障避孕法

D: 尽快补服一片, 然后在常规时间继续服药

答案：D

45. 开发药品计算机管理系统，自动检测药品剂量、过敏反应等用药信息，归属于

- A: 人员知识培训
- B: 环境与流程的优化与持续改进
- C: 管理规范到位
- D: 科学发展

答案：B

46. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg。1 天前开始发热，体温 39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，每间隔 2~3 小时排 1 次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次 / 分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9 / L$ ，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用
- B: 腹泻可致电解质丢失，故需特别注意补充
- C: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用
- D: 首选口服补液，必要时静脉补液

答案：C

47. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mgtidpo，阿托伐他汀钙片 20mgqdpo 等药物治疗。

- A: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片
- B: 停用阿托伐他汀钙片
- C: 停用瑞格列奈片
- D: 停用二甲双胍肠溶片

答案：B

48. 各种肠道染性或非感染性腹泻，或急性胃肠炎可引起

- A: 稀糊状或水样粪便
- B: 脓状便
- C: 黏液便
- D: 米泔水样便

答案：A

49. 多柔比星的通用名是

- A: 无环乌苷片
- B: 病毒唑
- C: 阿霉素
- D: 克毒星

答案：C

50. 属于一级文献的是

- A: 《中国新药》
- B: 《中文科技资料目录：中草药》
- C: 《国际药学文摘》
- D: 《中国药学文摘》

答案：A

51. 患者，女，62 岁，医师处方如下：姓名：×××性别：女年龄：62 岁
临床诊断：2 型糖尿病、高血压 2 级、高脂血症、PCI 术后

- A: 氨氯地平
- B: 氯吡格雷
- C: 二甲双胍
- D: 阿卡波糖

答案：A

52. 患者，女，60 岁。患肥胖症，检查可见 TG2.0mmol/L。主要降低 TG 的下列药物首选

- A: 氟伐他汀
- B: 普罗布考
- C: 非诺贝特
- D: 考来烯胺

答案：C

53. “调查显示，应用过庆大霉素治疗的霍乱患者肾衰竭的发病率是未用患者的 5 倍”提示诊断药源性疾病应该进行

- A: 排除药物以外的因素
- B: 致病药物的确定
- C: 流行病学的调查
- D: 询问用药过敏史和家族史

答案：C

54. 正规胰岛素的作用峰时为()。

- A: 0.25~0.5 小时
- B: 0.6~1.5 小时
- C: 6~12 小时
- D: 1.5~4 小时

答案：A

55. 属于超短效的胰岛素制剂是

- A: 甘精胰岛素
- B: 低精蛋白锌胰岛素

C: 精蛋白锌胰岛素

D: 赖脯胰岛素

答案: D

56. 人体贮存能量的形式为

A: 三酰甘油

B: 糖化血红蛋白

C: 胆固醇

D: 高密度脂蛋白胆固醇

答案: A

57. 治疗干眼症人工泪液合理的起始应用剂量是每只眼

A: 二滴，一日 4 次

B: 一滴，一日 2 次

C: 三滴，一日 4 次

D: 一滴，一日 4 次

答案: D

58. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，身高 156cm，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 6.7%。

A: 格列美脲片

B: 瑞格列奈片

C: 二甲双胍片

D: 阿卡波糖片

答案: A

59. 大剂量或连续使用顺铂可导致

A: 不可逆性肾小管坏死

- B: 直接肾毒性
- C: 肾间质纤维化
- D: 肾小管阻塞

答案：A

60. 有双侧肾动脉狭窄的高血压患者不宜选用

- A: 维拉帕米
- B: 多沙唑嗪
- C: 卡托普利
- D: 哌唑嗪

答案：C

61. 患者，女，27 岁，孕 32 周，因尿急尿痛就诊，诊断为尿路感染，应选用的药物是（）

- A: 阿莫西林胶囊
- B: 复方磺胺甲噁唑片
- C: 莫西沙星片
- D: 阿奇霉素片

答案：A

62. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受到外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期为胎儿发育的最后阶段，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 妊娠 3~4 周
- B: 妊娠 1~2 周
- C: 妊娠 3~5 周
- D: 妊娠 1~3 周

答案：C

63. 血尿酸检查超过正常值

- A: 诊断痛风
- B: 诊断消化性溃疡
- C: 诊断急性胰腺炎
- D: 诊断心肌梗死

答案：A

64. 用于治疗溃疡性结肠炎，应多饮水，保持高尿流量，以防结晶尿的发生，必要时服用碳酸氢钠碱化尿液的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 格列吡嗪
- C: 阿卡波糖
- D: 西格列汀

答案：B

65. 下列药物中使用前无需皮试的是

- A: 抑肽酶注射剂
- B: 抗狂犬病病毒血清注射剂
- C: 苄星青霉素注射剂
- D: 紫杉醇注射剂

答案：D

66. (2015 年真题) 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160/105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol/L (参考范围 <7.8mmol/L)，甘油三酯 1.52mmol/L (参考范围 0.56~1.70mmol/L)，总胆固醇 6.26mmol/L (参考范围 <5.2mmol/L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol/L (参考范围 2.1~3.1mmol/L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol/L (参考范围 1.2~1.65mmol/L)，肌酐 $60\mu\text{mol/L}$ (参考范围 $45\sim 84\mu\text{mol/L}$)，蛋白尿：++。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 适当运动
- B: 控制体重
- C: 减少脂肪摄入
- D: 不必限盐

答案：D

67. 1 级高血压标准是

- A: 收缩压 160~179mmHg 和 (或) 舒张压 100~109mmHg
- B: 收缩压 120~139mmHg 和 (或) 舒张压 80~89mmHg
- C: 收缩压 140~159mmHg 和 (或) 舒张压 90~99mmHg
- D: 收缩压 $\geq 180\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $\geq 110\text{mmHg}$

答案：C

68. 不能解除病因，不宜长期服用的；但对慢性钝痛如牙痛、头痛、关节痛等有较好的镇痛效果药物是

- A: 谷维素
- B: 阿司匹林
- C: 罗通定
- D: 地西泮

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

69. 关于奥利司他说法错误的是

A: 可干扰维生素的吸收

B: 应在服药前 2h 补充维生素

C: 进餐时服用

D: 对肝脏无影响

答案：D

70. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

A: 受精后 3 周至 2 个月

B: 受精后 3 周至 3 个月

C: 受精后 2 周至 3 个月

D: 受精后 1 周至 3 个月

答案：B

71. 后记

A: 临床诊断、费别

B: 主要实验室数据

C: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量

D: 医师签名、药品金额

答案：D

72. 洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀等他汀类所致的药源性损伤为

A: 胃肠道损害

B: 肾损害

C: 肺损害

D: 肝损害

答案：D

73. 下列药品中，最容易吸湿的是

A: 硫酸钠

B: 维生素 D

C: 甘油

D: 乙醇

答案：C

74. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

A: 氯吡格雷片

B: 对乙酰氨基酚片

C: 华法林片

D: 双嘧达莫片

答案：A

75. 肾或膀胱结石

A: 尿酸盐结晶

B: 草酸盐结晶

C: 磷酸盐结晶

D: 酪氨酸和亮氨酸结晶

答案：B

76. 血栓性疾病女性患者的凝血酶原时间可能短于

A: 10 秒

B: 16 秒

C: 18 秒

D: 11 秒

答案：D

77. 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A: 酚麻美敏口服溶液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药

B: 酚麻美敏口服溶液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药

C: 酚麻美敏口服溶液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药

D: 酚麻美敏口服溶液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚，应避免重复用药

答案：B

78. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔前可使用

A: 3%酚甘油滴耳液

B: 2%酚甘油滴耳液

C: 3%过氧化氢溶液

D: 2%过氧化氢溶液

答案：B

79. 甲状腺功能亢进合并哮喘的患者慎用的药物是()

A: 奥马珠单抗(抗 IgE 抗体)

B: 沙美特罗

C: 茶碱

D: 异丙托溴铵

答案：C

80. 异烟肼+链霉素+对氨基水杨酸钠治疗结核病属于

- A: 延缓细菌耐药性的产生
- B: 减少药物不良反应
- C: 提高药物疗效
- D: 治疗多种疾病

答案：A

81. 上市后因出现局部缺血性结肠炎，并有死亡病例报道而导致撤市的药物是

- A: 利巴韦林
- B: 阿洛司琼
- C: 阿昔洛韦
- D: 甲氨蝶呤

答案：B

82. 治疗肠道蛔虫病可选用()

- A: 莫沙必利
- B: 双八面体蒙脱石散
- C: 阿苯达唑
- D: 聚乙醇 4000

答案：C

83. 患者，男，43 岁，患有家族性痛风，既往有磺胺类药物过敏史患者在服药 7 天后，疼痛症状完全缓解。为了保证患者能够规律治疗，药师在回访后推荐患者在此次痛风急性发作 2 周后应开始服用的药物是

- A: 碳酸氢钠
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 丙磺舒

D: 别嘌醇

答案: D

84. 患者，男，21 岁，患有肝豆状核变性病，可选用的治疗药物是

A: N-乙酰半胱氨酸

B: 青霉胺

C: 亚甲蓝

D: 纳洛酮

答案: B

85. 成人血小板计数正常参考区间是

A: $(200 \sim 300) \times 10$

B: $(100 \sim 300) \times 10$

C: $(11.0 \sim 12.0) \times 10$

D: $(4.0 \sim 10.0) \times 10$

答案: B

86. 患者，女，38 岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力 2 日；查体：神清、气稍促，心律 95bpm，律齐，体温 39.1℃，血压 110 / 70mmHg；心肺听诊：两肺呼吸音粗，未及明显啰音；发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

A: 右美沙芬可引起嗜睡，驾车、高空作业或操作机器者宜慎用；妊娠期妇女、严重高血压者、有精神病史者禁用

B: 镇咳药连续口服 1 周，症状未缓解或消失可改用肾上腺皮质激素

C: 对支气管哮喘时的咳嗽宜适当合用平喘药，缓解支气管痉挛，并辅助镇咳和祛痰

D: 对于干性咳嗽可单用镇咳药；对痰液较多者应以祛痰为主，镇咳药合用祛痰剂。以利于痰液排出和加强镇咳效果

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/386145055100011030>