

# 福建省南安市整理《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题王牌题库含答案（轻巧夺冠）

## 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 妊娠初始 3 个月妇女禁用的药品是

- A: 硫糖铝
- B: 阿司匹林
- C: 乳酸菌素
- D: 沙利度胺

**答案：D**

2. 痛风急性发作期选用的抗痛风药物

- A: 呋塞米
- B: 阿司匹林
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

**答案：C**

3. 抗肿瘤药物中，影响核酸合成的药物是

- A: 顺铂
- B: 甲氨蝶呤
- C: 依托泊苷
- D: 放线菌素

**答案：B**

4. 可用于评价肾功能的指标不包括

- A: BUN
- B: AST
- C: Cr
- D: 尿沉渣结晶

**答案：B**

5. 属于妊娠 C 级毒性药品的是

- A: 氧氟沙星
- B: 辛伐他汀
- C: 水溶性维生素
- D: 青霉素、头孢哌酮-舒巴坦

**答案：A**

6. 白细胞分类中，嗜酸性粒细胞参考范围为

- A: 20%~40%
- B: 50%~70%
- C: 1%~5%
- D: 3%~8%

**答案：C**

7. 可用于氰化物中毒的药物是

- A: 碘解磷定
- B: 亚硝酸钠
- C: 乙酰胺
- D: 维生素 K1

**答案：B**

8. 在检查尿沉渣的项目中，最能提示是肾实质性病变的证据是

- A: 尿沉渣结晶
- B: 尿沉渣管型
- C: 尿沉渣白细胞
- D: 尿沉渣磷酸盐结晶

**答案：B**

9. 药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示有明确的风险，有必要采取措施以降低风险的信号属于

- A: 部分确认的信号
- B: 驳倒的信号
- C: 尚不确定的信号
- D: 确认的信号

**答案：D**

10. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 青霉素
- B: 氯霉素
- C: 链霉素
- D: 红霉素

**答案：C**

11. 与阿莫西林配伍，可提高疗效的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 苄丝肼

C: 克拉维酸钾

D: 叶酸

**答案: C**

12. 患者，男，72 岁，在晨练中突然感觉胸痛，倒地不起，周围伙伴急忙拨打 120。医务人员赶到现场后，初步诊断是心绞痛急性发作。经简单急救后，将病人送至医院治疗。并为患者开具了下列药物：阿司匹林肠溶片、洛伐他汀、硝苯地平、硝酸甘油。

A: 75~150mg

B: 10~20mg

C: 25~50mg

D: 300~600mg

**答案: A**

13. (2018 年真题) 患者，男，67 岁，慢性哮喘 20 余年，现因哮喘急性发作就诊，首选的药物是 ( )

A: 异丙托溴铵气雾剂

B: 二羟丙茶碱片

C: 沙丁胺醇气雾剂

D: 氨茶碱片

**答案: C**

14. 服药时饮酒可引起低血糖的是

A: 格列本脲

B: 西咪替丁

C: 硫酸亚铁

D: 维生素 A

**答案: A**

15. 泌尿系统感染可能出现的尿常规检查异常是

- A: 尿沉渣尿酸盐结晶
- B: 尿沉渣白细胞增多
- C: 尿沉渣管型异常
- D: 尿沉渣结晶异常

**答案：B**

16. 对于效果不易察觉或起效慢的药物，应特别提示、告知坚持服药

- A: 使用分时药盒和用药记录
- B: 针对患者生理及心理特点选药
- C: 简化治疗方案
- D: 使患者了解药物的重要性

**答案：D**

17. 治疗艾滋病的非核苷类逆转录酶抑制剂是（）

- A: 拉米夫定
- B: 阿昔洛韦
- C: 利巴韦林
- D: 依非韦伦

**答案：D**

18. 患者，女，46 岁，高血压病史 3 年，2 年前出现关节晨僵、手关节及膝关节疼痛，诊断为类风湿关节炎。半年前症状加重，采用了联合用药方案：患者用药如下：

- A: 羟氯喹片
- B: 甲氨蝶呤片
- C: 双氯芬酸钠缓释片

D: 氨氯地平片

**答案: A**

19. 患者，女，16 岁，近两日因排尿困难就医。经医生询问，患者有尿急、尿频、尿痛、排尿不适、下腹痛等症状，且尿液比平时浑浊且有异味，医生测量体温为 37.4℃，确诊为尿路感染。

A: 白色念珠菌

B: 铜绿假单胞菌

C: 大肠埃希菌

D: 金黄色葡萄球菌

**答案: C**

20. 患者，女，62 岁，医师处方如下：患者：××X，性别：女，年龄：62 岁。临床诊断：2 型糖尿病高血压 2 级高脂血症 PCI 术后。

A: 氨氯地平

B: 阿卡波糖

C: 二甲双胍

D: 氯吡格雷

**答案: D**

21. 对购药患者讲授安全用药常识是

A: 主动方式

B: 质问方式

C: 指令方式

D: 被动方式

**答案: A**

22. 主要用于抗病毒的药物是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- A: 氟胞嘧啶
- B: 阿糖胞苷
- C: 阿糖腺苷
- D: 氟尿嘧啶

**答案：C**

23. 以下中毒病例中，临床应用特殊试剂能够明确诊断的是

- A: 丙咪嗪
- B: 奋乃静
- C: 硝西泮
- D: 苯巴比妥

**答案：C**

24. 夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是（）

- A: 滴眼剂
- B: 含漱剂
- C: 软膏剂
- D: 直肠栓剂

**答案：D**

25. 房颤合并支气管哮喘患者，适用于控制心室率的药物为

- A: 地尔硫卓
- B: 利伐沙班
- C: 硝苯地平
- D: 胺碘酮

**答案：A**

26. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L、甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考区间 0.56~1.70mmol / L)、总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考区间 <5.2mmol / L)、低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol / L(正常参考区间 2.1~3.1mmol / L)、高密度脂蛋白胆固醇 1.2mmol / L(正常参考区间 1.2~1.65mmol / L)、血肌酐 50 $\mu$ mol / L(正常参考区间 45~84 $\mu$ mol / L)、尿蛋白(++)。临床诊断：高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 非诺贝特
- B: 依折麦布
- C: 普罗布考
- D: 阿托伐他汀

**答案：D**

27. 季节性过敏性鼻炎主要的诱因是

- A: 花粉
- B: 季节
- C: 尘埃
- D: 真菌

**答案：A**

28. 关于冰毒的中毒解救措施，错误的是

- A: 洗胃
- B: 利尿
- C: 催吐
- D: 碱化尿液

**答案：D**

29. (消化性溃疡并发症)，幽门梗阻

- A: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血
- B: 突发上腹剧痛，继而至全腹
- C: 规律性上腹痛
- D: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物

**答案：D**

30. 不宜采用放射性  $^{131}\text{I}$  治疗的甲亢患者是

- A: 甲亢合并白细胞和（或）血小板减少或全血细胞减少患者
- B: 妊娠期、哺乳期女性甲亢患者
- C: 成人 Graves 甲亢伴甲状腺 II 度以上肿大患者
- D: 老年甲亢患者

**答案：B**

31. 2~3 度房室传导阻滞、充血性心力衰竭禁用（）。

- A: ACEI
- B: 利尿剂（袪利尿药）
- C: 利尿剂（噻嗪类）
- D: 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂

**答案：D**

32. 提示"药物都应保存在原始包装中，并不要将瓶外的标签撕掉"，是针对

- A: 特殊剂型用法
- B: 药品有效期
- C: 特殊装置药品
- D: 药品贮存

**答案：D**

33. 属于非麻醉性镇咳药的是

- A: 苯丙哌林
- B: 羟甲唑啉
- C: 沙丁胺醇
- D: 羧甲司坦

**答案：A**

34. 选择性地作用于骨性关节、有直接抗炎作用的处方药是

- A: 可待因
- B: 阿司匹林
- C: 硫酸氨基葡萄糖
- D: 塞来昔布

**答案：C**

35. 属于 HIV 蛋白酶抑制剂的是 ( )

- A: 多替拉韦
- B: 洛匹那韦
- C: 奈韦拉平
- D: 阿巴卡韦

**答案：B**

36. 并不存在风险，目前不需采取措施；评判为

- A: 验证
- B: 驳倒
- C: 待验证
- D: 确认

**答案：B**

37. 下列复方制剂中，不具有联合增效意义的是

- A: 磺胺甲噁唑—甲氧苄啶
- B: 头孢哌酮—舒巴坦
- C: 口服左氧氟沙星和硫酸亚铁
- D: 左旋多巴—苄丝肼

**答案：C**

38. 属于非核苷类逆转录酶抑制剂的是

- A: 齐多夫定
- B: 利托那韦
- C: 利巴韦林
- D: 依非韦伦

**答案：D**

39. 高血压、动脉硬化患者突然发生剧烈头痛，提示可能是

- A: 脑肿瘤
- B: 脑膜炎
- C: 动脉瘤
- D: 脑血管意外

**答案：D**

40. 药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

- A: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害
- B: 没有临床症状，无需治疗
- C: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗
- D: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

**答案：C**

41. 引起发冷、寒战、面部和四肢发绀，继而发热等输液反应的 DMARDs 是

- A: 环孢素
- B: 硫唑嘌呤
- C: 利妥昔单抗
- D: 氯喹

**答案：C**

42. 肾功能重度损害时，抗菌药减低至正常剂量的

- A:  $1/2 \sim 1/5$
- B:  $1/5 \sim 1/7$
- C:  $3/4 \sim 3/5$
- D:  $1/5 \sim 1/10$

**答案：D**

43. 下列不属于尿液检查项的是

- A: ALT
- B: LEU
- C: PRO
- D: BL

**答案：A**

44. (2018 年真题) 患者, 男, 46 岁, 拟行肠道手术, 术前 1 天使用导泻药的方法是 ( )

- A: 50%葡萄糖注射液湿敷
- B: 50%硫酸镁溶液口服
- C: 5%氯化钙注射液静脉滴注

D: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射

**答案：B**

45. 属于药品不良反应的是

- A: 合格药品过量服用导致的与用药目的无关的有害反应
- B: 服用假药导致的与用药目的无关的有害反应
- C: 合格药品使用方法不当导致的与用药目的无关的有害反应
- D: 合格药品在正常用法、用量下出现的与用药目的无关的有害反应

**答案：D**

46. 泡腾片的注意事项是

- A: 用后应漱口
- B: 宜用温开水送服，直接服用会黏附在咽喉和食管壁上引起刺激、恶心等不适
- C: 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免引起窒息
- D: 不宜在口中久含，以免影响其掩盖药物味道、控制药物在一定部位释放的目的

**答案：C**

47. 因绝经期激素替代治疗应禁用的人群是

- A: 甲状腺切除后的患者
- B: 合并高胆固醇血症的患者
- C: 6 个月内有静脉血栓栓塞史的患者
- D: 合并轻度高血压的患者

**答案：C**

48. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞  $7 \times 10^9 / L$ ，血小板  $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁  $300 \mu g / L$ 。

- A: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收
- B: 尽量空腹服用亚铁盐，以促进吸收
- C: 正常人维持体内铁平衡需要每天从食物中摄取铁 2~2.5mg
- D: 钙剂可促进铁剂吸收

**答案：A**

49. 在血液透析患者中每次给予元素铁

- A: 60mgbid
- B: 100mg/次
- C: 60mg tid
- D: 60mgqd

**答案：B**

50. 季节性过敏性鼻炎的主要诱因是

- A: 花粉
- B: 热
- C: 冷
- D: 光线

**答案：A**

51. 急性肠炎可出现()。

- A: 鲜血便
- B: 脓血便
- C: 稀糊便
- D: 脓状便

**答案：C**

52. 各种肠道感染性或非感染性腹泻，或急性胃肠炎可引起

- A: 冻状便
- B: 稀糊状或水样粪便
- C: 米泔水样便
- D: 黏液便

**答案：B**

53. 可出现痤疮样皮疹的是（）

- A: 吉非替尼
- B: 阿霉素
- C: 氟尿嘧啶
- D: 博来霉素

**答案：A**

54. 患者溃疡治愈后，因膝关节痛，需要长期服用非甾体抗炎药。为降低溃疡发生风险，首选的预防药物是（）

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 多潘立酮
- C: 奥美拉唑
- D: 替普瑞酮

**答案：C**

55. 根据 TDM 结果调整给药方案的方法不包括

- A: 稳态一点法
- B: 重复一点法
- C: 计分推算法

D: 一点法

**答案: C**

56. 患者用药治疗期间违背医师医嘱而饮酒，此时最容易导致肝损伤的药物是

A: 布洛芬

B: 氯苯那敏

C: 伪麻黄碱

D: 对乙酰氨基酚

**答案: D**

57. 尤以铅中毒疗效好的解毒剂是

A: 二巯丙醇

B: 依地酸钙钠

C: 青霉胺

D: 二巯丁二钠

**答案: B**

58. 患儿，男，3岁半，身高95cm，体重16kg一天前开始发热，20h左右出现腹泻，约3h一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。检查结果：体温38.8°C，脉搏118次/分，呼吸28次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数 $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9/L$ ~ $10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 腹泻可致电解质丢失，故需特别注意补充电解质

B: 首选口服补液，必要时静脉补液

C: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与微生态制剂同时服用

D: 益生菌应避免与小檗碱、鞣酸蛋白同时服用

**答案: C**

59. 轻症、慢性疾病适宜选用的给药途径是

- A: 腔道给药
- B: 口服给药
- C: 外用给药
- D: 肌肉注射

**答案：B**

60. 交代患者用药期间应禁止摄入酒精，以免加深中枢神经抑制的是

- A: 枸橼酸铍钾
- B: 氟西汀
- C: 米索前列醇
- D: 胰岛素注射剂

**答案：B**

61. (2017 年真题) 下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法, 错误的是 ( )

- A: 随餐服用, 并大量饮水, 可增加吸收、减少胃肠道刺激
- B: 食管炎为典型不良反应
- C: 应避免同时使用两种双膦酸盐
- D: 口服后 30 分钟内应保持立位或坐位

**答案：A**

62. 服用他达拉非后, 如果舌下含服硝酸甘油, 建议服药间隔时间应为

- A: 1 周
- B: 48 小时
- C: 24 小时
- D: 4 小时

**答案：B**

63. 患者,男,36岁,因发热、咳嗽就诊,查血常规:白细胞计数  $6.28 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞百分比 65.7%,淋巴细胞百分比 15.1%。诊断为感冒。医生处方:阿奇霉素片 0.5gqdpo. 该处方属于()

- A: 有禁忌证用药
- B: 用法、用量不适宜
- C: 有配伍禁忌
- D: 无适应证用药

**答案：D**

64. 医师无权调配处方,体现处方的

- A: 法律性
- B: 有效性
- C: 经济性
- D: 技术性

**答案：A**

65. (2017年真题)患者女,6岁,因发热体温  $38.6^{\circ}\text{C}$ 、头痛、鼻塞、流鼻涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查:白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 美洛昔康
- B: 双氯芬酸钠
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 尼美舒利

**答案：C**

66. 一旦误服该毒性物质中毒,忌用碳酸氢钠溶液洗胃的是

- A: 拟除虫菊酯类杀虫药
- B: 克仑特罗(瘦肉精)
- C: 香豆素类杀鼠药
- D: 磷化锌等灭鼠药

**答案：C**

67. 女，37 岁，前来药店购买退热药，药师应进行的咨询与指导，错误的是

- A: 如果顾客购买对乙酰氨基酚口服液，应告知患者 3 天后症状未缓解需及时就医
- B: 顾客告知自己母亲 72 岁，有慢阻肺病史，昨日出现头痛、肌肉酸痛、咽痛、咳嗽，前来替母亲购药，药师应建议顾客带家属就医，不宜自我药疗
- C: 如果得知顾客为本人购药，且已经服用过对乙酰氨基酚 3 日，症状未缓解，药师可建议患者联合服用布洛芬口服液
- D: 若经过咨询得知顾客是为家里 3 岁女儿购买，不应推荐阿司匹林

**答案：C**

68. 血浆半衰期最长的强心苷类药物是

- A: 地高辛
- B: 米力农
- C: 卡维地洛
- D: 洋地黄毒苷

**答案：D**

69. 患者，男，46 岁，拟行肠道手术，术前 1 天使用导泻药的方法是()

- A: 50%硫酸镁溶液口服
- B: 5%氯化钙注射液静脉滴注

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

C: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射

D: 50%葡萄糖注射液湿敷

**答案：A**

70. 主要不良反应为锥体外系反应的是

A: 西沙必利

B: 多潘立酮

C: 甲氧氯普胺

D: 莫沙必利

**答案：C**

71. 甲状腺功能亢进症患者服用丙硫氧嘧啶，可引起的典型药源性疾病是

A: 粒细胞减少症

B: 慢性肾衰竭

C: 消化性溃疡

D: 溶血性贫血

**答案：A**

72. 服后不宜立刻饮水，以免冲淡药物

A: 粉剂

B: 包衣片

C: 糖浆剂

D: 胶囊剂

**答案：C**

73. 以下所列药物中，有腹泻的 2 岁以下儿童不宜使用的是

A: 鞣酸蛋白

B: 洛哌丁胺

C: 双歧三联活菌制剂

D: 盐酸小檗碱

**答案: B**

74. 患者，女，42 岁，因成骨肉瘤使用环磷酰胺甲氨蝶呤联合化疗，用药过程中，者出现出血性膀胱炎。适宜的处理措施是()

A: 停药，给予糖皮质激素

B: 给予糖皮质激素冲击治疗

C: 停药，给予亚叶酸钙治疗

D: 停药，水化，给予美司钠治疗

**答案: D**

75. 患者，女，45 岁，6 个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁，在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗，症状控制较好，近 3 个月服用西咪替丁，患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱，该患者各地求医，服用各种药物，具体药物品种不详。围绕该病例，医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

A: 定期监测肝功能

B: 有条件的应测定药物血液浓度

C: 遵从联合治疗原则

D: 长期规律用药

**答案: C**

76. 治疗幽门螺杆菌感染的一线方案，其典型组方中不包括的药物是

A: 西咪替丁

B: 胶体果胶铋

C: 甲硝唑

D: 克拉霉素

**答案：A**

77. WHO 推荐 12 岁以下儿童碘的摄入范围是

A: 30~100  $\mu\text{g}/\text{d}$

B: 30~120  $\mu\text{g}/\text{d}$

C: 50~100  $\mu\text{g}/\text{d}$

D: 50~120  $\mu\text{g}/\text{d}$

**答案：D**

78. 进一步验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

A: I 期临床试验

B: II 期临床试验

C: 临床预试验

D: III 期临床试验

**答案：D**

79. 口服或静滴  $\beta$  受体阻断剂用于解救

A: 瘦肉精中毒

B: 亚硝酸盐中毒

C: 麦角胺中毒

D: 异烟肼中毒

**答案：A**

80. 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用的止吐治疗方案是

A: 化疗前使用阿瑞吡坦，化疗后需要继续使用止吐药

B: 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药

C: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予阿瑞吡坦和地塞米松

D: 化疗联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予地塞米松或昂丹司琼

**答案：C**

81. 吸烟后使平喘作用减退、维持时间缩短的药物是

A: 西咪替丁

B: 氯丙嗪

C: 胰岛素

D: 呋塞米

**答案：D**

82. 哺乳期妇女使用，易诱发新生儿胆红素脑病的药物是（）

A: 依那普利

B: 胰岛素

C: 复方磺胺甲噁唑

D: 复方炔诺酮

**答案：C**

83. 幽门梗阻（消化性溃疡并发症）

A: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血

B: 突发上腹剧痛，继而至全腹

C: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物

D: 规律性上腹痛

**答案：C**

84. 根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别属于妊娠毒性 A 级的药物是

- A: 沙利度胺
- B: 万古霉素
- C: 葡萄糖
- D: 阿莫西林

**答案：C**

85. 转复并维持窦性心律

- A: 多非利特
- B: 硝苯地平
- C: 华法林
- D: 血凝酶

**答案：A**

86. 腔道疾病时宜选用

- A: 软膏剂
- B: 片剂
- C: 注射剂
- D: 栓剂

**答案：D**

87. 帕金森病患者跌倒的最常见原因为

- A: 不宁腿综合征
- B: 体位性低血压
- C: 姿势反射障碍
- D: 神经精神障碍

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/387020053000010026>