

2023-24 年广西壮族自治区北流市《执业药师之西药学专业二》考试通关秘籍题库附参考答案（实用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于硝基呋喃类的是

- A: 甲硝唑
- B: 磺胺甲
- C: 夫西地酸
- D: 呋喃妥因

答案：D

2. 可引起前庭功能失调（眩晕）的抗菌药物是

- A: 甲硝唑
- B: 哌拉西林
- C: 左氧氟沙星
- D: 米诺环素

答案：D

3. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

- A: 化痰
- B: 扩张支气管
- C: 止咳

D: 抗菌

答案：A

4. 防止耐药现象的发生，持续用药须有 12 小时以上间歇期的药物是()

A: 依那普利

B: 硝酸甘油

C: 氨氯地平

D: 哌唑嗪

答案：B

5. 伴有高钙血症的妊娠期妇女使用，可致新生儿特殊面容，智力低下，该物质是

A: 维生素 C

B: 精氨酸

C: 维生素 B2

D: 维生素 AD

答案：D

6. 作用机制是表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂的是

A: 巯嘌呤

B: 紫杉醇

C: 枸橼酸他莫昔芬

D: 吉非替尼

答案：D

7. 可使维生素 B6 在体内的活性降低的是

A: 雌激素

B: 丙磺舒

C: 糖皮质激素

D: 异烟肼

答案：A

8. 临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌的糖肽类抗菌药物是

A: 克拉霉素

B: 万古霉素

C: 红霉素

D: 罗红霉素

答案：B

9. 糖皮质激素和抗生素合用治疗严重感染的目的是

A: 抗毒素、抗休克、缓解毒血症状

B: 增强机体对疾病的防御能力

C: 增强抗菌药物的抗菌活性

D: 增强机体的应激性

答案：A

10. 呋塞米的适应证不包括

A: 充血性心力衰竭

B: 高钾血症

C: 高血压危象

D: 高钠血症

答案：D

11. 预防脑卒中作用最强的降压药是

A: 缬沙坦

B: 氢氯噻嗪

C: 沙拉新

D: 硝苯地平

答案: D

12. 作用于近曲小管前段的利尿剂是

A: 醛固酮受体阻断剂

B: 碳酸酐酶抑制剂

C: 袢利尿剂

D: 噻嗪类和类噻嗪类利尿剂

答案: B

13. 糖皮质激素的禁忌证不包括()

A: 妊娠初期和产褥期

B: 创伤或手术恢复期

C: 角膜炎、虹膜炎

D: 严重的高血压、糖尿病

答案: C

14. 患者，男，50 岁。旅游登山时突发头晕，症状持续不缓解。查体：

148 / 90mmHg，心率 80 次 / 分，医嘱卡托普利、氢氯噻嗪治疗。

A: 卡托普利可提高氢氯噻嗪的血尿酸水平

B: 卡托普利可减轻氢氯噻嗪的低血糖反应

C: 氢氯噻嗪可拮抗卡托普利的高血钾倾向

D: 氢氯噻嗪可增加卡托普利的肾血流量

答案: C

15. 肥胖型 2 型糖尿病患者首选的降血糖药()

A: 抑制葡萄糖苷酶

B: 胰岛素皮下注射

C: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

D: 可促进周围组织细胞(肌肉等)对葡萄糖的利用和抑制肝糖原异生作用

答案: D

16. 不宜与三环类抗抑郁药合用的是()

A: 赛洛唑啉

B: 酚甘油滴耳液

C: 麻黄碱

D: 羟甲唑啉

答案: C

17. 对急需抗凝处理的患者，以下哪种方案最优()

A: 华法林

B: 华法林+低分子量肝素

C: 低分子量肝素

D: 肝素

答案: B

18. 属于吗啡的前药，过量或长期使用易产生成瘾性的是

A: 右美沙芬

B: 可待因

C: 氨溴索

D: 苯丙哌林

答案: B

19. 大剂量碘剂

- A: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状
- B: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成
- C: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌
- D: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧

答案：D

20. 克罗米通乳膏用于治疗

- A: 疥疮
- B: 寻常痤疮
- C: 蛲虫感染
- D: 体、股癣

答案：A

21. 对非磺酰脲类胰岛素促泌剂的描述正确的是

- A: 此类药物不能单独服用
- B: 格列美脲属于本类药物
- C: 此类药物可降低 2 型糖尿病者的餐前血糖
- D: 此类药物需在餐前即刻服用

答案：D

22. 下列药物中与酚磺乙胺合用可引起中毒的是()

- A: 维生素 C
- B: 氨甲苯酸
- C: 氨基己酸
- D: 维生素 K

答案：C

23. 大剂量静脉给药时，可能出现可逆性黄疸的抗生素是()

- A: 小檗碱
- B: 磷霉素
- C: 夫西地酸
- D: 利奈唑胺

答案：C

24. 连续使用应间隔 4h 以上，这种药物是

- A: 赛洛唑啉滴鼻液
- B: 麻黄碱滴鼻液
- C: 羟甲唑啉滴鼻液
- D: 酚甘油滴耳液

答案：B

25. 高血压合并痛风者不宜使用

- A: 氢氯噻嗪
- B: 阿替洛尔
- C: 硝苯地平
- D: 依那普利

答案：A

26. 阿奇霉素

- A: 肾毒性较大
- B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- C: 用于非典型病原体感染
- D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案：C

27. (2021 年真题) 作用机制为抑制合成嘧啶的二氢乳酸脱氢酶，半衰期较长，建议间隔 24 小时给药一次的慢作用抗风湿药物是 ()

- A: 来氟米特
- B: 柳氮磺吡啶
- C: 甲氨蝶呤
- D: 羟氯喹

答案: A

28. 可降低极低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油，主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是

- A: 瑞舒伐他汀
- B: 利血平
- C: 阿昔莫司
- D: 依折麦布

答案: C

29. 用药期间应注意监测血气和酸碱平衡的是

- A: 赖氨酸
- B: 复方氨基酸注射液(18AA)
- C: 精氨酸
- D: 复方氨基酸注射液(3AA)

答案: C

30. 阿卡波糖是

- A: α -葡萄糖苷酶抑制剂
- B: 磺酰脲类
- C: 长效类胰岛素
- D: 中效类胰岛素

答案：A

31. 可用于防治泌尿系统结石的是

- A: 氯化钠
- B: 氯化钙
- C: 氯化钾
- D: 枸橼酸钾

答案：D

32. 选择性抑制二氢叶酸还原酶，作用于叶酸合成第二步的是

- A: 替硝唑
- B: 莫西沙星
- C: 磺胺甲噁唑（SMZ）
- D: 甲氧苄啶（TMP）

答案：D

33. 由于严重的肾毒性，仅限于局部应用的是（）

- A: 替考拉宁
- B: 杆菌肽
- C: 万古霉素
- D: 去甲万古霉素

答案：B

34. 通过抑制胆碱酯酶活性，提高脑内乙酰胆碱含量的药物是

- A: 多奈哌齐
- B: 阿尼西坦
- C: 舍曲林
- D: 艾地苯醌

答案：A

35. 口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 妥布霉素
- C: 新霉素
- D: 异烟肼

答案：A

36. 患者，男，19岁，既往有癫痫病史2年，长期服用苯妥英钠控制良好。1周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4次/日。

- A: 具有抗雄激素样作用，剂量过大可出现男性乳房女性化、女性泌乳等
- B: 餐前服用比餐后效果佳
- C: 停药后复发率高
- D: 餐后服用比餐前效果佳

答案：B

37. 利奈唑胺最常见的不良反应是

- A: 黄疸
- B: 腹部不适
- C: 血小板减少
- D: 静脉炎

答案：C

38. 作用机制是竞争雌激素受体的是

- A: 枸橼酸他莫昔芬
- B: 紫杉醇
- C: 巯嘌呤
- D: 吉非替尼

答案：A

39. （2018 年真题）属于膨胀性泻药的是（）

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 蓖麻油
- C: 硫酸镁
- D: 乳果糖

答案：A

40. 乳酶生是

- A: 抗酸药
- B: 生乳剂
- C: 干燥活乳酸杆菌制剂
- D: 胃肠解痉药

答案：C

41. 缓解轻、中度急性哮喘症状应首选

- A: 孟鲁司特
- B: 异丙托溴铵
- C: 沙美特罗
- D: 沙丁胺醇

答案：D

42. 留钾利尿药若每日服用 1 次，最宜的服用时间是

- A: 午餐时
- B: 早餐前 1 小时
- C: 午餐前 1 小时
- D: 早餐时

答案：D

43. 对红霉素的描述，下列不正确的是

- A: 属繁殖期杀菌剂
- B: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效
- C: 具有肝脏毒性
- D: 抗菌谱与青霉素相似但略广

答案：A

44. 属于延长动作电位时程类的广谱抗心律失常的药物是

- A: 奎尼丁
- B: 普罗帕酮
- C: 普鲁卡因胺
- D: 胺碘酮

答案：D

45. 头孢唑林

- A: 用于非典型病原体感染
- B: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注
- C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- D: 肾毒性较大

答案：D

46. 女，54 岁，患风湿性二尖瓣闭锁不全多年，用地高辛和氢氯噻嗪维持疗效。但近日呼吸困难加重，夜间频繁发作，心慌，两肺满肺野湿性啰音，经检查左室舒张期充盈压明显升高，诊断为高血压急症。除上述药物外，该加用哪种药物进行治疗

- A: 氨力农
- B: 硝普钠
- C: 多巴胺
- D: 米力农

答案：B

47. 耐青霉素酶青霉素类的是

- A: 哌拉西林
- B: 青霉素 V
- C: 氨苄西林
- D: 苯唑西林

答案：D

48. 用于散瞳的眼用药物是

- A: 溴莫尼定
- B: 噻吗洛尔
- C: 毛果芸香碱
- D: 复方托吡卡胺

答案：D

49. (2017 年真题) 关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的说法，错误的是 ()

- A: 可用于过敏性皮炎的治疗
- B: 为控制的细菌或真菌感染不宜使用

C: 面部、阴部和皱褶部位的湿疹,需长期使用强效制剂

D: 若继发细菌或真菌感染,可与抗菌药或抗真菌药联合使用

答案: C

50. 肝癌晚期患者疼痛剧烈, 可以选用的镇痛药物是

A: 可待因

B: 哌替啶

C: 阿司匹林

D: 布桂嗪

答案: B

51. 男性, 70 岁, 进食后饱胀不适伴反酸 5 年余, 黑便 1 天。胃镜检查提示: 胃多发性溃疡 (A1 期) 伴出血。

A: 硝苯地平缓释片

B: 埃索美拉唑

C: 克拉霉素

D: 胶体果胶铋胶囊

答案: B

52. 影响疟原虫叶酸代谢过程的抗疟药是

A: 青蒿素

B: 乙胺嘧啶

C: 奎宁

D: 伯氨喹

答案: B

53. 静脉滴注给药用于真菌性肺炎的药物是

A: 灰黄霉素

B: 两性霉素 B

C: 酮康唑

D: 特比萘芬

答案：B

54. 天然的雌激素是()

A: 雌二醇

B: 炔雌醚

C: 黄体酮

D: 戊酸雌二醇

答案：A

55. 首次用药可出现"首剂现象"的药物是()

A: 氨氯地平

B: 硝酸甘油

C: 依那普利

D: 哌唑嗪

答案：D

56. 风湿性心脏病重度二尖瓣狭窄宜

A: 不宜使用洋地黄

B: 常规剂量的洋地黄

C: 停用洋地黄

D: 快速洋地黄化

答案：A

57. 与第二代溶栓酶相比，瑞替普酶的作用优势不包括()

A: 全身纤溶活性大于链激酶、阿替普酶

- B: 血浆半衰期长，栓塞开通率高，给药方便
- C: 给药较方便，可以为抢救患者赢得时间
- D: 具有较强的、特异的纤维蛋白选择性

答案：A

58. 金刚烷胺与阿托品合用

- A: 增加锥体外系不良反应的风险
- B: 增加肾毒性
- C: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)
- D: 可增加抗胆碱不良反应的危险

答案：D

59. 血钾升高至

- A: 大于 $172 \mu\text{mol/L}$
- B: 大于 $265 \mu\text{mol/L}$
- C: 大于 6mmol/L
- D: 大于 $7 \mu\text{mol/L}$

答案：C

60. 下列属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断药的是()

- A: 双嘧达莫
- B: 阿司匹林
- C: 阿替普酶
- D: 氯吡格雷

答案：D

61. 常用抗真菌药中，()抑制真菌细胞壁主要成分葡聚糖的合成

- A: 唑类抗真菌药

- B: 丙烯胺类抗真菌药
- C: 棘白菌素类抗真菌药
- D: 多烯类抗真菌药

答案：C

62. 不属于抗乙型肝炎病毒的药品

- A: 拉米夫定
- B: 恩替卡韦
- C: 泛昔洛韦
- D: 干扰素

答案：C

63. 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

- A: 双嘧达莫
- B: 替格瑞洛
- C: 利伐沙班
- D: 氯吡格雷

答案：C

64. 已发生超敏反应，用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁加以预防的抗肿瘤药是

- A: 注射用柔红霉素
- B: 紫杉醇注射液
- C: 注射用盐酸博来霉素
- D: 注射用硫酸长春新碱

答案：B

65. 下述关于抗眼部细菌感染药物的描述中不正确的是()

- A: 全身给予抗菌药物是眼科细菌感染疾病的首选方法
- B: 对于衣原体感染的治疗主要是抗菌药物治疗
- C: 细菌性眼内炎可采用玻璃体腔内注射方式给予抗菌药物
- D: 对淋球菌性结膜炎可采用全身及眼局部抗菌药物治疗

答案：A

66. 透到异常细胞的药量比正常细胞多的药物

- A: 壬二酸
- B: 阿达帕林
- C: 维 A 酸
- D: 异维 A 酸

答案：A

67. 老年人对苯二氮（𠂇卓）类药较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟缓等症状，在临床上称为

- A: 震颤麻痹综合征
- B: “宿醉”现象
- C: 老年期痴呆
- D: 戒断综合征

答案：B

68. 作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

- A: 氨基南
- B: 阿莫西林
- C: 亚胺培南

D: 克拉维酸

答案：A

69. 中毒后可用维生素 B6 来对抗的抗结核药是

A: 异烟肼

B: 对氨基水杨酸

C: 乙胺丁醇

D: 利福平

答案：A

70. 神经垂体功能不足引起的中枢性尿崩症具有良好抑制作用的药物是

A: 促性腺激素

B: 催乳素

C: 促肾上腺皮质激素

D: 醋酸去氨加压素

答案：D

71. 使用环磷酰胺化疗，以下检查结果可能升高的是

A: 血红蛋白

B: 血尿酸

C: 白细胞计数

D: 血小板计数

答案：B

72. 因为能增强 β -肾上腺素受体阻断药对心脏的抑制作用，所以禁止与普萘洛尔合用的药物是

A: 尼麦角林

B: 丁苯酞

C: 倍他司汀

D: 二甲双胍

答案: A

73. 中和胃酸的药物是()

A: 奥美拉唑

B: 雷尼替丁

C: 哌仑西平

D: 氢氧化铝

答案: D

74. 应用高剂量的 β_2 受体激动剂可导致的严重典型不良反应是

A: 低钾血症

B: 低镁血症

C: 高钙血症

D: 低钙血症

答案: A

75. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的是

A: 卡托普利

B: 硝苯地平

C: 氯沙坦

D: 普萘洛尔

答案: C

76. 阻断 H_2 受体的药物是

A: 氢氧化铝

B: 哌仑西平

C: 雷尼替丁

D: 奥美拉唑

答案: C

77. 治疗醛固酮升高引起的顽固性水肿的药物是

A: 氨苯蝶啶

B: 甘露醇

C: 阿米洛利

D: 螺内酯

答案: D

78. 多柔比星

A: 干扰核酸生物合成

B: 干扰 RNA 转录

C: 直接破坏 DNA 结构和功能

D: 影响蛋白质合成和功能

答案: B

79. 胰岛素和磺酰脲类药物最常见的共同不良反应是

A: 胃肠道反应

B: 过敏反应

C: 低血糖反应

D: 肝功能损伤

答案: C

80. 甲氧沙林属于

A: 肾上腺皮质激素类

B: 其他光敏剂

C: 补骨脂素及其衍生物

D: 重金属元素及其化合物

答案：C

81. 紧急降低眼压首选的药物是()

A: 碳酸酐酶抑制剂

B: β 受体阻滞药

C: 拟 M 胆碱药

D: 20%甘露醇

答案：D

82. (2018 年真题) 用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病时能出现寒战、咽痛、心率加快等症状,其原因可能是大量病原体被杀灭后出现的全身性反应,这种反应称为 ()

A: 瑞夷综合征

B: 赫氏反应

C: 青霉素脑病

D: 金鸡纳反应

答案：B

83. 作用机制是表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂的是

A: 吉非替尼

B: 紫杉醇

C: 巯嘌呤

D: 枸橼酸他莫昔芬

答案：A

84. 可以与青霉素 G 混合的是

- A: 维生素 C
- B: 生理盐水
- C: 维生素 B 族
- D: 葡萄糖注射液

答案：B

85. 下列药物能抑制尿酸生成的是

- A: 呋塞米
- B: 秋水仙碱
- C: 非布司他
- D: 丙磺舒

答案：C

86. 干扰核酸生物合成的药物是()

- A: 多柔比星
- B: 氟尿嘧啶
- C: 顺铂
- D: 高三尖杉酯碱

答案：B

87. 军团菌和支原体混合感染宜首选的抗菌药物是()。

- A: 罗红霉素
- B: 头孢他啶
- C: 利奈唑胺
- D: 头孢曲松

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

88. 在骨组织中分布浓度高，可用于骨和关节感染的药物是()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/387066141056010024>