

第一章测试

【单选题】 分
胸壁软化是由于（）。



肋骨骨折伴胸骨骨折



单根肋骨骨折



肺挫伤



多根多处肋骨骨折



张力性气胸

参考答案

D

【单选题】 分
下列哪项不是急诊剖胸探查手术指征（）。



严重肺裂伤或气管，支气管损伤



胸膜腔内进行性出血



膈肌损伤



心肌挫伤



食管破裂

参考答案

D

【单选题】 分
连枷胸是指（）。



单根肋骨骨折伴胸骨骨折



多处肋骨骨折



双侧胸部多根肋骨骨折



多根肋骨骨折



多根多处肋骨骨折

参考答案

E

【单选题】 分
哪些肋骨最易发生骨折（）。



11-12肋



8-9 肋



10 肋



1-3 肋



4-7 肋

参考答案

E

【单选题】 分

以下哪项不是肋骨骨折治疗原则（）。



早期活动



肺部物理治疗



呼吸管理



胸腔闭式引流



有效控制疼痛

参考答案

D

【单选题】 分

少量气胸是指肺被压缩小于（）。



10%



60%



5%



20%



30%

参考答案

E

【单选题】 分

纵隔扑动发生于（）。



张力性气胸



单纯肋骨骨折



胸骨骨折



开放性气胸



闭合性气胸

参考答案

D

【单选题】 分

下列哪项是大量血胸（）。



1100ml



500ml



800ml



900ml



300ml

参考答案

A

【单选题】 分

进行性血胸的判定标准（）。



>100ml，连续 2 小时



>150ml，连续 3 小时



>50ml，连续 3 小时



>200ml, 连续 2 小时



>200ml, 连续 3 小时

参考答案

E

【判断题】 分

气胸时胸腔闭式引流管应选择锁骨中线第 2 肋间 ()。



错



对

参考答案

B

第二章测试

【单选题】 分

关于胸壁结核病因、病理描述，以下哪项不正确 ()。



胸壁结核可向多个方向延伸形成窦道或瘘管



胸壁结核多发原发感染



胸壁结核性脓肿常因重力作用流注于其他部位



胸壁结核常在肋骨内外形成“哑铃状”的脓腔



胸壁结核多为继发性感染

参考答案

B

【单选题】 分

无痛性、有波动感且无发热的胸壁肿块，诊断性穿刺部位（）。



上方皮下潜行后刺入



最低部位刺入



右侧刺入



左侧刺入



正中锤子刺入

参考答案

A

【单选题】 分

近年来脓胸最常见的致病菌是（）。



真菌



肺炎链球菌



结核菌



溶血性链球菌



金黄色葡萄球菌

参考答案

E

【单选题】 分

关于急性脓胸的病因及发病机制的是（ ）。



膈下脓肿可引起脓胸



急性脓胸是继发的



肝脓疡的破溃可形成脓胸



可发生于闭式引流后



致病菌侵入胸膜腔一定发生脓胸

参考答案

E

【单选题】 分

急性脓胸的病程是在（）。



周内



个月内



个月内



周内



个月内

参考答案

A

【单选题】 分

对急性脓胸诊断最具临床诊断意义的方法是（）。



胸腔穿刺抽得脓液



开胸探查



胸部B超



胸部X线检查



根据临床表现

参考答案

A

【单选题】 分

慢性脓胸最重要的病理特征是（）。



肋间隙变窄



杵壮指(趾)



胸膜纤维性增厚



胸膜积脓



胸腔积液

参考答案

C

【单选题】 分

漏斗胸常合并什么疾病（）。



头颅畸形



上肢畸形



先天性心脏病



下肢畸形



智力障碍

参考答案

C

【判断题】 分

慢性脓胸纵隔常常偏向患侧。



对



错

参考答案

A

【判断题】 分

Tietze 综合征是指非特异性肋软骨炎。



错



对

参考答案

B

【单选题】 分

中央型肺癌是指（）。



发生于 50 岁以上的男性肺癌



已有纵隔淋巴结转移的肺癌



起源于支气管的肺癌



起源于肺段支气管以上的肺癌



肺腺癌

参考答案

D

【单选题】 分

关于肺鳞癌，下列哪项不正确（）。



肺癌中最常见



常为中心型



血行转移发生晚



生长迅速，病程短



对放疗、化疗较敏感

参考答案

D

【单选题】 分

患者右肺下叶癌侵及胸壁，胸部 CT 提示肺门纵隔未见肿大淋巴结，未发现远端转移，该患者 TNM 分期属于（）。



IIIa 期



IIIb 期



Ib 期



IIa 期



IIb 期

参考答案

E

【单选题】 分

上腔静脉综合征最常见（）。



胸廓入口肺癌



慢性缩窄性心包炎



肺尖部结核



纵隔肿瘤



胸骨后甲状腺肿

参考答案

A

【单选题】 分

Pancoast 瘤最常见症状是（）。



疼痛



无症状



痰中带血



咳嗽



Horner 综合征

参考答案

A

【单选题】 分

下列哪项不是肺癌常见的血行转移部位（）。



骨骼



心

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/388016034054006033>