2024年河南省扶沟县《执业药师之西药学专业二》考试题库【培优B卷】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.（2015年真题）对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用镇咳药的同时，应及时联合应用的药品是（）。

A：多索茶碱

B：羧甲司坦

C：左氧氟沙星

D：泼尼松龙

答案：B

2.属于芳香酶抑制剂的抗肿瘤药是

A：他莫昔芬

B：阿那曲唑

C：炔雌醇

D：氟他胺

答案：B

3.抗肿瘤抗生素

A：顺铂

B：喜树碱类

C：环磷酰胺

D：丝裂霉素

答案：D

4.维生素 B12 主要用于治疗的疾病是

A: 再生障碍性贫血

B: 巨幼细胞性贫血

C: 缺铁性贫血

D: 慢性失血性贫血

答案：B

5.可致色觉异常的药物是

A: 卡托普利

B: 地高辛

C: 氨氯地平

D: 硝酸甘油

答案：B

6.下列药物使用期间需要缓慢停药的是

A: 比索洛尔

B: 地尔硫?

C: 氨氯地平

D: 依那普利

答案：A

7.属于白三烯受体阻断剂的平喘药是

A: 布地奈德

B: 沙美特罗

C: 孟鲁司特

D: 多索茶碱

答案：C

8.对红霉素的描述，下列不正确的是()

A: 具有肝脏毒性

B: 属繁殖期杀菌剂

C: 抗菌谱与青霉素相似但略广

D: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效

答案：B

9.氯霉素的抗菌作用机制是

A: 改变细菌胞浆膜通透性，使重要的营养物质外漏

B: 阻止氨基酰-tRNA与细菌核糖体30S亚基结合，影响蛋白质的合成

C: 与细菌核糖体50S亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性，从而阻止肽链延伸，使蛋白质合成受阻

D: 抑制二氢叶酸合成酶，影响叶酸的合成

答案：C

10.对于急性白血病在一线耐药时使用，但作为二线用药的药物是

A: 表柔比星

B: 吡柔比星

C: 多柔比星

D: 柔红霉素

答案：C

11.可致维生素B12缺乏的药物是

A: 雷尼替丁

B: 碳酸氢钠

C: 乳酸菌素

D: 铝碳酸镁

答案：A

12.影响微管的装配，阻碍纺锤体的形成

A: 紫杉醇

B: 长春碱

C: 羟喜树碱

D: 他莫昔芬

答案：B

13.（2015 年真题）治疗青光眼宜选用（）。

A: 碘苷滴眼液

B: 复方托吡卡胺滴眼液

C: 左氧氟沙星滴眼液

D: 毛果芸香碱滴眼液

答案：D

14.有抗胆碱作用和阻断 α 受体的抗心律失常药是

A: 普萘洛尔

B: 利多卡因

C: 奎尼丁

D: 维拉帕米

答案：C

15.合成五味子丙素时的中间体，降低血清谷丙转氨酶效果好的是

A: 多烯磷脂酰胆碱

B: 还原型谷胱甘肽

C: 双环醇

D: 异甘草酸镁

答案：C

16.（2018年真题）仅用于绝经后妇女,不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是（）

A: 阿法骨化醇

B: 骨化三醇

C: 阿仑膦酸钠

D: 雷洛昔芬

答案：D

17.可与克拉霉素、兰索拉唑联合抗幽门螺杆菌治疗的药物是

A: 苄星青霉素

B: 青霉素

C: 头孢唑林

D: 阿莫西林

答案：D

18.氯霉素最严重的不良反应是

A: 肝脏损害

B: 抑制骨髓造血功能

C: 二重感染

D: 胃肠道反应

答案：B

19.胰岛素的不良反应有

A: 高血糖高渗性昏迷

B: 酮症酸中毒

C: 骨髓抑制

D: 低血糖昏迷

答案：D

20.通过激动胰高血糖素样肽-1受体降低血糖的药物

A: 胰岛素皮下注射

B: 艾塞那肽

C: 二甲双胍

D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：B

21.糖尿病合并酮症酸中毒的患者()

A: 胰岛素皮下注射

B: 可促进周围组织细胞(肌肉等)对葡萄糖的利用和抑制肝糖原异生作用

C: 抑制葡萄糖苷酶

D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：A

22.大剂量应用下列哪种维生素时，可使尿胆原呈假阳性

A: 维生素C

B: 维生素B1

C: 维生素E

D: 维生素B2

答案：B

23.可用于治疗非霍奇金淋巴瘤的单克隆抗体是

A: 西妥昔单抗

B: 英夫利昔单抗

C: 利妥昔单抗

D: 贝伐单抗

答案：C

24.烷化剂中易诱发出血膀胱炎的药物是

A: 塞替派

B: 环磷酰胺

C: 氮芥

D: 卡莫司汀

答案：B

25.（2016 年真题）属于多巴胺受体阻断剂的止吐药是

A: 甲氧氯普胺

B: 维生素 B6

C: 托烷司琼

D: 阿瑞吡坦

答案：A

26.（2020 年真题）服药期间须大量饮水，防止发生结晶尿的药物是

A: 克林霉素

B: 头孢呋辛

C: 磺胺甲噁唑

D: 左氧氟沙星

答案：C

27.已用指南推荐剂量或达到 ACEI／ARB 最大耐受剂量后，收缩压>95mmHg，NYHA 心功能Ⅱ～Ⅲ级、仍有症状的 HFrEF 患者，可用

A: 卡托普利

B: 伊伐布雷定

C：沙库巴曲缬沙坦

D：美托洛尔

答案：C

28.青霉素常见的不良反应

A：细胞缺氧、酸中毒、休克

B：恶心、腹痛、腹泻、食欲减退

C：过敏反应

D：锥体外系反应

答案：C

29.可作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

A：氨曲南

B：克拉维酸

C：阿莫西林

D：亚胺培南

答案：A

30.与唑来膦酸合用可使颌骨坏死的发生率升高的药物是

A：沙利度胺

B：萘普生

C：高钙食品

D：抗血管生成药

答案：D

31.（2018年真题）不属于减鼻充血药的是（）

A：羟甲唑啉

B：麻黄碱

C：伪麻黄碱

D：色甘酸钠

答案：D

32.（2017年真题）服用后可能导致口中有氨味、舌苔、大便呈灰黑色的药物是（）

A：西咪替丁

B：奥美拉唑

C：枸橼酸铋钾

D：硫糖铝

答案：C

33.下列哪种药物可使关闭的房角重新开放，从而降低眼内压

A：噻吗洛尔

B：毛果芸香碱

C：地匹福林

D：拉坦前列素

答案：B

34.6～12个月婴儿甲状腺功能减退症，左甲状腺素每日完全替代剂量为

A：25μg

B：5μg/kg

C：4μg/kg

D：6μg/kg

答案：D

35.平喘作用维持4～6小时，是缓解轻、中度急性哮喘症状的首选药是

A：福莫特罗

B：丙卡特罗

C：沙美特罗

D：沙丁胺醇

答案：D

36.属于孕激素类的是()

A：己烯雌酚

B：睾酮

C：甲地孕酮

D：他莫昔芬

答案：C

37.对于高胆固醇血症造成高危心肌梗死的患者，作为一线治疗药物应选择()

A：洛伐他汀

B：非诺贝特

C：阿昔莫司

D：烟酸

答案：A

38.属于促凝血因子活性药的是

A：卡巴克洛

B：氨苯甲酸

C：酚磺乙胺

D：凝血酶

答案：C

39.弱效（使LDL-ch水平降低＜30%）的他汀类调血脂药

A：依折麦布

B：大剂量阿托伐他汀

C：小剂量氟伐他汀

D：小剂量阿托伐他汀

答案：C

40.维生素K参与下列哪些凝血因子活化()

A：Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ因子

B：Ⅶ、Ⅺ、Ⅶ、Ⅸ因子

C：Ⅱ、Ⅶ因子

D：Ⅱ、Ⅷ、Ⅺ、Ⅳ因子

答案：A

41.骨化三醇可引起高钙血症，在服药后应监测血钙和血肌酐浓度，首次监测的时间建议是

A：服药后第6个月

B：服药后第4周

C：服药后第2周

D：服药后第3个月

答案：B

42.通过抑制碳酸酐酶发挥利尿作用的药物是

A：吲达帕胺

B：氢氯噻嗪

C：托拉塞米

D: 乙酰唑胺

答案：D

43.长期大量服用维生素D会出现

A: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

B: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

C: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

D: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

答案：B

44.为快速杀菌药的抗菌药是()

A: 万古霉素和氯霉素

B: 氯霉素和替考拉宁

C: 万古霉素和替考拉宁

D: 万古霉素和林可霉素

答案：C

45.原发性失眠首选的镇静催眠药种类为

A: 地西泮

B: 苯二氮?类药物

C: 氟西泮

D: 非苯二氮?类药物

答案：D

46.可沉积在牙齿和骨的钙质区内，引起胎儿牙齿变色的药物是()

A: 氯霉素

B: 青霉素

C: 多西环素

D: 四环素

答案：D

47.下述药物中用于拮抗肝素过量的是

A: 氨甲苯酸

B: 维生素

C: 维生素 K1

D: 鱼精蛋白

答案：D

48.其缓释片剂应与食物同服的是

A: 克拉霉素

B: 氨曲南

C: 阿奇霉素

D: 红霉素

答案：A

49.四环素的抗菌作用机制()

A: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性

B: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成

C: 作用于细菌 70S 核糖体的 50S 亚基，抑制转肽酶

D: 影响胞浆膜通透性

答案：B

50.可能导致跟腱断裂和血糖异常的抗菌药物是

A: 加替沙星

B: 甲砜霉素

C：多西环素

D：庆大霉素

答案：A

51.不易透过血一脑屏障，药理作用单一，主要用于治疗膀胱过度活动症的非选择性M受体阻断药是

A：托特罗定

B：黄酮哌酯

C：奥昔布宁

D：索利那新

答案：A

52.（2017年真题）关于镇咳药作用强度的比较,正确的是（）

A：苯丙哌林＞喷托维林＞可待因

B：苯丙哌林＞可待因＞喷托维林

C：喷托维林＞苯丙哌林＞可待因

D：可待因＞苯丙哌林＞喷托维林

答案：B

53.不宜与三环类抗抑郁药合用

A：赛洛唑啉

B：酚甘油滴耳液

C：羟甲唑啉

D：麻黄碱

答案：D

54.（2019年真题）起效缓慢，可增加心力衰竭和女性骨折风险的口服抗糖尿病药物是（）

A：西格列汀
B：罗格列酮
C：艾塞那肽
D：利拉鲁肽
答案：B

55.颅内压增高和颅脑损伤、支气管哮喘、肺源性心脏病代偿失调患者禁用()。
A：哌替啶
B：芬太尼
C：吗啡
D：曲马多
答案：C

56.可抑制蛋白质合成全过程，具繁殖期和静止期杀菌作用的药物是
A：多黏菌素
B：环丙沙星
C：庆大霉素
D：替加环素
答案：C

57.可产生严重的低血压、皮疹、高钾血症的肾素抑制剂是()
A：利血平
B：哌唑嗪
C：阿利克仑
D：甲基多巴
答案：C

58.（2018年真题）肾病综合征患者长期使用泼尼松时，用法为隔日清晨给药一次，这种给药方法的原理是（）

A: 利用外源性糖皮质激素的生物等效原理

B: 利用人体糖皮质激素分泌的昼夜节律性原理

C: 利用糖皮质激素的脉冲式分泌原理

D: 利用糖皮质激素与盐皮质激素互为补充的原理

答案：B

59.对胰岛素产生耐受者选用

A: 格列本脲

B: 胰岛素

C: 丙硫氧嘧啶

D: 二甲双胍

答案：A

60.特比萘芬属于()

A: 多烯类抗真菌药

B: 唑类抗真菌药

C: 棘白菌素类抗真菌药

D: 丙烯胺类抗真菌药

答案：D

61.糖皮质激素禁用于胃溃疡患者是因为

A: 促进胃酸分泌及胃蛋白酶分解

B: 抑制免疫功能，只抗炎不抗菌

C: 水钠潴留

D: 抑制蛋白质合成

答案：A

62.多库酯钠作为泻药的作用机制是

A：一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便

B：在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用

C：通过激活 CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内 cGMP 可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快

D：选择性、高亲和力的 5-HT4 受体激动剂，可通过 5-HT4 受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性

答案：A

63.（2019 年真题）以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者，宜使用的药物是（）

A：还原型谷胱甘肽

B：多烯磷脂酸胆碱

C：葡醛内酯

D：甘草酸二铵

答案：B

64.毛果芸香碱的作用特点不包括

A：术后以抵消睫状肌麻痹剂或散瞳药的作用

B：用于白内障人工晶状体植人手术中缩瞳

C：收防止激光手术后的反应性眼压升高

D：减少房水生成

答案：D

65.能升高血糖，对抗胰岛素的降血糖作用的是

A: 普萘洛尔

B: 格列喹酮

C: 磺胺甲唑

D: 甲状腺素

答案：D

66.患者，女，42 岁。双掌指关节、腕关节肿痛伴晨僵 1 月，诊断为类风湿关节炎，给予抗风湿药治疗，下列不属于该类药物的是

A: 萘普生

B: 依那西普

C: 糖皮质激素

D: 司来吉兰

答案：D

67.利尿作用极弱，具有降低眼压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

A: 乙酰唑胺

B: 呋塞米

C: 氢氯噻嗪

D: 螺内酯

答案：A

68.维生素 A 缺乏时可引起

A: 角膜软化

B: 脚气病

C: 成人佝偻病

D: 坏血病

答案：A

69.治疗子宫内膜异位症的药物是

A：左炔诺孕酮

B：他达拉非

C：达那唑

D：氯地孕酮

答案：C

70.抗胆碱M受体药的药理作用不包括

A：收缩胃肠平滑肌

B：解除毛细血管痉挛

C：扩张支气管

D：抑制腺体分泌

答案：A

71.适用于轻、中度心力衰竭及左、右心室充盈量高的患者的是

A：卡维地洛

B：氯沙坦

C：氢氯噻嗪

D：米力农

答案：C

72.为光学异构体的氟喹诺酮类药物是()

A：呋喃妥因

B：氯霉素

C：磺胺嘧啶

D：左氧氟沙星

答案：D

73.半合成青霉素类中，属于耐青霉素酶青霉素类的是()

A: 氨苄西林

B: 羧苄西林

C: 替莫西林

D: 甲氧西林

答案：D

74.不属于糖皮质激素对代谢的影响的是

A: 升高血糖

B: 增强钙离子的吸收

C: 增高肝糖原

D: 提高蛋白质的分解代谢

答案：B

75.患者，男，35岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

A: 叶酸

B: 硫酸亚铁

C: 蔗糖铁

D: 琥珀酸亚铁

答案：C

76.可诱发或加重支气管哮喘急性发作的药物是()

A: 苯妥英钠

B: 普萘洛尔

C: 利多卡因

D: 奎尼丁

答案：B

77.属于雌激素类的是()

A: 他莫昔芬

B: 睾酮

C: 己烯雌酚

D: 甲地孕酮

答案：C

78.可引起复视或视觉蓝绿模糊的是()

A: 西地那非

B: 他达拉非

C: 度他雄胺

D: 坦洛新

答案：A

79.主要用于青光眼急性发作短期控制的药物是()

A: 乙酰唑胺

B: 依托塞米

C: 依他尼酸

D: 布美他尼

答案：A

80.与第二代溶栓酶相比，瑞替普酶的作用优势不包括()

A: 全身纤溶活性大于链激酶、阿替普酶

B: 给药较方便，可以为抢救患者赢得时间

C: 血浆半衰期长，栓塞开通率高，给药方便

D: 具有较强的、特异的纤维蛋白选择性

答案：A

81.患者，男，57 岁，身高 175cm，体重 87kg，诊断为 2 型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服，500mg，bid。

A: 餐后 1 小时

B: 餐后半小时

C: 餐前半小时

D: 餐前即刻或餐时

答案：D

82.大剂量雌激素用于()

A: 痛经

B: 绝经期综合征

C: 再生障碍性贫血

D: 回奶

答案：D

83.（2016 年真题）痛风缓解期（关节炎症控制后 1～2 周），为控制血尿酸水平，应选用的药品是

A: 布洛芬

B: 泼尼松龙

C: 别嘌醇

D: 秋水仙碱

答案：C

84.用药期间可引起眼泪、尿、粪、痰等呈橘红色的药物是

A: 利福平

B: 异烟肼

C: 乙胺丁醇

D: 链霉素

答案：A

85.功能性子宫出血可选用的药物是()

A: 司坦唑醇

B: 米非司酮

C: 他莫昔芬

D: 雌二醇

答案：D

86.伴随剂量增大，阿托品出现的症状以下排序正确的是

A: 心率减慢、心率加快、显著口干、肠蠕动减少

B: 瞳孔扩大、心率加快、胃液分泌抑制、胃肠道平滑肌兴奋性降低

C: 显著口干、心率减慢、心率加快、肠蠕动减少

D: 心率加快、心率减慢、显著口干、肠蠕动减少

答案：A

87.属于第一代抗精神病药物的是

A: 氯氮平

B: 奥氮平

C: 利培酮

D: 氯丙嗪

答案：D

88.()用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

A: 克拉霉素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/388042017044007022