

2024 安徽省涡阳县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试通关秘籍题库附答案（基础题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于 C 级高危药品的是

- A: 全胃肠外营养液
- B: 5%葡萄糖注射液
- C: 50%葡萄糖注射液
- D: 血液透析液

答案：D

2. 患者，男，56 岁，体检发现血尿酸 $530 \mu\text{mol/L}$ （参考值 $<420 \mu\text{mol/L}$ ），患者向药师咨询维生素使用问题，药师应告知患者可引起尿酸升高的维生素是（）

- A: 维生素
- B: 维生素 B2
- C: 维生素 B12
- D: 维生素 B6

答案：A

3. 从饮食、运动上严格管理，最适合于

- A: 高血压
- B: 焦虑障碍
- C: 骨质疏松
- D: 糖尿病

答案：D

4. 对肾功能不全患者的给药方案调整，说法正确的是

- A: 必须使用具有明显肾毒性药物时，宜进行血药浓度监测，实行个体化给药
- B: 可采用延长给药间隔法，即每次给药剂量不变而用药间隔延长，但该法很难达到有效血药浓度
- C: 尽可能选用经肝消除的药物，肝毒性大的药物不必减量
- D: 可采用减量法给药，即每次剂量减少而用药间隔不变，但该法的血药浓度波动幅度较大

答案：A

5. 治疗幽门螺杆菌感染的一线方案，其典型组方中不包括的药物是

- A: 西咪替丁
- B: 甲硝唑
- C: 克拉霉素
- D: 胶体果胶铋

答案：A

6. 第二类精神药品每张处方不超过几日常用量

- A: 4 日
- B: 7 日
- C: 5 日
- D: 3 日

答案：B

7. 开具新药或增加药物前需考虑患者的总体情况和药物相互作用，是倡导开处方环节的

- A: 医嘱清楚准确
- B: 医嘱完整不漏项
- C: 实现个体化治疗
- D: 修订医嘱及时沟通

答案：C

8. 妊娠期尿路感染

- A: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再出现菌尿，菌种与上次相同
- B: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次，尿细菌数 $>10^5\text{cfu/ml}$
- C: 宜选用毒性小的抗菌药物
- D: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同

答案：C

9. (2017 年真题) 高血压伴低钾血症患者慎用的药物是 ()

- A: 依那普利
- B: 氢氯噻嗪
- C: 美托洛尔
- D: 氨氯地平

答案：B

10. 抗感冒药中具有“使鼻黏膜血管收缩、解除鼻塞症状”作用的成分 是

- A: 双氯芬酸
- B: 伪麻黄碱
- C: 金刚烷胺

D: 天麻素

答案: B

11. (2018 年真题) 某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A: 在取出最后一个周期包中的透皮贴剂的当天开始服用本品

B: 在服用前一种复方激素避孕药最后一片的当天开始服用本品

C: 在取出最后一个阴道环的当天开始服用本品

D: 在服用以前所用的另种复方激素避孕药的停药期末开始服用本品

答案: B

12. 常见老年人 ADR 的药物类别,阿托品、苯海索等致尿潴留

A: β 受体阻断剂

B: 抗胆碱药

C: 抗生素

D: 钙通道阻滞剂

答案: B

13. 粪外观所对应的疾病,阻塞性黄疸

A: 白陶土便

B: 暗红果酱色

C: 米泔水样

D: 柏油便, 黑色有光泽

答案: A

14. 处方中“合剂”的规范书写是

A: Dil

B: Mist

C: Dos

D: Liq

答案：B

15. 痛风急性发作期为抑制粒细胞浸润可选用

A: 泼尼松龙

B: 秋水仙碱

C: 苯溴马隆

D: 别嘌醇

答案：B

16. 导致 13 万多例横纹肌溶解症患者的是

A: 己烯雌酚

B: 阿托伐他汀

C: 加替沙星

D: 罗非昔布

答案：B

17. 以下所列药物中，推荐用于治疗三叉神经痛的首选处方药是

A: 舒马曲坦

B: 卡马西平

C: 地西泮

D: 苯噻啶

答案：B

18. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，既往有高血压、高脂血症病史，长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周，伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛，服用布洛芬，疼痛未缓解，自行加用萘普生。胃镜检查显示：胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡，幽门螺杆菌 (Hp) 阳性。肾功能未见异常。

- A: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 枸橼酸铋钾 + 克拉霉素 + 左氧氟沙星
- B: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 枸橼酸铋钾 + 阿莫西林 + 甲硝唑
- C: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 枸橼酸铋钾 + 阿莫西林 + 克拉霉素
- D: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 阿莫西林 + 克拉霉素

答案：B

19. 用于有机磷中毒早期解除胆碱酯酶与有机磷结合的药物是

- A: 亚甲蓝
- B: 碘解磷定
- C: 阿托品
- D: 毛果芸香碱

答案：B

20. 药师在调剂工作中，首先要审核处方的

- A: 规范性
- B: 合法性
- C: 用药适宜性
- D: 完整性

答案：B

21. 不宜与中成药虎骨酒、人参酒、舒筋活络酒同服的药品是

- A: 氯苯那敏
- B: 地高辛

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 氨茶碱

D: 可待因

答案: A

22. (2015 年真题) 用药期间尿液可呈橘红色的抗结核药是 ()。

- A: 利福平
- B: 吡嗪酰胺
- C: 链霉素
- D: 乙胺丁醇

答案: A

23. 运动员长期使用可促进肌肉发达，但易导致不孕和心脑血管疾病的兴奋剂是

- A: 苯丙酸诺龙
- B: 人促红细胞生成素
- C: 可待因
- D: 氢氯噻嗪

答案: A

24. 可提示完全梗阻性黄疸的是

- A: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- B: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- C: $>342 \mu\text{mol/L}$
- D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

答案: C

25. 患者,男,36 岁,因发热、咳嗽就诊,查血常规:白细胞计数

$6.28 \times 10^9/\text{L}$,中性粒细胞百分比 65.7%,淋巴细胞百分比 15.1%。诊断为感冒。医生处方:阿奇霉素片 0.5gqdp。该处方属于()

- A: 有禁忌证用药
- B: 用法、用量不适宜

C: 无适应证用药

D: 有配伍禁忌

答案: C

26. 患者，女，55 岁，因家庭变故，情绪低落，晨起后较严重，近三个月有自杀倾向就诊，诊断为抑郁症，患者既往有高血压、冠心病史 5 年，目前服用卡托普利片、硝酸异山梨酯、阿托伐他汀钙片。本次就诊，医师处方文拉法辛缓释片 150mgqdpo，谷维素片 10mg tidpo 治疗，患者用药后出现血压升高，可能导致该患者血压升高的药物是

A: 硝酸异山梨酯

B: 谷维素片

C: 卡托普利片

D: 文拉法辛缓释片

答案: D

27. 联合用药可使异烟肼失去抗菌作用的中成药

A: 丹参片（丹参酮）

B: 蛇胆川贝液（苦杏仁苷）

C: 香连片（黄连）

D: 昆布片（碘）

答案: D

28. 以下药品中，归属妊娠毒性药物 X 级的是

A: 链霉素

B: 甲巯咪唑

C: 他汀类降脂药

D: 更昔洛韦

答案: C

29. 服用后可引起多尿驾驶员应慎用的药物是()

- A: 胰酶
- B: 吲达帕胺
- C: 阿司匹林
- D: 氯苯那敏

答案: B

30. 适用于各种类型的心绞痛

- A: 普萘洛尔
- B: 利多卡因
- C: 地高辛
- D: 硝酸酯类

答案: D

31. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

- A: 青霉胺
- B: 二巯丙醇
- C: 二巯丁二钠
- D: 依地酸钙钠

答案: B

32. 滥用抗菌药物、糖皮质激素、人血白蛋白、二磷酸果糖及肿瘤辅助治疗药物

- A: 有禁忌证用药
- B: 过度治疗用药
- C: 超适应证用药

D: 无适应证用药

答案: B

33. 右心衰竭最常见的症状是

A: 端坐呼吸

B: 夜间阵发性呼吸困难

C: 劳力性呼吸困难

D: 腹胀、食欲不振、恶心、呕吐

答案: D

34. 患者，男，23岁，近日出现大便有鲜血、便后出血自行停止、肛门有坠胀感，无感染症状，诊断为痔疮。可用于患者的治疗药物是

A: 复方片仔癀软膏

B: 复方甲硝唑栓

C: 10%樟脑软膏

D: 地塞米松软膏

答案: A

35. 饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物药动学的机制是

A: 抑制 CYP3A4

B: 抑制 CYP1A2

C: 诱导 CYP3A4

D: 抑制 CYP2C9

答案: A

36. 氟马西尼用于解救

A: 三唑仑中毒

B: 汞中毒

C: 有机磷中毒

D: 氰化物中毒

答案: A

37. (2016 年真题) 在指导合理用药时，应交代宜在睡前服用的药物是 ()。

A: 硫酸亚铁

B: 苯妥英钠

C: 辛伐他汀

D: 双磷酸盐

答案: C

38. 1 类手术切口应用第三代头孢菌素，应评判为

A: 联合用药不适宜

B: 有禁忌证用药

C: 过度治疗用药

D: 无适应证用药

答案: D

39. 患者男 78 岁，因心房颤动服用华法林治疗 2 年余。后因真菌感染使用氟康唑，用药后 INR 升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是 ()

A: 氟康唑抑制华法林的肾脏排泄，导致华法林血药浓度升高

B: 氟康唑可抑制 CYP2C9，导致华法林血药浓度升高

C: 氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力，导致血中游离的华法林浓度升高

D: 氟康唑可增加华法林的吸收，导致华法林血药浓度升高

答案: B

40. 超常处方

- A: 无适应证用药
- B: 黄连素用于细菌性腹泻
- C: 无正当理由不首选国家基本药物
- D: 二甲双胍用于糖尿病患者

答案：A

41. 可出现意识混乱、口干、便秘的是

- A: 呋喃妥因
- B: 双嘧达莫
- C: 苯巴比妥
- D: 氯苯那敏

答案：D

42. 异烟肼+维生素 B6 治疗结核病属于

- A: 提高药物疗效
- B: 治疗多种疾病
- C: 减少药物不良反应
- D: 延缓细菌耐药性的产生

答案：C

43. 可引起胎儿性发育异常的药物是

- A: 叶酸拮抗剂
- B: 苯巴比妥
- C: 沙利度胺
- D: 雌激素、孕激素、雄激素

答案：D

44. 患者,女,25岁,产后2个月,哺乳期,因尿路感染需要给予抗感染治疗,首选的药物是()

- A: 多西环素
- B: 头孢呋辛
- C: 阿米卡星
- D: 左氧氟沙星

答案: B

45. 以下有关肝功能不全患者用药原则的叙述中,不正确的是

- A: 定期检查肝功能,及时调整治疗方案
- B: 选用从肝脏排泄的药物
- C: 避免或减少使用对肝脏毒性大的药物
- D: 特别应避免与肝毒性的药物合用

答案: B

46. 可告知患者采取如穿戴宽松的鞋袜和手套,避免反复揉搓手脚,避免长时间阳光直射等措施预防药物不良反应的是

- A: 卡培他滨
- B: 奥沙利铂
- C: 顺铂
- D: 卡铂

答案: A

47. 有关药学服务的叙述,正确的是

- A: 药学服务的社会属性仅限服务于治疗性药物
- B: 药学服务只涉及更高层次的临床实践,不包括处方调剂、药品检验、药品供应

C: 药学服务涵盖了患者用药相关的全部需求，但不包括对公众的健康教育

D: 用药周期长的慢性病患者属于药学服务的重要人群

答案：D

48. 体液占体重 75%~80%，水溶性药物血中峰浓度较高，即

A: 药物排泄

B: 药物吸收

C: 药物分布

D: 药物代谢

答案：C

49. 心衰导致药物经肾排泄减少

A: 肾小球滤过减少

B: 肾小管重吸收增加

C: 肾小管分泌减少

D: 肾血流量减少

答案：D

50. (2017 年真题) 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

A: 溴己新

B: 乙酰半胱氨酸

C: 右美沙芬

D: 可待因

答案：C

51. 患者，男，57 岁，患有冠心病、抑郁症、2 型糖尿病，用药包括二甲双胍、阿托伐他汀、圣约翰草提取物、阿卡波糖、阿司匹林。近日患者在家人陪同下去郊区旅游，日晒后暴露部位的皮肤出现红斑、丘疹，伴灼热、痒痛感，疑与用药有关。最可能引起该过敏反应的药物是

- A: 阿卡波糖
- B: 二甲双胍
- C: 阿托伐他汀
- D: 圣约翰草提取物

答案：D

52. 缺铁性贫血最早和最常见的症状是

- A: 食欲不振
- B: 头晕
- C: 乏力、困倦、活动耐力减退
- D: 记忆力减退

答案：C

53. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

- A: 淡红色
- B: 淡绿色
- C: 淡黄色
- D: 淡橙色

答案：C

54. (2018 年真题) 患者, 女, 49 岁, 近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊, 临床诊断为下呼吸道细菌性感染, 处方如下:

- A: 阿司匹林泡腾片给药剂量不合理
- B: 左氧氟沙星片给药间隔不合理
- C: 维生素 C 片用法用量不合理
- D: 氨溴索片给药剂量不合理

答案: B

55. 属于非核苷类逆转录酶抑制剂的是 ()

- A: 利托那韦
- B: 依非韦伦
- C: 齐多夫定
- D: 利巴韦林

答案: B

56. 用于估算透析清除率的是 ()

- A: NCEMERP 标准
- B: CLHD 公式
- C: CoCkroft-GAut 公式
- D: CoChrAnE 分级

答案: B

57. 药师在进行药学服务时, 经常查阅一些相关网站, 获取一些有用信息} 中华医学会的网址是

- A: org. cn
- B: www. cp
- C: www. cm
- D: org. cn

答案：C

58. 向患者发放合理用药宣传材料是

- A: 指令方式
- B: 主动方式
- C: 质问方式
- D: 被动方式

答案：B

59. 肾功能重度损害时，抗菌药每日剂量分别减低至正常剂量的

- A: $2/3 \sim 1/2$
- B: $1/5 \sim 1/10$
- C: $1/10 \sim 1/15$
- D: $1/2 \sim 1/5$

答案：B

60. 静脉滴注给药的外文缩写是

- A: iv
- B: i. h
- C: ivgtt
- D: im

答案：C

61. (抗甲状腺药分阶段治疗时间)，初治阶段

- A: 1~2 年
- B: 2~3 个月
- C: 1~2 个月
- D: 1~2 周

答案：C

62. 糖尿病酮症酸中毒患者应选用

- A: 胰岛素
- B: 格列本脲
- C: 二甲双胍
- D: 大剂量碘剂

答案：A

63. 躯干部出现鞭打状色素沉着

- A: 柔红霉素
- B: 博来霉素
- C: 白消安
- D: 氟尿嘧啶

答案：B

64. 用于解救苯二氮草类药物中毒的特殊解毒剂是

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 氟马西尼
- C: 亚甲蓝
- D: 纳洛酮

答案：B

65. 稳定型心绞痛发作时应选用的治疗药物是（）

- A: 阿司匹林
- B: 氟伐他汀
- C: 硝酸甘油
- D: 美托洛尔

答案：C

66. 6 岁以下的儿童应该慎用的抗过敏药品是

- A: 四环素
- B: 依巴斯汀
- C: 庆大霉素
- D: 氯雷他定

答案：B

67. 患者，女，30 岁，妊娠 7 个月，既往有磺胺药过敏史。近日双眼沙眼症状加剧，发痒、分泌物多，有烧灼感。去年曾用酞丁安滴眼液治疗相似症状，疗效较好，今天到药店想再次购买该药。药师给予的用药建议是（）

- A: 酞丁安滴眼液
- B: 磺胺醋酰钠滴眼液
- C: 硫酸锌滴眼液
- D: 利巴韦林滴眼液

答案：C

68. 治疗水疱型脚癣宜选用（）

- A: 复方苯甲酸酊
- B: 氢化可的松软膏
- C: 阿昔洛韦软膏
- D: 维 A 酸乳膏

答案：A

69. 患者，男，25 岁，咳嗽、咳痰伴胸痛，发热，体温 38.5℃，入院检查肺部湿啰音，WBC $12\times 10^9/L$ ，X 线显示片状、斑片状浸润性阴影及间质性改变，不伴胸腔积液。

- A: 支气管炎
- B: 支气管哮喘
- C: 肺结核
- D: 社区获得性肺炎

答案：D

70. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg。1 天前开始发热，体温 39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，每间隔 2~3 小时排 1 次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5\times 10^9/L$ ，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 分泌性腹泻
- B: 消化不良性腹泻
- C: 动力性腹泻
- D: 感染性腹泻

答案：D

71. 属于妊娠 X 级毒性药品的是

- A: 水溶性维生素
- B: 辛伐他汀
- C: 氧氟沙星
- D: 青霉素、头孢哌酮-舒巴坦

答案：B

72. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。卡托普利属于 ()

- A: A 级
- B: D 级
- C: B 级
- D: C 级

答案: B

73. 医疗机构制剂申请要求临床研究受试例数不得少于

- A: 60 例
- B: 80 例
- C: 40 例
- D: 20 例

答案: A

74. 氟马西尼用于解救的是 ()

- A: 汞中毒
- B: 氰化物中毒
- C: 有机磷中毒
- D: 三唑仑中毒

答案: D

75. 普通处方一般不得超过几日用量

- A: 5
- B: 1
- C: 3
- D: 7

答案: D

76. (2015 年真题) 患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用 4 个小时后，面部出现皮疹，无其他不适。停药后皮疹消失，排除其他疾病可能。该病例用药与不良反应因果关系评价结果是 ()。

- A: 很可能
- B: 可能无关
- C: 肯定
- D: 可能

答案: A

77. 需要用 10% 酒精或植物油冲洗是清除 ()

- A: 皮肤污染酚类毒物
- B: 毛发被毒物污染
- C: 眼内进入固体腐蚀性颗粒
- D: 眼内污染毒物

答案: A

78. 解救氰化物中毒的是 ()

- A: 二巯丁二钠
- B: 纳洛酮
- C: 双复磷
- D: 亚硝酸钠

答案: D

79. 在 "应用软膏剂和乳膏剂的注意事项" 中，不正确的是

- A: 涂敷后封包以增加药物的吸收、提高疗效
- B: 一般不要涂敷破损、溃烂、渗出的部位
- C: 涂敷前将皮肤清洗干净

D: 不宜涂敷于口腔、眼结膜

答案：A

80. 发热的判断标准是指人体昼夜体温波动超过 1°C ，腋下温度超过

A: 36.7°C

B: 37.0°C

C: 37.6°C

D: 37.3°C

答案：B

81. 患者，女，62 岁，医师处方如下：患者：××X，性别：女，年龄：62 岁。临床诊断：2 型糖尿病高血压 2 级高脂血症 PCI 术后。

A: 二甲双胍

B: 氨氯地平

C: 阿卡波糖

D: 氯吡格雷

答案：D

82. 主要用于丙烯腈、氟化物、一氧化碳等中毒的解毒剂是

A: 盐酸烯丙吗啡

B: 谷胱甘肽

C: 亚硝酸钠

D: 双解磷

答案：B

83. 容易引湿的药物是

A: 胃蛋白酶

B: 青霉素类

C: 阿扑吗啡

D: 牛痘菌苗

答案: A

84. 百日咳、结核病、水痘、麻疹、风疹、流行性腮腺炎、传染性肝炎，可呈现

A: 红细胞计数减少

B: 血小板减少

C: 淋巴细胞增多

D: 白细胞增多

答案: C

85. 口服氯化铵用于解救的是 ()

A: 瘦肉精中毒

B: 苯丙胺中毒

C: 硝西泮中毒

D: 氯丙嗪中毒

答案: B

86. 患者，男，56岁，以发热、左侧胸廓剧痛就诊。查体：体温38.8℃，左侧沿第四肋走向有簇集性水疱。

A: 卡马西平

B: 阿米替林

C: 对乙酰氨基酚

D: 普瑞巴林

答案: A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

87. 后记

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/388056057047007022>